

DELLA  
MEDICINA  
DI AURELIO CORNELIO  
CELSE.



DELLA  
MEDICINA  
DI AURELIO CORNELIO  
CELSO

LIBRI OTTO.

*Portati nella Lingua Italiana, secondo l'  
Esemplare Latino dato al Pubblico, da  
Teodoro Jansenio d' ALMELOVEEN,  
Dottore, e Professore di Medicina, in  
Olanda.*

FATICA  
DELL'ABATE CHIARI DA PISA  
TOMO SECONDO.



BIBLIOTECA NAZ.  
ROMA  
VITTORIO EMANUELE

IN VENEZIA, MDCCXLVII.

Appresso DOMENICO OCCHI.

*Con licenza de' Superiori, e Privilegio.*

}

1:

5



## A chi Legge.

**B** *Enigno Leggitore.*

*Verso di queste carte*

*Voltate gli occhj vostri, e il vostro amore,*

*Racchiudon tutta l'arte*

*Di curar i malori.*

*Sian quelli per di dentro, ovver sian fuori:*

*Egli è quel libro dotto,*

*Che n'è durato al Mondo*

*Ben accolto e giocondo*

*Per secoli diciotto.*

*Or qual Fenice vera, non mentita*

*Mutatosi di manto.*

*Risorge a nuova vita:*

*Sperando poter vivere altrettanto.*

*Accolto dunque con volto sereno*

*S' ami si legga, e apprezzi,*

*E con festosi vezzi*

*Stringasi al vostro seno.*

*Misure usate da varj Autori.*

**G** *Rano*; è la quarta parte di un dito, o la sesta parte di un' oncia.

*Linea*: è la misura piu piccola di larghezza, ed è la metà di un grano, o l'ottava parte di un dito, o la duodecima parte di un' oncia, la sua larghezza è appresso poco simile ad un grano di orzo.

*Dito*: comprende cotesto linee otto, quattro grani, o la decima parte di un piede.

*Pollice*: è di larghezza quanto il dito grosso del piede di un uomo, essendochè il dito pollice delle mani è piu piccolo di quello de' piedi, perciò per pollice intenderete lo stesso, che un' oncia.

*Oncia* Oncie dodici fanno un braccio.

*Palmo*, è composto di dita cinque.

*Palmo doppio detto da Greci Dichas* comprende otto, o dieci dita.

*Spitamo* ... è fatto di dodici dita, e nove pollici.

*Piede*, comprende sedici dita.

*Gomito o Cubito* è composto in un piede, e mezzo.

*Bracciata* si distende per cinque piedi.

*Nota* ... per la misura di un dito deve intendersi la larghezza di un grosso dito della mano.

*Pesi, che si usano nelle ordinazioni  
Medicinali.*

**G** *Rano* un grano di orzo, o di frumento.  
*Caclo*, grani due.

*Carato*, o *Siligua* grani quattro.

*Obolo* grani dodeci.

*Scropolo*: grani ventiquattro

*Denario* è l'ottava parte di un oncia Romana, altri ancora come i Greci la fanno settima parte.

*Dramma*, è l'ottava parte dell' oncia de' Greci, e più lieve del danaro pesa grani sessanta, cioè tre scrupoli volgari,

*Dramma*, de' Romani è grani settantadue.

*Sestola*, sesta parte dell' oncia

*Esagio*, scrupoli quattro.

*Aureo*, peso di una dramma, e mezza.

*Solido*, pesa l'istesso.

*Sicilico*, dramme due.

*Oncia*, la duodecima parte della libra.

*Sestante*, oncie due cioè sesto di libra.

*Quadrante*, oncie tre quarto di libra,

*Triens*, oncie tre quatto di libra

*Quincuns*, oncie cinque.

*Semis*, oncie sei mezza libra.

*Septuns*, oncie sette.

*Octuns*, oncie otto.

*Dodrante*, oncie nove.

*Dexante*, oncie dieci.

*Deuns*,

*Deuns*, oncie undici,

*Lira*, ovvero peso, oncie dodeci.

*Fava Egiziaca*, è un obolo, e mezzo secondo Galeno.

*Mina*, appresso gli Ateniesi dramme settantacinque, dopo cento si chiama da alcuni *Mina Greca*.

*Dipondio*, peso di due libre.

*Manipolo*, si è quanto può contenere la mano.

*Fascicolo*, appresso Galeno libre otto.

*Pugillo*, si è quanto può contenere la mano.

*Misure delle cose liquide, che si ordinano nelle Medicine.*

**G**utta ovvero *Guttula* quanto una lacrima cadente.

*Cochlearius*, pesa scrupoli dieci.

*Cijatus*, dramme tredici, e oboli dodici.

*Acceptabulum*, ciato uno e mezzo.

*Hæmina*, ciati sei, cioè onze dieci.

*Sextarius*, oncie 20. altri diciotto.

*Congius*, libre dieci.

*Urna Sestarij*, ventiquattro cioè libre quaranta,

*Amphora*, libre ottanta.

*Culeus*. Amph. venti.

# INDICE

## DE' CAPI.

### LIBRO QUINTO.

- CAPO I. **D**elle facoltà semplici delle cose, di cui compongonfi i medicamenti, e prima di quelle, che fermano il sangue. pag. 3
- CAPO II. Degli agglutinati. ivi
- CAPO III. De' concoquenti, e suppuranti. 4
- CAPO IV. Delle cose apritive. ivi
- CAPO V. Delle cose purganti. 5
- CAPO VI. De' Corrosivi. 6
- CAPO VII. Delle cose, che consumano il corpo. ivi
- CAPO VIII. De gli Adurenti. 7
- CAPO IX. Cose, che fanno le croste alle piaghe. 8
- CAPO X. Quali cose tolgano le croste alle piaghe. ivi
- CAPO XI. Quali cose discutino ciocche in qualche parte del corpo si è stagnato. ivi
- CAPO XII. Cose, che tirano fuora. 9
- CAPO XIII. Cose, che tolgano le asprezze. ivi
- CAPO XIV. Cose, che fanno carne, ed empiono

*piono la piaga.*

pag. 10

CAPO XV. *Degli Emollienti.* ivi

CAPO XVI. *Che cose nettano la pelle.* ivi

CAPO XVII. *Delle misture delle cose semplici, de' pesti, e della differenza del Malamma, Empiastro, e Pastello.* II

CAPO XVIII. *De' Malammi.* 13

CAPO XIX. *Degli Empiastri.* 25

CAPO XX. *De' Pastelli, e prima di quei, che servono ad unire, e sanare le ferite fresche.* 35

CAPO XXI. *De' Pessi.* 37

CAPO XXII. *De' Medicamenti, di cui se ne serviamo secchi.* 39

CAPO. XXIII. *Degli Antidoti, e de' mali, a cui giovano.* 43

CAPO XXIV. *Degli Acopi.* 45

CAPO XXV. *Delle Pillole.* 46

CAPO XXVI. *Delle cinque sorti de' nocu-  
menti del corpo.* 52

CAPO XXVII. *Delle ferite che si fanno per mezzo di morsicature, e loro cure.* 82

CAPO XXVIII. *Delle Ulcere interne, che si fanno per corruzione di qualche parte del corpo.* 92

LIBRO SESTO.

CAPO I. *De' Mali di ciascuna parte del corpo.* 125

CAPO II. *Della Porrigine; e sua cura*  
*Græcè ὀνιχία.* ivi

CA.

- CAPO III. *Del Sicosi, e sua cura.* pag. 127
- CAPO IV. *Dell' Aree, ovvero Piazzette, e loro cura.* ivi
- CAPO V. *De Varj, Lentiggine, ed Efeli-  
de, e loro cure.* 129
- CAPO VI. *De' mali degli occhi, e loro cu-  
re, e principalmente di quelli, che cu-  
ransi con medicamenti lenitivi.* 130
- CAPO VII. *De' mali degli occhi.* 158
- CAPO VIII. *De' mali, e delle cure del na-  
so.* 168
- CAPO IX. *Del dolore de' denti.* 171
- CAPO X. *De' Gottaccioli.* 174
- CAPO XI. *Delle Ulceri della bocca, e lo-  
ro cure, e quali siano l'Antere.* 176
- CAPO XII. *Delle ulseri della lingua.* 179
- CAPO XIII. *Delle Parodontidi, tumoretti  
delle Gengive, e altre ulceri delle mede-  
sime.* ivi
- CAPO XIV. *Del mal dell' Ugola, e sua  
cura.* 181
- CAPO XV. *Del cancro della bocca.* 182
- CAPO XVI. *Delle Parotidi che nascono sot-  
to gli orecchi.* 184
- CAPO XVII. *Della cura dell'Ombelico, che  
avanza fuori.* 185
- CAPO XVIII. *De mali, e cure delle parti  
Vergognose.* ivi
- CAPO XIX. *Delle Ulceri delle dita.* 199
- LIBRO SETTIMO.
- CAPO I. *Delle parti Contuse.* 204
- CA-



- CAPO II. De' tumori, che di per se vengono come si taglino, e si curino. pag. 204
- CAPO III. De' buoni, e cattivi segni dell' esulcerati. 208
- CAPO IV. Delle Fistole. 210
- CAPO V. Del trar fuora del Corpo i dari. 214
- CAPO VI. De' Gangli, Meliceride, Ateroma, Steatoma tumoretti del Capo. 219
- CAPO VII. De' difetti degli occhi, che si curano col ferro, e co la mano. 221
- CAPO VIII. Delle infermità degli orecchi, le quali curansi co' la mano, e col ferro. 243
- CAPO IX. Le parti corte negli orecchi, nelle labbra, e nelle narici come possono risarcirsi e curarsi. 245
- CAPO X. Del Polipo. 248
- CAPO XI. Della Ozena. 249
- CAPO XII. De' mali della bocca, che curansi con la mano, e col ferro. 250
- CAPO XIII. Del male del collo. 255
- CAPO XIV. De' mali dell'Ombelico. 256
- CAPO XV. Come si cavi l'acqua agl' Idropici. 260
- CAPO XVI. Del ventre forato da qualche percossa, e degl' intestini feriti. 262
- CAPO XVII. Della rottura della membrana inferiore dell' addome. 264
- CAPO XVIII. Del la natura, e de' mali de' testii.

## XIV

testicoli.

pag. 266

CAPO XIX. *Delle cure comuni de' testicoli, e prima del taglio dell' inguine, e dello Scroto.*

271

CAPO XX. *Della Cura dell' Intestino caduto nello Scroto.*

278

CAPO XXI. *Della cura dell' Omento caduto nello scroto.*

280

CAPO XXII. *Della cura del Ramice.*

282

CAPO XXIII. *Della carne cresciuta fra le tuniche de' testicoli, e del nervo indurito.*

285

CAPO XXIV. *Del Ramice dell' Inguine.*

ivi

CAPO XXV. *Del ricoprir la ghianda del membro se è scoperta.*

286

CAPO XXVI. *Della difficoltà d' orinare, e sua cura.*

279. 289

CAPO XXVII. *Del canchero, che fassi dalla lacerazione della vescica.*

294. 304

CAPO XXVIII. *Se le parti naturali delle Donne non ammettono il concubito come si curino.*

308

CAPO XXIX. *Come si cavi fetò morto dall' utero.*

309

CAPO XXX. *De' mali Dell' Ano e loro cura.*

313

CAPO XXXI. *Della cura delle Vari- ci.*

316

CAPO XXXII. *Cura delle Dita attaccate, e incurvate.*

318

CA.

CAPO XXXIII. Della cura della Gangrena. pag. 318

LIBRO OTTAVO.

CAPO I. Del Sito, e della figura delle ossa di tutto il corpo Umano. 320

CAPO II. Dell' ossa viziate, e corrotte, loro segni, e loro cure. 332

CAPO III. Come si tagli l'osso; e del modo diolo, e Terebra ferri a questo proporzionati. 338

CAPO IV. Cura della Calvaria rotta. 343

CAPO V. Della cura della rottura del naso. 353

CAPO VI. Della Cura degli Orecchi rotti. 356

CAPO VII. Della cura della mascella rotta, e di alcune cose appartenenti a tutte le ossa. 357

CAPO VIII. Del Jugolo rotto. 359

CAPO IX. Cura Della Rottura delle Coste. 362

CAPO X. Delle cure comuni, degli Omeri, braccia, femori, stinchi, diti rotti, o evulsi. 366

CAPO XI. Delle ossa lussate. 380

CAPO XII. Della Mascella lussata. 383

CAPO XIII. Della testa lussata. 385

CAPO XIV. Della lussazione della Spina. ivi

CAPO XV. Del l' Omero lussato. 387

CAPO XVI. Della lussazione del cubito. 390

CA.

<b>CAPO XVII.</b>	<i>Della mano lussata.</i>	<b>pag. 391</b>
<b>CAPO XVIII.</b>	<i>Della Palma lussata.</i>	<b>392</b>
<b>CAPO XIX.</b>	<i>Delle Dita Lussate.</i>	<b>393</b>
<b>CAPO XX.</b>	<i>Del Femore Lussato.</i>	<b>ivi</b>
<b>CAPO XXI.</b>	<i>Del Ginocchio Lussato.</i>	<b>396</b>
<b>CAPO XXII.</b>	<i>Del Calcagno Lussato.</i>	<b>397</b>
<b>CAPO XXIII.</b>	<i>Della Pianta Lussata.</i>	<b>398</b>
<b>CAPO XXIV.</b>	<i>Delle Dita Lussate.</i>	<b>ivi</b>
<b>CAPO XXV.</b>	<i>Delle lussazioni con piaga o rossura della carne.</i>	<b>ivi</b>

I

DELLA MEDICINA  
DI AUR. CORN. CELSO  
LIBRO QUINTO.

PREFAZIONE.



O detto di quelle malattie del corpo, le quali piu curansi co' la maniera di vivere. (a) Convien ora che io ne facci passaggio a quella parte di Medicina, che piu co' medicamenti combatte. (b) Questi sono stati molto in uso presso gli Autori antichi, presso di *Erasistrato*, e di altri, che *ἐμπειρικοί* (empirici) si chiamarono, principalmente presso di *Erofilo*, e di quei, che della setta di esso ne furono: talmente che niuna sorta di malattia vi era, che senza di cotesti curassero. Come pure anno lasciato scritto molto delle facultà de' medicamenti: quali sono le cose, che scrissero *Zenone*, o *Andrea*, o *Apollonio*, che per cognome fu detto *Mus*. (c) Ma l'uso di questi non senza cagione da *Asclepiade* fu abolito in gran parte: ed essendochè i medicamenti offendano lo stomaco, e siano di no-

*Celso Volg. Tom. II.*                      A                      dri-

(a) *Detta Dieta, o Medicina Dietetica.*

(b) *Detta Farmaceutica.*

(c) *Alcuni leggono Mys, altri Myx.*

## 2 P R E F A Z I O N E .

drimento cattivo, n'indirizzò piuttosto ogni sua cura alla maniera stessa del vitto . (a) Ma siccome questo in alcuni mali si è più utile, così ne sogliono avvenire a' nostri corpi moltissime infermità , le quali senza medicamenti non possono risanarsi . Soprattutto convien sapere, che ciascuna parti della Medicina sono in guisa tra se congiunte , che non possono essere separate dal tutto, ma ne desumono il nome da quello, da cui ne ritraggono il più . Nella guisa dunque , che quella parte , la quale cura col vitto talvolta n'ammette il medicamento, così quella, che principalmente co'medicamenti combatte, adoprare dee anche il modo di vivere, il quale giova assaissimo in tutti i mali del corpo . Ma essendo che i medicamenti tutti anno le virtù proprie , e talor operano soli , talor mescolati , non sembra fuor di proposito esporre prima i nomi, le virtù, e le composizioni di quelli , acciocche dalle cose, che soggiugneremo, se ne renda più facile, e più spedita la cura .

L I.

(a) *Alla Dieta*

## LIBRO QUINTO

## CAPO PRIMO.

*Delle facoltà semplici delle cose, di cui  
compongonsi i medicamenti, e prima di  
quelle, che fermano il sangue.*

**F**ermano il sangue. Il Vetriolo chiamato da Greci χαλκανθον (*Calcanto*) Calciti, Acacia, licio in acqua (a) incenso, aloe, gomma, piombo abbruciato, porro, erba sanguinale, terra cimolia, (b) o creta da pignatte, mifi, acqua fredda, vino, aceto, alume, melino, squama d'amendue le sorte di ferro, (c) e di rame, e di questo altresì ve ne sono due specie, una del rame ordinario, l'altra del rame rosso.

## CAPO II.

*Degli agglutinati.*

**U**niscono la ferita le cose seguenti : mirra, incenso, gomma; e principal-

*Rem. (A) 2. di cui men.*

(a) Cotto, o disciolto. *Plin. lib. 14. c. 14. Hujus (rhamni sylvestris) radice decocta in aqua fit medicamentum, quod vocant lycium.*

(b) Terra di quei, che arruotano i coltelli.

(c) Forse s'intende del ferro comune, e dell'acciajo.

## 4 LIBRO QUINTO

mente d' Acanto, psillio, draganto, cardamomo, bulmi, seme di lino, nastuccio, chiara d' uovo, colla, colla di pesce, bionia, chiocciole pestate co' lor gusci, miel cotto, sponga bagnata in acqua fresca, o in vino, ovver in aceto, lana sucida inzuppata delle medesime cose; che se la ferita n' è leggiera, ancor la tela del ragno.

Reprimono l' alume, così il scissile, che chiamasi *Schiston*  $\sigma\chi\iota\sigma\tau\iota\nu$ , come il liquido, melino, orpimento, verderame, il calciti, l' vetriolo.

### C A P O III.

*De' concoquenti, e suppuranti.*

**C**oncoquono, e suppurano le cose seguenti. Nardo, mirra, costo, balsamo, galbano, propoli, fuligine (a) d' incenso, e sua corteccia, bitume, pece, solfo, trementina, sevo, grasso, olio.

### C A P O IV.

*Delle cose apritive.*

**A**prono le ferite, (b) quasi boche ne' corpi, che da' Greci dicesi  $\alpha\nu\alpha\sigma\tau\omicron\mu\epsilon\nu$  (ana-

(a) Per fuligine s' intende la parte di dentro.

(b) Altri vorrebbero, che si leggesse piuttosto ulcersi.



## C A P O Q U A R T O. 5

(*anastomun*) il cinnamomo, balsamo, panace, giunco quadrato, pulegio, il fior della viola bianca, bdellio, galbano, ragia di terebinto, e di pino, propoli, olio vecchio, pepe, piretro, camepizio, uva taminia, solfo, alume, seme di ruta.

## C A P O V.

### *Delle cose purganti.*

**P**urgando il verderame, orpimento, che da' Greci vien detto ἀρσενικόν (*arsenico*) (questo poi n'ha in tutto la forza medesima della sandracca; ma egli è altresì piu gagliardo) squama di rame, pumice, iride, balsamo, storace, incenso, corteccia del medesimo, ragia di terebinto, e di pino liquida, enante, sterco di lucerta, sangue di colomba, di palombo, e di rondine, ammoniaco, bdellio, (che n'ha in tutto la virtù stessa dell' ammoniaco; ma questo n'è di efficacia maggiore) abrotano, fico secco, cocciniglia, limatura d'avorio, agresto, radicetta, (a) il caglio principalmente di lepre, (che n'ha la possanza medesima degli altri cagli, ma di fatto n'è piu efficace) fiel di toro, dell'uovo il rosso crudo, corno di cervo, la colla, miel crudo, misì, calciti, zafferano, uva taminia, schiuma d'argento, galla, squama

A 3

di

(a) *Erba lanaria.*

## 6 LIBRO QUINTO

di rame, pietra ematite, minio, costo, solfo, pete cruda, sevo, grasso, olio, ruta, porro, lenticola, ervo. (a)

### C A P O VI.

#### *De Corrosivi.*

**R** Odone: l'alume liquido, ma piu il tondo, verderame, calciti, misi, la squama del rame, e piu quella del rosso, rame abbruciato, sandracca, minio sinopico, casia, balsamo, mirra, scorza di incenso, galbano, ragia di terebinto liquida, amende i pepi, ma piuttosto il rotondo, cardamomo, orpimento, calcina, nitro, e sua spuma, seme d'appio, radice di narcisso, agresto, alcionio, olio di noci amare, aglio, miel crudo, vino, lentisco, squama di ferro, fiel di toro, scammonea, uva taminia, cinnamomo, storace, seme di ruta, ragia, seme di narciso, sale, noci amare, come l'olio di quelle, vetriolo, borace, cenere delle conchiglie.

### C A P O VII.

#### *Delle cose, che consumano il corpo.*

**C** Onsumano il corpo il fugo d'acazia, l'ebeno, il verderame, squama di rame,

(a) Detto in Toscana moco.

## CAPO SETTIMO. 7

me, borace, cenere di Cipri, nitro, cadmia, schiuma di argento, ipocistide, disfrige, sale, orpimento, solfo, ruchetta, sandracca, salamandra, alcionio, fior di rame, calciti, vetriolo, ocre, calcina, aceto, galla, alume, latte di fico salvatico, o di lattuga marina, che da' Greci chiamasi *τιθύμαλλος* (*Titimallo*) fiele, fuligine d'incenso, spodio, lenticola, miele, foglie d'ulivo, marrubio, le pietre ematite, Frigia, Asia, e Scissile, mischi, vino, aceto.

## C A P O V I I I.

### *De gli Adurenti.*

**S**ONO adurenti, l'orpimento, il vetriolo, calciti, mischi, verderame, calcina, carta abbruciata, sale, squama di rame, feccia abbruciata, mirra, sterco sì di lucertola, che di colomba, di palombo, e di rondine, pepe, cocciniglia, aglio, disfrige, amendue i latti, (che nel sopradetto capo si sono portati) elleboro sì bianco, che nero, cantarelle, corallo, pirètro, incenso, salamandra, ruchetta, sandracca, uva taminia, borace, ocre, alume, scissile, sterco di pecora, enante.

Rib

*Cose, che fanno le croste alle piaghe.*

**Q**Uasi le medesime cose fanno le croste alle piaghe come se scottate ne fossero col fuoco, ma principalmente la calciti, se n'è cotta, il fior di rame, verderame, orpimento, il misi, e questo piu n'ha efficacia se è cotto.

*Quali cose tolgano le croste alle piaghe.*

**Q**Ueste croste poi sono levate dalla farina di fromento con ruta, o porro, o lenticchia, a cui alquanto di miele aggiunto ne sia.

*Quali cose discutino ciocche in qualche parte del corpo si è stagnato.*

**A** Discutere poi quanto si è fermato in qualche parte del corpo forza grandissima n'anno l'abrotano, l'elonio, maggiorana, viola bianca, miele, giglio, sanfuco, cipero, latte, fertula campana, serpillo,

## C A P O U N D E C I M O . 9

pillo, cipresso, cedro, iride, viola porporina, narciso, rosa, zaffrano, prasio, giunco quadrato, nardo, cinamomo, casia, ammoniaco, cera, ragia, uva taminia, spuma d'argento, stirace, fico secco, tragorigano, seme di lino, e di narciso, bitume, feccie delle stanze de'lottatori, pietra focaja, o molare, rosso d'uovo crudo, noci amare, solfo.

## C A P O X I I .

*Cose, che tirano fuora.*

**T**Iran fuora: il ladano, alume rotondo, ebano, seme di lino, agresto, fiel, calciti, bdellio, ragia di terebinto, e di pino, propoli, fico secco cotto, sterco di colomba, pomice, farina di gioglio, fico acerbo cotto in acqua, elaterio, bacche di lauro, nitro, sale.

## C A P O X I I I .

*Cose, che tolgono le asprezze.*

**T**olgono l'asprezza lo spodio, l'ebano, gomma, bianco d'uovo, il latte, il draganto.

10 LIBRO QUINTO

C A P O XIV.

*Cose, che fanno carne, ed empiono la piaga.*

**N** Utriscono la carne, ed empiono la piaga la ragia di pino, Ocra così detta in Greco, miel, asteriaca, cera, butirro.

C A P O XV.

*Degli Emollienti.*

**M** Olificano il rame bruciato, la terra Eretria, nitro, lacrima di papavero, ammoniaco; bdellio, cera, sevo, grasso; olio, fico secco, sesamo, fertula campana, radice, e seme di narciso, foglie di rosa, il caglio, rosso d'uovo crudo, noci amare, ogni sorta di midolla, stimmi, pece, chioeciola cotta, seme di cicuta, la feccia del piombo chiamata da' Greci σκωρία μολύβδου (*scoria molibdu*) panace, cardamomo, galbano, ragia, uva taminia, storace, iride, balsamo, fettecchie delle stanze de' lottatori, solfo, butirro, ruta.

C A P O XVI.

*Che cose nettano la pelle.*

**N** Etta la pelle il miele, ma piu ancora se sia con galla, o ervo, oppur lenticchia,

## CAPO DECIMO SESTO. II

chia, o marrubio, o iride, o ruta, ovver nitro, o verderame.

## C A P O XVII.

*Delle misture delle cose semplici, de' pesi,  
e della differenza del Malamma,  
Empiastro, e Pastello.*

**E** Sposte le facoltà semplici, dee dirsi come si mescolino, e quali sian le cose, che di esse compongonsi. Si mescolano in più maniere; ne di cotesta mistione vi è limite alcuno; attesoche delle cose semplici altre se ne tolgono, altre se ne aggiungono, e talor usando le cose stesse cangiasi 'l peso. Pertanto non essendo molto varia la materia delle facoltà, ne nascono nondimeno sorte infinite di misture, le quali ancora, che tutte potessero raccontarsi, nulladimeno sarebbe superfluo. Attesoche i mali stessi richieggono poche composizioni, e conosciute le facoltà n' è facile a chichessia variar esse. Perciò sarò contento di quelle, ch' ho inteso esserne le più cospicue. E in questo libro spiegherò quelle, che o possono mancare ne' libri anteriori, oppur n' appartengono alle cure, che qui sotto sono per dire, in modo però, ch' io ne congiunga insieme le più comuni, e differisca a' suoi luoghi se ve ne faranno di appropriate a cure particolari, oppur piccole.

Ma

Ma prima voglio, che sappiasi, nella oncia contenersi 'l peso di sette denari. Il peso poi di un denaro esserne da me diviso in sei parti, cioè: sestanti (a) di modo, che io n' abbia nel sestante del denaro il medesimo peso di quello, che i Greci chiamano ὀβολόν (obolon). (b) Questo rapportato a' pesi nostri fa poco piu di mezzo scrupolo.

2. In che differiscano fra loro il Malamma, l'Empiastro, e 'l Pastello.

I Malammi poi, gli Empiastri, ed i Pastelli, che i Greci chiamano τροχίσκος (trochiscus) essendochè molti ne contengono le medesime cose, sono però differenti fra loro in questo, che i Malammi in primo luogo compongonsi di fiori, ed anche de' loro gambi: gli empiastri, ed i pastelli di certe cose metalliche sono costruiti. In secondo luogo i malammi ammaccati sono resi a sufficienza morvidi, perchè pongonsi su la pelle non rotta; sottilissimamente poi debbon polverizzarsi le cose, che gli empiastri, ed i pastelli compongono, acciò non offendano la piaga allora, che sopra posti vi sono. Fra l'empiastro poi, e 'l pastello trovasi questa differenza, che l'empiastro ammette qualche cosa di liquefatto; nel pastello si uniscono insieme con qualche liquore solamente medicamenti secchi. Di piu l'empiastro fassi  
in

(a) Rhod. de ponderibus pag. 24.

(b) Id. ibid. pag. 27.



## CAPO DECIMO SETTIMO. 13

in questa maniera : pestansi separatamente medicamenti asciutti, dapoi mescolati cotesi insieme vi s'istilla dell' aceto, o qualche altro umore non grasso, che debba aggu- gnervisi, e di nuovo eglino con esso si pesta- no. Que' poi, i quali possono liquefarsi, in- sieme al fuoco si struggono, e se dee mi- schiarvisi olio, allora vi si getta. Talvolta ancora taluna cosa asciutta cuocesi avanti nell' olio. Fattè le cose da farsi separatamen- te, mescolasi ogni cosa insieme. I Pastelli fanno così. Pestati, che sono i medicamen- ti secchi cuocansi in umore non grasso, o in vino, o in aceto, e dapoi cotti rifeccansi di nuovo. E quando debbon adoprarsi con umor simile si dis fanno; di piu l'empiastro si colloca sopra, co' pastelli si ugne, o me- scolansi con qualche cosa piu morvida, o con cerotto.

## C A P O XVIII.

### *De' Malammi. (a)*

#### 1. *Malamma contro le podagre calde.*

**S** Apute le cose suddette esporrò prima i malammi, che per lo piu non sono tro- vati per rinfrescare, ma per riscaldare. Ve- n'è

(a) *Ægin VII. 18. Orib. Synops. III. Malag- mata Medici vocant, ut auctor est Galenus, quæ partes supra modum induratas emolliunt. Ronssæus.*

## 14 LIBRO QUINTO

n'è però uno, che puo rinfrescare, approposito per le podagre calde. Contiene galla acerba (a), e di quell'altra, seme di coriandro, cicuta, lacrima arida, gomma ana un acetabolo pieno: cerotto lavato, che i Greci chiamano *πεπλινένιον* (*peplimenon*) mezza libra. Gli altri malammi per lo piu riscaldano; alcuni però digeriscono le materie, alcuni le tiran fuori, che chiamansi *ἐπισπαστικά* (*epispastica*,) e la maggior parte sono piu adattati a parti determinate de' membri.

### 2. *Malamma da tirar fuori la materia.*

Se dee tirarsi fuori la materia, come nell'Idrope, nel dolor del petto, nell'ascesso, che incomincia, ed in una suppurazione mediocre, n'è conveniente quello, che contiene trementina secca, nitro, ammoniaco, galbano ana P. \* .. cero P. \* ... ovver quello, che contiene erugine rasa, incenso ana P. \* ij. sale ammoniaco P. vj. \* squama di rame, cera, ana P. viij. \* ragia secca P. xij \* aceto un ciato. Lo stesso opera la farina di cumino con struzio, e miele P. ij. \*

### 3. *Malamma pe'l dolore del fegato.*

Se duole'l fegato & lacrima di balsamo, P. xii. \* costo, cinamomo, casia, scorza di mirra, zafferano, giunco rotondo, seme di balsamo, iride Illirica, cardamomo, amomo, nardo ana P. xvi. \* alle quali cose  
si ag-

(a) *Detta da Dioscoride. Confacite.*

## CAPO DECIMO OTTAVO. 15

si aggiugne unguento nardino , fin tanto che n'abbia consistenza di cerotto, e questo adoprasi fatto di fresco, che se poi dee conservarsi R. trementina P. xvi. \* cera P. x. \* si mescolino con vino piacevole, e si pestino insieme.

### 4. *Malamma per la Milza.*

Se la milza ne reca dolore, R. scorza di ghianda, che chiamano i Greci *μυροβάλανον* (*mirobalanon*), e nitro, pestinsi in porzioni eguali, e si bagnino con aceto fortissimo, quando si è consistente come cerotto si distende su d'una pezzetta bagnata prima con acqua fresca, ed in tal guisa si applica, e vi si pone sopra farina d'orzo, ma non vi si dee lasciare piu di sei ore, acciò non ne rifeccchi la milza, e puo farsi questo due o tre volte.

### 5. *Malamma comune a piu.*

Un altro poi comune alla milza, e al fegato, agli ascessi, alle scrofole, alle parotidi, agli articolì, a' calci altresì, che marciscono, o che altramente dolgono, come pure alla concozione del ventre fu composto da Lisia d'opopanace, storace, galbano, trementina ana P. ij. \* ammoniaco, bdellio, cera, sevo di toro, iride secca, P. iv. \* caci un acetabolo, pepe, grani 40. Le quali cose pestate si contemperano con unguento irino. (a)

### 6. *Ma-*

(a) Si puo aggiugner fien greco, e aniso., che renderassi migliore.

## 16 LIBRO QUINTO

### 6. *Malamma nel dolor de' fianchi.*

Al dolor de' fianchi v'è la composizione di Apollofane, la quale contiene trementina, fuligine d'incenso ana P. iv. \* bdellio, ammoniaco, iride, sevo de' reni di vitello, o di capra, visco quercino P. iv. \* e questo toglie ogni dolore, mollifica le durezza, mediocrementemente riscalda.

### 7. *Allo stesso, Malamma d' Andrea.*

Nello stesso dolor di fianchi trovasi 'l malamma di Andrea, che risolve ancora, tira fuori l'umore, suppara, dopo la suppurazione rompe la pelle, e n'induce la cicatrice, giova applicato agli ascessi piccoli, e grandi, e parimente agli articoli, e perciò a' dolori di sciatica, e de' piedi. Guarisce anche l'ammaccature, mollifica le viscere dure, e gonfie, tira fuori gli ossi; finalmente n'è giovevole a tutto ciò, cui può giovar il calore. Contiene cotesto cera P. xi. \* visco, lacrima di sicamino, che chiamano altramente sicomoro, ana P. i. \* pepe tondo, e lungo, ammoniaco timiama, bdellio, iride ilirica, cardamomo, legno di balsamo, incenso maschio, mirra, trementina secca ana P. x. \* piretro, cocciniglia, schiuma di nitro, sal ammoniaco, radice di aristolochia cretica, radice di cocomero salvatico, trementina liquida ana P. xx. \* alle quali cose si aggiunga unguento irino, quanto basta per mollificare, ed unir insieme le dette cose.

8. *Ma-*

**CAPO DECIMO OTTAVO. 17**

8. *Malamma per risolvere le materie costipate, ammolliare le dure, e dar passaggio alle stagnanti.*

Per risolvere le materie costipate, ammollir le durezza, e fare scorrere le materie stagnanti il principale si è quello, che vien attribuito a Poliarco. Contiene giunco quadrato, cardamomo, fuligine d'incenso, amomo, cera, trementina liquida porzioni eguali.

9. *Altro Malamma allo stesso effetto.*

Altro di Nileo. R. Crocomagma, che n'è quasi la feccia del Croco P. iv. \* ammoniaco timiama, cera ana P. xxx. \* delle quali cose le due prime si pestano con aceto, la cera liquefassi con olio rosato, e dappoi ogni cosa si mescola insieme. (a)

10. *Malamma per mollificare detto di Mosco. (b)*

Propriamente ancora mollifica le durezza quel malamma, che dicesi esser di Mosco. Contiene Galbano onc. i. fuligine d'incenso P. iij. \* cera, ammoniaco, timiama ana triente j. (c) pece secca P. ij. \* aceto eminetre.

11. *Malamma detto del Medo per digerire.*

Va in volta anche per digerire le materie fissate un Malamma d'un Autor Medo contiene cera P. iij. \* panace P. \* ff. squama di

*Celso Volg. Tom. II.*

**B**

**rame,**

(a) Galeno dice, esser giovevole non solo alle dette cose, ma eziandio a' dolori de' precordi.

(b) Forse Moschione, di cui fa menzione Galeno al l. 2. de comp. medicam.

(c) Rhod. de pond. pag. 12.

## 18 LIBRO QUINTO

rame, alume rotondo, ed ancor dello sciffi-  
le ana P. i. \* piombo bruciato P. i. \* e ff.

### 12. *Malamma di Pantemo alle medesime cose.*

Per le cose medesime Pantemo servivasi di  
calcina P. \* ff. senape pesta, ed anche fiengre-  
co, alume ana P. i. \* sevo bovino P. ij. \* ff.

### 13. *Malamma per le Scrofole.*

Ritrovo molti malammi per le Scrofole,  
e credo, che quanto questo male n'è peg-  
giore, e piu difficilmente si toglie, tanti piu  
medicamenti esserne stati sperimentati, che  
in diverse persone variamente anno corrispo-  
sto. Andrea consiglia, che si mescolino in-  
sieme le cose seguenti: seme di ortica, P. j. \*  
pepe rotondo, bdellio, galbano, ammoniaco  
timiana, ragia secca, ana P. iv. \* tre-  
mentina liquida, cera, piretro, pepe lun-  
go: seme di lattuca marina, solfo vergine,  
che i Greci chiamano *ἀπιρον* (*apiron*) (a)  
parti eguali.

### 14. *Altro di Micone al medesimo male.*

Questo poi si è di Micone: (b) feccia sec-  
ca, aceto, spuma di nitro, sale ammoniaco,  
senape, cardamomo, radice di cocomero  
salvatico, ragia, ana P. iv. \* che si pestano  
in vino piacevole.

### 15. *Altro Malamma allo stesso.*

Piu speditamente componesi quello, che  
contiene visco, sterco di gatto, trementi-  
na,

(a) Cioè, che non è stato al fuoco.

(b) Plin. hist. nat. 20. 23. *Mictionis meminit;*

CAPO DECIMO OTTAVO. 19

na, solfo vergine parti eguali. E l'altro, che contiene solfo P. i. \* pietra, che chiamano pirite, o *marchেসita* P. iv.) \* comino un acetabolo. Parimente quello, in cui v'è della suddetta pietra parte una, solfo parti due, trementina parti tre.

16. *Malamma per le Scrofole, e Fimi.*

Ve n'è uno di un certo Arabo per le Scrofole, e que' tumoretti nascenti, che chiamansi *φύματα* (*simata*,) che gli digerisce. Contiene mirra, sal ammoniaco, incenso, ragia liquida, e secca, crocómagma, cera, ana P. i. \* pietra detta pirite, o *marchესita* P. iv. \* alle quali cose taluni aggiungono solfo P. ij. \*

17. *Malamma alle Scrofole, a' tubercoli, e καρκινώδη, (carcinodj.)*

Giovano altresì alle Scrofole, e in que' tubercoli, che difficilmente concuoconsi, e in quei altresì, che si chiamano carcinodi, il malamma composto di solfo P. ij. \* nitro P. iv. \* mirra P. vi. \* fuligine d'incenso P. \* ff. sal ammoniaco P. iij. \* cera P. j. \*

18. *Malamma di Protarco alle Parotidi, favi, ed ulcere di mala sorta.*

Protarco poi alle parotidi *παρωτίδας*, e que' tumoretti chiamati favi *μειλιχιδες*, o *φύματα*, come pure all'ulcere di mala natura, mescolava pomice, ragia di pino liquida, fuligine d'incenso, chiuma di nitro, iride ana P. viij. \* con cera P. ix. \* alle quali cose aggiungeva olio un ciato, e mezzo.

## 20 LIBRO QUINTO

### 19. *Malamma al Pannareccio, e Fimi.*

Al Pannareccio poi nascente, che i Greci dicono *φύγεθλον* (*figetlon*, ) ed ogni tumoretto, che *φύμα* (*fima*) chiamasi, mescolasi quella, che ocra in greco appellasi con parti due di fior di farina, e mentre tali cose si pestano vi si va istillando del miele finatantoche si faccia fisso come un malamma.

### 20. *Malamma contro de' Fimi.*

Toglie via eziandio ogni tumoretto, che fima chiamasi quel malamma, che contiene calcina, schiuma di nitro, pepe rotondo ana P. j. \* galbano P. ij. \* sale P. iv. \* le quali cose si accogliono con cerotto fatto di rosa.

### 21. *Malamma per supprimere gli ascessi.*

Supprime ancora gli ascessi quello, che n' è composto di galbano, fava franta, ana P. i. \* mirra, incenso, scorza di radice di cappari ana P. iv. Ed abbastanza digerisce ogni ascesso la scorza di porpora abbruciata, e ridotta in polvere sottile aggiugnendovi di quando in quando dell' aceto.

### 22. *Malamma per istagnar il sangue.*

Ma se oltre al dovere ne vien fuori il sangue, n' è ben ponervi sopra quello, che n' è buono altresì per i fimi. E' composto di queste cose: bdellio, storace, ammoniaco, galbano, ragia di pino liquida, e secca; parimente di lentisco, incenso, iride ana P. ij. \*

### 23. *Malamma per ammolire i carcinomi, e fimi.*

I carcinomi poi, e i fimi [acconciamente  
si mol-



CAPO DECIMO OTTAVO. 21

si mollificano con queste cose: galbano, visco, ammoniaco, trementina ana P. j. \* scovo di toro P. \* fl. feccia abbruciata porzione assai, purché non lo renda più secco di quello, che ne dee essere il malamma.

24. *Malamma alla faccia ammaccata, e sua lividezza.*

Che se ammaccata la faccia il livido è sanguigno, si toglie colla seguente composizione tenutavi sopra giorno, e notte. Aristolochia, tapfia, ana P. ij. \* bdellio, storace, ammoniaco, timiama, galbano, ragia secca, e ragia di lentisco liquida, incenso maschio, iride Illirica, cera, ana P. iv. \* Giova pure alla stessa la farina di fava applicatavi sopra.

25. *Malammi anastomatici per aprire.*

Sonovi ancora certi malammi, che i Greci chiamano *αναστοματικά* (*anastomatica*) atesofche n' hanno virtù di aprire. Qual si è quello, che n'è composto di queste cose: pepe lungo, spuma di nitro ana P. ij. \* erisima P. iv. \* le quali cose mescolansi con miele; e sono buone altresì ad aprire le scrofole. Di tal sorta, ed ancor più gagliardo tra questi n'è quello, che ha di calcina P. iv. \* pepe grani sei, nitro, cera, ana P. x. \* miele P. iij. \* olio un emina.

26. *Malamma di Micone per risolvere, aprir, e purgare.*

Vi è parimente quel di Micone, che risolve,

22 LIBRO QUINTO

solve, apre, purga. Contiene alcionio, solfo, nitro, pumice, peso eguale; alle quali cose si aggiugne tanta pece, e tanta cera, che facciasi consistenza di cerotto.

27. *Malamma per le ossa, e nervi.*

Per l'ossa poi vi è quel di Aristogene. Si fa di solfo P. j. \* trementina, schiuma di nitro, e della parte inferiore della Scilla, piombo lavato ana P. ij. \* fuligine d'incenso P. viij. \* fico secco del piu grasso, sevo di toro ana P. viij. \* cera P. xij. \* iride Macedonica P. vi. \* sesamo fritto un acetabolo: e questo malamma n'è principalmente appropriato a' nervi, ed agli articolì.

28. *Malamma di Euticleo per gli articolì, ed ogni sorta di dolore.*

Quello, che n'è composizione di Euticleo, e che ne conviene agli articolì, ed ogni dolore, alla vescica, e agli articolì attratti da cicatrice recente, che i Greci dicono *ancilas* (ancilas) contiene fuligine d'incenso un acetabolo, ragia altrettanto, galbano netto oncia una, e mezza, ammoniaco, bdellio, ana P. \* cera P. \* ff. Un altro parimente fassi con iride, ammoniaco, galbano, nitro ana P. xiv. \* ragia liquida P. vi. \* cera P. xvi. \*

29. *Malamma di Sasagora pe' dolori articolari. (a)*

Pe' dolori articolari: R. piombo bruciato, opio,

(a) Non dee darsi se non in caso di necessità, cioè quando le forze non sembrano bastanti a resistere a quei dolori.

CAPO DECIMO OTTAVO. 23

opio, scorza d'Isquiamo, storace, peucedano, sevo, ragia, cera parti eguali.

30. *Malamma di Crisippo allo stesso effetto.*

V'è pure quel di Crisippo contiene ragia liquida, sandracca, pepe ana P. xii. \* alle quali cose s'aggiugne un poco di cera.

31. *Malamma di Ctesifonte buono per lo stesso, e per le parotidi, pe' fimi, e per le scrofole.*

Ctesifonte prendeva: cera Cretica, trementina, nitro del piu rosso ana P. \* ff. olio ciati tre. Ma cotesto nitro si pesta per tre giorni con istillarvi dell'acqua, e si cuoce con un sestario di tal acqua, finche resti consumata tutta l'umidità. Giova poi tal composizione altresì alle parotidi, fimi, strume, e ad ammollire ogni radunanza d'umore.

32. *Malamma per gli articoli.*

A gli articoli Bz. fico secco parte una mescolata con niepita, o uva taminia senza i semi con puleggio: e vi si applichi sopra.

33. *Malamma di Aristone contro le podagre, e fimi recenti, e a tutti i dolori.*

Le medesime cose sono di giovamento alle podagre. Ma per queste v'è un malamma d'Aristone, che racchiude gardo, cinnamomo, cassia, camaleonte, giunco rotondo ana P. viij. \* sevo di capra disfatto in olio irino P. xx. \* iride P. i. \* la quale deve stare per venti giorni in fortissimo aceto. E'l

A 3

B 4

mede-

24 *LIBRO QUINTO*

medesimo malamma scaccia altresì i fimi recenti, e i dolori tutti.

34. *Malamma di Teoffeno per i dolori de' piedi.*

Teoffeno poi pe' dolori de' piedi mescolava sevo de' reni parte terza, sale parti due, e con tali cose empiastrata una membranetta ve la poneva sopra; dappoi vi gittava sopra ammoniaco timiama liquefatto in aceto.

35. *Malamma di Numenio per la podagra, e agli altri articoli induriti.*

E Numenio ammorvidiva la podagra, e gli altri articoli indurati con il seguente malamma: abrotano, rose secche, opio, ana P. iij. \* trementina P. iv. \* incenso, sehumma di nitro ana P. viii. \* iride, aristolochia, ana P. xii. \* cera P. iij. \* alche si aggiugne cedria un ciato, olio laurino ciati tre, olio acerbo un sestario.

36. *Malamma di Dessio per quando si è fatto il callo negli articoli.*

Se talor poi si è indurito il callo negli articoli Dessio insegnò ponervi sopra calcina P. iv. \* cerussa P. viii. \* ragia di pino P. xx. \* pepe grani xxx. cera P. ij. \*. Alle quali cose mentre pestansi vi s'istilla un' Emina di vino piacevole.

## C A P O      X I X.

*Degli Empiaſtri. (a)*

**F** Ra gli Empiaſtri poi niuno fa giova-  
mento maggiore di que' che ſi applica-  
no ſubito alle ferite ſanguinolenti, chiamati  
da' Greci *ἀνάμα* (*Enema*). Imperocchè co-  
teſti reprimono l' infiammazione, ſe non n' è  
cauſata da violenza grande, e diminuiſcono  
ancora l' impeto di quella; di piu congluti-  
nano le ferite, che cio comportano, e ne  
inducono la cicatrice. Sono compoſti queſti  
di medicamenti non graſſi, e perciò diconſi  
*ἀλίπαντα* (*alipanta*) da' Greci.

1. *Il Barbaro empiaſtro nero da applicarſi  
ſubito alle ferite ſanguinoſe.*

Il miglior tra queſti ſi è quello, che chia-  
maſi Barbaro. (b) Contiene erugine, raſa  
P. xii. \* ſchiuma d' argento P. xx. \* alume,  
pece ſecca, ſagia di pino ſecca ana P. i. \*  
alle quali coſe ſi aggiugne olio, e aceto un'  
emina per ciaſcuno.

2. *Coacon empiaſtro nero all' effetto medefimo.*

L' altro allo ſteſſo uſo, che chiamaſi Coa-  
con, racchiude ſchiuma d' argento P. x. \* ra-  
gia ſecca, altrettanto, ma la ſchiuma prima  
cuoceli in tre emine d' olio. Queſti due em-  
piaſtri

(a) *Paul. Ægin. 7. 17.*

(b) *Scrib. Larg. c. 77. c. 207.*

## 26 LIBRO QUINTO

piastri anno il color nero, che per lo piu lo prendono dalla pece, e dalla ragia: nella guisa, che dal bitume poi si fa nerissimo; dal verderame, o squama di rame, verde; dal minio rosso, dalla cerusa, bianco.

### 3. *Basilicon empiastro nero (a) all'uso medesimo.*

Sono alcune poche composizioni in cui fa qualche diversità la varia mistura. Perciò nero altresì n'è quello, che chiamano Βασιλικόν (*Basilicon*). Racchiude opopanace P. j. \* galbano P. xi. \* pece, e ragia ana P. x. \* olio mezzo ciato.

### 4. *Empiastro Smeraddino al medesimo effetto.*

Ma quello, che verde n'è assai, lo dicono Smeraddino: in cui si contiene, ragia di pino P. iij. \* cera P. j. \* erugine P. \* ff. fuligine d'incenso, P. ij. \* olio altrettanto come pur dell'aceto, con cui si uniscano insieme la fuligine d'incenso, e'l verderame.

### 5. *Empiastro rosso al medesimo.* (b)

N'è altresì d'un color rossastro quello, che parne cicatrizzar presto le ferite. Contiene incenso P. i. \* ragia P. ij. \* squama di rame P. iij. \* schiuma d'argento P. xx. \* cera P. c. \* olio un' emina.

### 6. *Empiastro Paracolletico per il medesimo.*

Vi è in oltre quello, che dalla forza, che ha

(a) Orib. Synops. 3.

(b) Scrib. Larg. 88.

Se vi si aggiugne il galbano n'è ottimo per le morsiature de' quadrupedi, sgraffiature, e altre piccole ferite.

## CAPO DECIMO NONO. 27

ha di conglutinare lo dicono *πακολλητικόν* (*paracolliticon*.) Lo compongono le cose seguenti: bitume, alume scissile P. iv. \* schiuma d'argento P. iv. \*, e olio vecchio un' emina.

### 7. Empiastro Cefalico di Filota per la testa.

In oltre ve ne sono alcuni del medesimo genere, i quali perche specialmente conven-  
gono alle rotture del capo, *κεφαλικά* (*cefalica*) da' Greci furono nominati. La composizione di Filota contiene terra Eretria, calcitide, ana P. iv. \* mirra, rame bruciato, ana P. x. \* colla di pesce P. vi. \* erugine rasa, alume rotondo, misi crudo, aristolochia ana P. viii. \* squama di rame P. xx. \* incenso maschio P. ij. \* cera P. j. \* rosa, e olio acerbo ciati tre di ciascuno, aceto quanto puo bastare mentre in esso si pestano le cose secche.

### 8. Empiastro verde buono allo stesso.

Altro verde al medesimo effetto. Contiene rame bruciato, squama di rame, mirra, colla di pesce, ana P. vi. \* misi crudo, erugine rasa, aristolochia, alume rotondo ana P. viii. \* cera P. vi. \* olio un' emina, aceto quanto basta.

### 9. Empiastro tetrafarmaco per suppurare. (a)

A promuovere poi la suppurazione non n' è il migliore di quello, eh' è facilissimo da farsi, e da' Greci vien detto *τετραφάρμακον* (*tetra-*

(a) Scrib. Larg. c. 81. c. 211. di quattro droghe.

## 28 LIBRO QUINTO

(*terrafarmaco*) (a). Contiene parti eguali di cera, pece, ragia, sevo di toro, e se questo non si abbia, di vitello.

10. *Empiastro Enneafarmaco per suppurare, e purgare.*

Altro, che giova al medesimo nominasi *εννεαφάρμακον* (*enneafarmaco*) (b), che n'è purgativo assai. Si fa di nove cose, cera, miele, sevo, ragia, mirra, rosa, midolla o di cervo, o di vitello, o di bove, esipo, butirro, le quali cose si mescolano insieme in peso eguale.

11. *Empiastri, che anno la facoltà di produrre l'un, e l'altro effetto.*

Si trovano poi alcuni empiastri, i quali anno facoltà di far l'una, e l'altra cosa, che se non faccia d'uopo d'un solo effetto, riescon migliori; altro che no sono peggiori, ne convien adoprarli fuorché quando s'abbisogna dell'un'e l'altra facoltà, oppur in mancanza di que' che producono effetti separati, ma qualor se n'ha, debbon ripudiarsi; messi piuttosto in opra quelli, che tendono a conseguir il fine confacente a quel tempo. Per esempio ne proporrò due.

*Empiastro Attalo per le ferite.*

Evvi dunque l'Attalo per le ferite, che contiene squama di rame P. vi. \* fuligine d'incenso P. xv. \* ammoniaco altrettanto, tre-

(a) Così detto perchè composto di quattro sole cose.

(b) Cioè di 9. droghe.



# CAPO DECIMO NONO. 29

trementina liquida P. xxv. \* sevo di toro altrettanto, aceto emine tre, olio un sestario.

## *Empiastro dell' Ebreo alle rotture di testa.*

Fra que' poi, che si adattano alle rotture di testa, taluni anno quello, che viene attribuito ad un Autor Ebreo (a). E' fatto delle cose seguenti: sale P. iv. \* squama di rame rosso, rame bruciato ana P. xii. \* ammoniac timiama, fuligine d'incenso, ragia secca ana P. vi. \* pece Colofonia, cera, sevo di vitello curato ana P. xx. \* s'aggiunge aceto un ciato, e mezzo, olio manco d'un ciato. (b) Le cose, che da' Greci son dette τετραπευμένα (*teterapeumena*) noi diciamo curate; come quando dal sevo son cavate con diligenza tutte le pellicole, o da altro medicinale altresì.

## 12. *Empiastri ἐπισπαστικά epispatici. (c)*

Sonovi eziandio alcuni empiastri rinomati per estrarre, che eglino pure son detti ἐπισπαστικά (*epispatici*). Qual n'è quello, che per contener delle bacche di lauro δια δασνιδον (*dia dasnidon*) chiamasi. In esso vi è trementina P. x. \* nitro, cera, pece secca, bacche di lauro ana P. xx. \* e un poco di olio. Qualor poi io noterò bacche, noci, o cosa simile, convien sapere, come prima, che

(a) *Æt. Tetrab.* 4. *serm.* 3. 14.

(b) *Rhod. de ponder. & mens.* p. 35.

(c) *Esraenti.*

che si pesino, dee togliersi la scorza, o pelle di sopra.

13. *Altro dia daorisar per estraere, e suppurare.*

Ve n'è un altro col nome stesso, che conviene per suppurare. R. sevo di vitello, ammoniaco timiama, pece, cera, nitro, bacche di lauro, ragia secca, aristolochia, pietro parti eguali.

14. *Empiastro di Filocrate per estraere, e suppurare.*

Inoltre v'è quel di Filocrate, che tiene in se, sale ammoniaco P. vii. \* aristolochia P. viii. \* cera, trementina, fuligine d'incenso ana P. xv. \* schiuma d'argento P. xxxii. \* Alle quali cose accio ancora suppurino si aggiungono, iride P. iij. \* galbano P. vi. \*

15. *Empiastro πῦωδες per estrarre.*

Ottimo per estrarre si è quello, che dalla somiglianza, che tiene col fucidume i Greci lo chiamano πῦωδες (*vbipodes*). Contiene mirra, zafferano, iride, propoli, bdellio, balaufti, alume scissile, e rotondo, misì, calciti, vetriolo cotto, opopanace, sale ammoniaco, visco, ana P. iv. \* aristolochia, P. viii. \* squama di rame, P. xvi. \* trementina P. xxv. \* cera, sevo di vitello, o di toro, o di becco, ana P. c. \*

16. *Empiastro di Ecateo per estrarre.*

Co'l' autorità di Ecateo fassi un empiastro di simil sorta con queste cose: galbano P. ij. \* fuligine d'incenso P. iv. \* pece P. vi. \* cera, e tre-

## CAPO DECIMO NONO. 31

e trementina ana P. viii. \* alle quali cose si mescola un poco d'unguento irino.

### 17. *Empiastro Alessandrino verde per estrarre.*

Si trova l'empiaastro Alessandrino verde efficace per lo stesso. Contiene alume scissile P. viii. \* sale ammoniaco P. vii. \* squama di rame P. xvi. \* mirra, incenso, ana P. xviii. \* cera P. cl. pece colofonia, o ragia di pino P. cxc. \* olio un'emina, aceto un seltario.

### 18. *Degli Empiastri corrosivi.*

Sonovi poi alcuni empiaastri corrosivi, che i Greci dicono *σηπτικὰ* (*septicì*) qual è quello, che contiene trementina, fuligine d'incenso ana P. ij. \* squama di rame P. i. \* ladano P. ij. \* alume altrettanto, schiuma d'argento P. iv. \*

### 19. *Empiastro, che mangia il corpo, scioglie le ossa, e trattiene la carne, che troppo cresce.*

Gagliardamente ancora corrode, e scioglie l'ossa altresì, come pure trattiene la carne, che troppo cresce quello, che contiene schiuma d'argento, squama di rame, ana oncia una, nitro, che non sia stato al fuoco, pietra Asia, aristolochia P. sestanti, cera, trementina, incenso, olio vecchio, vetriolo, sale ammoniaco P. semis. erugine rasa P. bess. aceto seilitico un'emina, vino amineo altrettanto.

### 20. *Em-*

## 32 LIBRO QUINTO

20. *Empiaſtri contro le morſicature , e altre ferite fatte di poco . Empiaſtro nero di Diogene .*

Contro le morſicature ancora ve ne ſono degli appropriati ; qual n'è quello di Diogene di color nero : che contiene bitume , cera , ragia di pino ſecca , ana P. xx. \* ſchiuma d'argento P. c. \* olio un ſeftario . Oppur quello , in cui n'è ſquama di rame P. iv. \* ceruſſa , ed erugine raſa ana P. viii. \* ammoniaco P. xii. \* cera , ragia di pino ana P. xxv. \* ſchiuma d'argento P. c. \* olio un ſeftario . Ovvero quello , che racchiude in ſe ſquama di rame P. xiv. \* galbano , P. vi. \* ceruſſa , ed erugine raſa ana P. viij. \* ammoniaco P. xii. \* cera , ragia di pino ana P. iv. \* nelle quali coſe cuoceli la ſchiuma d'argento .

21. *Enfeſino Empiaſtro roſſo : buono allo ſteſſo .*

Convien altresì a queſto l'empiaſtro roſſo , che diceſi Efeſio . Contiene trementina P. ij. \* galbano P. iv. \* minio ſinopico P. vi. \* fuligine d'incenſo P. vi. \* cera P. viii. \* ſchiuma d'argento lvi. \* olio vecchio un' emina .

22. *Altro al medefimo effetto .*

Parimente quello , che n'è compoſto delle coſe ſeguenti : ſquama di rame , fuligine d'incenſo ana P. iv. \* galbano P. vi. \* fale ammoniaco P. xii. z. \* cera P. xxv. \* olio emine tre , E tali coſe ſ' applicano ancora alle ferite fatte di freſco .

23. *Em-*

## CAPO DECIMO NONO. 33

23. *Empiastri λευκά (leucà) cioè bianchi proprij delle ferite non gravi, e principalmente de' vecchi.*

Sonovi ancora altri empiastri bianchi piacevoli, chiamati da' Greci λευκά (leucà) adattati per lo piu a ferite non gravi, e principalmente di vecchi. Qual n'è quello, che contiene cerussa P. lii. \* sevo di vitello, curato, e cera ana P. lviii. \* olio emine tre, nelle quali cuocesi la suddetta cerussa.

24. *Empiastro Elefantino. (a)*

Altro, che fassi di cerussa P. xx. \* cera P. lv. \* olio un' emina, acqua un sestario, le quali cose allorché si aggiungono alla cerussa, o alla schiuma d'argento dee saperfi, che queste debbon cuocersi in quelle. La suddetta composizione poi ell'è bianchissima, e perciò dicesi elefantina. (b)

25. *Empiastri lenitivi.*

Sonovi altresì alcuni empiastri lenitivi, che per lo piu i Greci chiamano λιπαρά (liparà) come quello, che n'è composto di minio P. iv. \* schiuma d'argento P. xxv. \* cera, e grasso porcino ana P. xxxv. \* rossi d'uovo quattro.

*Celso Volg. Tom. II.*

C

26. *Em-*

(a) *Orib. Synops. l. 3.*

(b) Cioè del color dell'avorio. *Emplastrum hoc tactu blandissimum est adhaerendo pertinax, refrigeratorium vim mediocrem habet, cujus auxilio exulceratis partibus ne quid influat, impedit, & jam influxum denuo ad partes extimas retudit.*

# 34 LIBRO QUINTO

## 26. Empiaſtro lenitivo.

Altra ſimile compoſizione: cera, tremen-  
tina, ana P. v. \* ceruſſa P. viii. \* ſchiuma  
d'argento, ſeccia di piombo, (che i Greci  
chiamano *σκωρίαν μολυβδα* *ſcortian molibdu*)  
ana P. x. \* olio cecino, e mirtino ana un  
terzo d' emina.

## 27. Empiaſtro lenitivo di Arcagato.

Evvi un' altra compoſizione, che ſi attri-  
buiſce ad Arcagato: miſi cotto, rame bru-  
ciato ana P. iv. \* ceruſſa cotta P. viii. \* tre-  
mentina P. x. \* ſchiuma d'argento P. vi. \*

## 28. Empiaſtri dello ſteſſo genere lenitivi.

Sonovi altreſi della ſteſſa fatta altri em-  
piaſtri, come R. ſchiuma d'argento, cera,  
graffo di porco, ana P. xxvii. \* roſſo d'uo-  
vo cotto, olio roſato un' emina. Oppur  
queſta compoſizione: cerotto fatto di olio  
mirtino parti tre, graffo porcino la quar-  
ta parte, un poco di ſeccia di piombo.  
O queſt' altra: ſchiuma d'argento mezza  
libra, cotta in un' emina d'olio, ed in un'  
altra d'acqua di mare, finattantoche finirà  
di bollire, a cui ſi aggiunga un poco di  
cera. Ovvero queſta: cera, ſevo, ſtibio,  
ſchiuma d'argento, ceruſſa, porzioni egua-  
li.

## C A P O XX.

*De' Pastelli, e prima di quei, che servono ad unire, e sanare le ferite fresche.*

**I** Pastelli ancora sono buoni a cose diverse (a). Mercechè sono atti ad unire, e sanare le ferite fresche. Come si è quello, che racchiude calciti, misì, schiuma di nitro, fior di rame, galla, alume scissile, medio-cemente cotto, ana P. i. \* rame bruciato, balausti, ana P. iij. \* Questo deve si distemperar in aceto, ed in tal guisa empiastrarsi quando fa d'uopo di unir la ferita. Ma se il luogo n'è nervoso, o mescoloso, è meglio mescolarlo col cerotto in guisa, che otto parti siano di quello, la nona di questo.

1. *Altro Pastello ad unir le ferite.*

Altro al medesimo effetto. N'è fatto delle cose seguenti: bitume, alume scissile, ana P. i. \* rame bruciato P. iv. \* schiuma d'argento P. xi. \* olio un sestario.

2. *Del Pastello Sfragide, che compose Polida per unir le ferite.*

Ma rinomatissimo n'è quel di Polida: (b)

C 2

chia-

(a) *Pastillorum tria sunt genera, quorum unum potui datur, alterum in alvum iniicitur, tertiumque illitionibus servit. Celsus hoc loco tantum de his, quae illinuntur, meminit.*

(b) *Cael. Aurel. de acuti morbis 3. 3.*

## 36 LIBRO QUINTO

chiamato *σπαραγίς* (*sfragide*). Il quale contiene alume scissile P. iv. \* vetriolo P. ij. \* mirra P. v. \* aloe altrettanto, balauſti, ſiel di toro, ana P. vi. \* le quali coſe peſtate ſi meſcolano con vino auſtero.

### 3. *Paeſtello alle ulceri ſordide, e nerezza nelle orecchie, naſo, parti vergognoſe, e loro infiammazione.*

Per le ulceri ſordide, e la nerezza nelle orecchie, naſo, parti vergognoſe, e loro infiammazione: borace P. i. \* vetriolo, alume ſciſſile ana P. ij. \* ſcorza di alicacabo P. iv. \* minio P. vi. \* ſchiuma d'argento P. xii. \* ceruſſa P. xvi. \* che ſi uniſcono con aceto, e quando debbon adoprarſi ſi diſtemperano.

### 4. *Paeſtello di Androne per l' infiammazione dell' Ugola, alla ſordidezza delle parti naturali, ancora incancherite.*

Vi è poi quello d' Androne (a) all' ugola infiammata, alla ſordidezza delle parti naturali, ancor incancherite: ha galla, vetriolo, mirra ana P. i. \* ariſtolochia, alume ſciſſile ana P. ij. \* balauſti P. xxv. \* uniti inſieme col vin paſſo, e qualor ſi dee uſare, diſfatti in aceto, o vino a miſura, che 'l male, il quale dovrà curarſi, piu reſiſtente, o piu leggiero faranne.

### 5. *Paeſtello per le crepature dell' ano, per l' emorroidi, e pel cancro.*

Appropriato per le crepature dell' ano, o per

(a) *Orib. Synopf. 3. Gal. de comp. medic. ſec. loco 3. 3.*



## CAPO VENTESIMO. 37

per le vene emorroidali, o al cancro, è questo: erugine P. ij. \* mirra P. iv. \* gomma P. viii. \* incenso P. xii. \* stibio, opio, aca-  
cia, ana P. xvi. \* le quali cose pestansi con  
vino, e al tempo d'adoprarle nello stesso  
si stemperano.

### 6. Pastello per iscacciar il calcolo dalla vescica.

Il calcolo dalla vescica pare, che venga  
cacciato fuori con l'orina da questa compo-  
sizione: cassia, zaffrano, mirra, costo, nar-  
do, ciunnamomo, regolizia, balsamo, iperi-  
co in parti eguali si pestano; dappoi vi s'istil-  
la vino piacevole, e fanno si pastelli, che  
ognuno contenga P. i. \* e di questi se ne da  
uno per ogni giorno la mattina a digiuno.

## C A P O XXI.

### De' Pessi.

**Q**ueste tre sorte di composizioni, cioè,  
che consistono in malammi, empiastri,  
e pastelli ne danno un uso grandissimo, e  
molto vario. Ma sonovi però altre compo-  
sizioni altresì di utilità: come quelle, che  
pongonsi sotto alle femmine, e i Greci le  
chiamano *παισίδις* (*pessis*) (a). Coteste an-  
no questo di proprio: i medicamenti com-  
posti si incorporano con lana morvida, che  
s'introduce nelle parti naturali.

C 3

I. A

(a) I pessi solamente per l'utero si adoprano.

## 38 LIBRO QUINTO

*r. A far venir fuora il sangue.*

Per tirar fuora il sangue s'aggiugne a due cauni (a) nitro P. l. \* o si pesta seme di aglio, e si aggiugne un poco di mirra, e s'incorpora con unguento susino. Oppure la parte di dentro del cocomero salvatico disassi con latte di donna.

*2. Per mollificar la natura.*

A mollificar la natura si uniscono insieme rosso di uovo, e sien greco, olio rosato, e zafferano. Oppur elaterio P. iij. \* sale altrettanto, uva taminia P. vi. \* s'incorporano con miele.

*3. Altra composizione di Pessò, giovevole allo stesso effetto.*

Per insegnamento di Boeto ve n'è un'altra: zafferano, trementina, ana P. iv. \* mirra P. iij. \* olio rosato P. i. \* sevo di vitello P. iij. \* cera P. ij. \* si mescolano insieme.

*4. Pessò di Numenio per la infiammazione della vulva. (b)*

Ottima poi contro le infiammazioni della vulva si è la composizione di Numenio, che contiene: croco P. iij. \* cera P. i. \* burro P. viij. \* grasso di oca P. xij. \* rossi d'uovo cotti n. ij. olio rosato meno di un ciato.

*5. Ad espellere la creatura morta.*

Se poi n'è morta dentro la creatura acciò con piu facilità si espella convien pestare nell'

(a) Sorta di fichi così detti dal luogo dove nascono.

(b) Questo pessò puo usarsi senza pericolo alcuno.

CAPO VENTESIMO PRIMO. 39

nell'acqua la scorza di pomo granato, e di essa servirsi. (a)

6. *Se la Donna cade per mal d'utero, qual cura le si convenga.*

Se la Donna cade per vizio uterino, convien abbruciare ciocciole co' suoi gusci (b), e pestati aggiugnervi miele.

7. *Se la Donna non comprende.*

Se non comprende, si mollifichi grasso di leone con olio rosato.

C A P O XXII.

*De' Medicamenti, di cui se ne serviamo secchi.*

1. *A corrodere la carne, che troppo cresce.*

**S**Onovi talune mesture di Medicamenti, di cui ce ne serviamo secche, non incorporate insieme, in guisa, che le possiamo sparger sopra: oppur con qualche liquore misti con que'n'ungiamo: qual è quello per consumare la carne sopracrescente, che contiene squama di rame, fuligine d'incenso ana P. i. \* erugine P. ij. \* Queste cose stesse poi purgano l'ulcere se sono unite col miele; e con la cera le riempiono. Il misi altresì, e la galla mescolati in parti eguali consumano il corpo: e tali cose, o possono aspergersi secche, ovvero empiastrarsi incorporate con eadmia.

C 4

2. *Per*

(a) *Si dubita se il malicorio abbia tal forza.*

(b) *Neppur le chiocciole sembra, che n'abbiano una tal virtù.*

## 40 LIBRO QUINTO

2. *Per fermare la putrefazione, che non si avvanzi di piu, e per consumarla piacevolmente, composizioni diverse.*

Trattiene poi la putrefazione, e non lascia avanzare di piu, e piacevolmente la consuma miel con lenticchia, o col marrubio, o con le foglie di ulivo cotte prima in vino. Parimente fertula campana cotta in mulso, e dappoi pestata. Ovvero calcina con cerotto, o noci amare con aglio talmente, che di questo siano la terza parte, ed a cotale cose s'aggiunga un poco di croco. Oppur quello, che racchiude schiuma d'argento P. vi. \* corno bovino abbruciato P. xii. \* olio mirtino, e vino, ana ciati tre. Ovvero quello, che n'è composto: balausti, vetriolo, aloe ana P. ij. \* alume scissile, incenso, ana P. iv. \* galla P. viij. \* aristolochia P. x. \* Con maggior forza opera lo stesso, e di piu con abbruciare, orpimento con calcite, o nitro, o calcina, o carta abbruciata. Parimente sale con aceto. Oppur quella mestura, che contiene calcite, balausti, aloe, ana P. ij. \* alume scissile, incenso, ana P. iv. \* galla P. viij. \* aristolochia P. x. \* miele quanto è bastante ad incorporare le dette cose. Ovvero: cantaridi, solfo, ana P. j. \* loglio P. iij. \* alle quali cose s'aggiugne pece liquida, quanto n'è sufficiente per unire. Oppur calcite con ragia, e ruta mescolata: o di frige con la suddetta ragia: o uva taminia  
con

## CAPO VENTESIMO SECONDO. 41

con pece liquida. Anno poi la forza medesima, e le feccie del vino abbruciate, e calcina, e nitro porzioni eguali. Parimente alumine scissile P. i. \* incenso, sandracca, nitro ana P. i. \* galla P. viii. \* aristolochia P. x. \* miele quanto basta.

### 3. *Composizione di Era.* (a)

Vi è altresì la composizione di *Era*, che racchiude, mirra, calcite, ana P. ij. \* aloe, incenso, alume scissile, ana P. iv. \* aristolochia, galla acerba, ana P. viij. \* scorza di pomo granato pesta P. xx. \*

### 4. *Composizione dell'Ebreo.*

Vi è quella dell'*Ebreo*: in cui sono calcina parti due, nitro del più rosso, che si trovi la terza parte: le quali cose s'incorporano coll'orina di un fanciullo finattanto, che prenda consistenza come di succidume. Ma il luogo, cui conviene applicarla devesi sovente bagnare.

### 5. *Composizione di Jolla.*

Jolla poi mescolava carta bruciata, sandracca, ana P. i. \* calcina P. ij. \* P. orpimento altrettanto.

6. *A profusuj di sangue, o dalla membrana del cervello, o da altre parti; e alla cancrena, e per cicatrizzare, e per reprimere la carne sopraccrescente.*

Se poi sgorga il sangue dalla membrana, che sta sopra 'l cervello vi si spruzzi sopra  
rosso

(a) *Orib. Syn. lib. 3. de Pastillis.*

rosso d' uovo abbruciato, e spolverizzato. Se viene il sangue da parte diversa, orpimento, squama di rame ana P. i. \* sandracca P. ij. \* marmo cotto P. iv. \* vi si debbono tali cose sparger sopra. Le medesime resistono alla cancrena. Per cicatrizzare, squama di rame, fuligine d' incenso ana P. ij. \* calcina P. iv. P. Le cose stesse trattengono la carne, che oltre 'l dovere ne cresce.

7. *Composizione di Timeo pel fuoco sacro, e pel cancro.*

Ma Timeo pel fuoco sacro, e pel cancro servivasi delle cose seguenti: mirra P. ij. \* incenso, vetriolo, ana P. iij. \* sandracca, orpimento, squama di rame, ana P. iv. \* galla P. vi. \* cerussa abbruciata P. viij. \* Le cose medesime o secche, o incorporate con miele operano lo stesso.

8. *Per provocar gli stranuti.*

Gli stranuti poi si provocano, o con l' elleboro bianco, o con lo struzio posti nelle narici: oppure con le seguenti cose mescolate insieme: pepe, elleboro bianco, ana P. \* iij. castoreo P. i. \* schiuma di nitro P. ii. \* struzio P. iij. \*

9. *Gargarismi di quali cose debban farsi.*

I Gargarismi poi o si fanno per levigare (*ammollire*), o per reprimere, o per tirar fuori. Ammolliſcono il latte, o il cremor di tiffana (*d' orzo*), o di semola; v' è prima l' acqua, in cui sia cotta lenticola, o ro-  
sa,

sa, o rovo, o pomo cotogno, o palmole.  
Tirano fuora la senape, il pepe.

## C A P O XXIII.

*Degli Antidoti, e de' mali, a cui giovano.*

**G**Li Antidoti di rado, ma talvolta son molto necessarj, essendochè porgon soccorso ne' casi piu gravi. Si danno quelli per ordinario a' corpi percosi, o da battiture, o per esser caduti da alto, oppur ne' dolori delle viscere, di coste, fauci, e parti interne. Ma specialmente debbon ricercarsi contro i veleni inseriti ne' nostri corpi, o per mezzo di morcature, o nel cibo, o con la bevanda.

1. *Composizione d' un Antidoto.*

Ve n'è uno, che contiene opio P. \* ij. acoro, malobatro P. v. \* iride illirica, (o Fiorentina) gomma ana P. ij. \* aniso P. iij. \* nardo gallico, foglie di rosa secche, cardamomo ana P. \* iv. petroselino P. \* iij. ii. trifoglio P. \* v. cassia nera, filli, bdellio, carpobalsamo, seme di papavero bianco ana P. \* ij. storace P. \* v. ii. mirra, opopanace, nardo siriano, incenso maschio, sugo d'ipocistide ana P. vi. \* castoreo P. \* vi. costo, pepe bianco, galbano, ragia di terebinto, croco, fior di giunco rotondo ana P. \* vi. ii. regolizja P. \* viij. ij. le quali cose mescolansi con miele, overo vin passo,

2. Al-

## 44 LIBRO QUINTO

### 2. *Altro Antidoto chiamato Ambrosia composto da Zopiro per il Re Tolemeo.*

L'altro, che dicesi aver composto Zopiro per il Re Tolemeo, e averlo chiamato *Ambrosia*, è fatto di queste cose: costo, incenso maschio ana P. v. \* pepe bianco P. ij. \* fior di giunco rotondo P. \* ij. cinnammomo P. \* iij. cassia nera P. \* iv. croco cilicio P. \* iv. ij. mirra la qual chiamano *stacten* P. v. \* nardo indico P. \* v. ij. quali cose tutte pestate si mescolano con miel cotto, dappoi quando deve adoperarsi se ne disfa in una bevuta di vino in quantità d'una fava Egizia.

### 3. *Antidoto di Mitridate.*

Il piu celebre poi è quello di Mitridate, che pigliandolo ogni giorno quel Re dicesi, aver reso il suo corpo sicuro da ogni pericolo di veleno. Contiene queste cose: costo P. \* ij. acoro P. \* v. Ipperico, cumino, sagapeno, sugo d'acazia, iride illirica, cardamomo ana \* ij. aniso \* iij. nardo gallico, radice di genziana, foglie di rose secche ana \* iv. opio, petrosेमolo ana \* iv. ij. cassia, sellaro, loglio, pepe longo ana P. \* vi. storace P. \* v. ij. castoreo, incenso, sugo d'ipocistide, mirra, opopanace, ana P. \* vi. malobatro in foglie \* vi. fior di giunco rotondo, trementina, \* vi. galbano, seme di dauco cretico ana P. \* v. ij. nardo, opobalsamo ana P. \* vi. ij. tlapsi P. \* vi. ij. radice pontica P. \* vij. croco, zenzevero, cinnamomo



## CAPO VENTESIMO TERZO. 45

momo ana P. \* viij. Pestate queste cose si mescolano con miele, e darfi in vino contro il veleno in quantità d'una noce Greca. Negli altri mali del corpo basta in quantità d'una fava Egizia, o d'un moco, secondo la gravezza loro.

## C A P O XXIV.

### *Degli Acopi.*

#### 1. *Acopo utile a' nervi.*

**G**Li Acopi ancora sono utili a' nervi, qual è quello, che contiene fior di giunco rotondo P. \* ij. xxii. costo, giunco quadrato, coccole d'alloro, ammoniaco, cardamomo ana P. \* iv. vij. mirra, rame bruciato ana P. \* vij. Iride illirica, cera ana P. \* iiii. calamo aleffandrino, giunco rotondo, aspalato, xilobalsamo ana P. \* xviii. sevo P. \* j. unguento irino un ciato.

#### 2. *Acopo Eleode utile a' nervi.*

L'altro, che chiamano *Eleode*, fassi così: cera P. \* ij. olio altrettanto, ragia di terebinto quanto una ghianda, si cuocono insieme, dappoi messe nel mortaro si pestano, e vi s'infonde ogni poco un acetabolo di miele ottimo, indi unguento irino, e olio rosato ana ciati tre.

#### 3. *Eneristi per purgar, ed empier l'ulceri.*

*Eneristi* poi chiamano i Greci i liquidi co' quali

## 46 LIBRO QUINTO

quali si unge : come quello , che farsi per purgare , ed empier l'ulceri , principalmente fra' nervi , mescolando in porzioni uguali butirro , midollo di vitella , sevo di vitello , grasso d'oca , cera , miele , trementina , olio rosato , olio cecino . Le quali cose separatamente si liquefanno , dappoi liquide si mescolano , ed insieme poi si agitano . E questo è piu purgativo , di vantaggio poi mollifica se invece di olio rosato s'infonde cipro .

### 4. *Al fuoco sacro .*

Al fuoco sacro schiuma d'argento P. \* vi. corno di bove bruciato P. \* ij. si pestano insieme , e vi si aggiugne vino di quando in quando , e specialmente quello , che chiamasi *Sil* , e vino mirteo , finche se ne consumino ciati tre dell'uno , e dell'altro .

## C A P O XXV.

### *Delle Pillole .*

1. *Pillola per far venire il sonno , e per togliere il dolore , ed insieme per concuocere .*

**L**E Pillole parimente sono di piu sorte , e si fanno per varj effetti . *Anodine* chiamansi quelle , che per mezzo del sonno tolgono il dolore , delle quali non convien servirsi se non vi è gran necessità ; imperocchè sono fatte di medicamenti gagliardi , e nocivi allo stomaco . E' valevole però ancora per  
con-

CAPO VENTESIMO QUINTO. 47

concuocere quella, che contiene (a) opio, galbano, ana P. \* j. mirra, castoreo, pepe, ana P. \* ij. Delle quali basta inghiottire la quantità d'un moco.

2. *Pillola più gagliarda per il sonno.*

L'altra peggior per lo stomaco, per il sonno più possente farsi di queste cose (b). Mandragora \* ij. seme d'opio, seme di Jusquiamo ana \* iij. le quali cose si pestano con vino, e basta prender la quantità di vino, che si è posta di sopra.

3. *Pillola per guarir molti dolori, per mezzo del sonno.*

Se alcuno tormentano i dolori di testa, ovvero ulceri, o lippitudine, o dolor di denti, o difficoltà di respiro, o dolori d'intestino, o infiammazion dell'utero, o sciatica, o mali di fegato, o di milza, o petto, o se qualche donna cade per mal d'utero, e perde la favella, rimedia al dolore per mezzo del sonno questa pillola (c): filli, acoro, seme di ruta salvatica ana P. \* ij. castoreo, cinnamomo ana P. \* ij. opio, radice di pance, mandragora, mele secche, fior di giunco rotondo ana P. \* ij. grani di pepe n. lvi. Queste cose pestate prima da per se si pestano dappoi tutte insieme infillandovi vin  
passo

(a) Si può prender senza nocimento questa Pillola se si scema un poco la quantità dell'opio.

(b) Non è da prendersi essendo troppo gagliarda.

(c) Pillola squisitissima.

## 48 LIBRO QUINTO

passo di quando in quando finattantoche si assodi come succidume, e un poco di quella materia, o s'inghiotte, o si disfa in acqua, e si dà a bere.

### 4. *Altra Pillola buona a molte cose.*

Anzi, che un manipolo di papavero salvatico, (a) quanto se ne puo prender colla mano quando è già maturo per cavarne il sugo si pone in un vaso, e vi si getta sopra acqua, che lo cuopra, e così cuocesi. Quando quel manipolo è ben cotto, e bene spremuto, nell'istesso vaso, si getta via, e con quell'umore si mescola ugual porzione di vin passo, e si fa bollire finche rassodi come feccia. Quando si è disfritta si fanno pillole in grandezza d'una fava nostra, ma fervono a piu cose. Attesoche conciliano il sonno o prese da per se, o date in acqua, e tolgono i dolori degli orecchi aggiuntavi una picciola quantità di sugo di ruta, e vin passo. Stagnano la dissenteria liquefatte in vino, e l'inflammazione dell'utero mescolate con cerotto fatto di rosa, se vi sarà aggiunto ancora un poco di croco, e applicata alla fronte stemprata in acqua trattiene la pituita, che fluisce verso gli occhi.

### 5. *Pillola per conciliare il sonno vietato dal dolore dell'utero.*

Parimente se il dolore dell'utero impedisce il sonno R. croco P. \* ij. aniso, mirra, ana

(a) Si può dar con sicurezza.

**CAPO VENTESIMO QUINTO. 49**

ana P. \* j. opio P. \* iiij. seme di cicuta  
P. \* viij. Misce e infondi in vino vecchio,  
e in quantità di un lupino si disfa in tre  
ciati d'acqua. Questa però con pericolo si  
da nelle febbri.

**6. Pillola per guarire il fegato.**

Per guarire il fegato R. Nitro P. \* ij. cro-  
co mirra, nardo gallico ana P. \* j. si me-  
scolano con miele, e dassene in quantità d'  
una fava Egiziaca.

**7. Per risanar i dolori de' fianchi.**

Per sanare i dolori de' fianchi R. pepe  
aristolochia, mirra ana porzioni uguali.

**8. Per risanare i dolori del petto.**

Per sanare i dolori del Petto R. nardo  
P. \* j. incenso, cassia ana P. \* iiij. mirra,  
cinamomo ana P. \* vi. croco P. \* viij.  
ragia di terebinto onc. iiij. miele emine tre.

**9. Pillola d'Atenione per la tosse.**

Per la tosse la pillola d'Atenione. Mir-  
ra, pepe ana P. \* j. castoreo, opio, ana  
P. \* j. le quali cose separatamente pestate si  
mescolano di poi insieme e in quantità d'  
una fava nostrana si danno due pillole la  
mattina, e due la sera prima d'andare a  
dormire.

**10. Pillola d'Eraclide Tarentino per  
la tosse, e per il sonno.**

Se la tosse impedisce il dormire, all'uno,  
e l'altro è la pillola d'Eraclide Tarenti-  
no. Croco P. \* j. cinamomo, castoreo, o-  
Celfo Volg. Tom. II. D pio

50 LIBRO QUINTO

pio ana P. \* j. mirra, pepe lungo, costo, galbano ana P. \* ij. mescola insieme, e fa pillole.

11. *Pillola per purgare le ulceri nelle fauci che toffono.*

Che se si debbono purgare le ulceri nelle fauci, che anno tosse. R. panace, mirra, ragia di terebinto ana P. \* v. Galbano P. \* ij. Istopo P. \* ij. Si pestino, e vi si aggiunga un'Emina di miele, e se n'inghiottisca quanto se ne puo prendere con un dito.

12. *Pillola di Cassio medico detta Colica al dolor del ventre.*

La Pillola di Cassio per i dolori colici è composta di queste cose. Croco, aniso, castoreo ana P. \* iij. Petrosemolo P. \* iij. pepe lungo, e tondo ana P. \* v. Opio, giunco ratondo, mirra, nardo ana P. \* vi. le quali cose si mescolano con miele. E puo di per se inghiottirsi, e prendersi in acqua calda.

13. *Per gittar fuora il feto morto ovvero le seconde.*

Il feto morto, ovver le seconde si gettan fuora da una bevuta d'acqua, alla quale sia aggiunto piu tosto gutta ammoniacale ammoniaco P. \* j. ovver dittamo cretico P. \* j.

14. *Che cosa debba darfi a quelle che partoriscono con difficoltà.*

A quel-

CAPO VENTESIMO QUINTO. 51

A quelle donne che partoriscono con difficoltà devesi dare a digiuno, Ecifimo in vino tiepido.

15. *Per ajutare la voce.*

Ajuta la voce incenso P. \* j. dato in due ciati di vino.

16. *Per la difficoltà d'orinare.*

Contro la difficoltà d'orinare R<sup>x</sup>. Pepe lungo (a) castoreo, mirra, galbano, opio, croco, costo ana P. \* j. storace, trementina ana restanti miele, assenzo un ciato. Della quale composizione se ne deve dare la mattina, e avanti cena in quantità di una fava Egiziaca.

17. *In che modo si faccia la Composizione Arteriacce.*

L'Arteriacce fassi in questo modo R<sup>x</sup>. Cassia, iride, cinnamomo, nardo, mirra, incenso ana P. \* j. croco P. \* j. pepe grani xxx. si cuocono in tre seltarj di vin papo, finchè queste cose affodino come miele; ovvero R<sup>x</sup>. Croco, mirra, incenso ana P. \* j. si infondino nella stessa quantità di vin passo, e nello stesso modo si cuocono, ovvero cuoconsi tre emine dello stesso passo finattantochè una goccia cavata fuori s'indurisca, e gli si aggiugne cassia trita P. \* j.

(a) *Se procede però da causa fredda.*

*Delle cinque sorti de' nocumenti del corpo.*

**A** Vendo io esposte le virtù de' medicinali convien che dica delle sorte de' nocumenti del corpo. Questi sono cinque. Quando qualche cosa esteriormente offende, come nelle ferite; quando qualche parte dentro se stessa si corrompe, come nel Cancro, o Gangrena; quando si genera dentro alcuna cosa, come la pietra nella vescica; quando cresce qualcosa piu del dovere come la vena che gonfiando si converte in varisce; quando manca qualche cosa, come quando qualche parte è più corta del giusto. Fra questi altri ve ne sono, a' quali più giovano i medicamenti, altri che più richiedono la mano. Per tanto differendo quelli che principalmente vogliono la mano ed il ferro, dirò al presente di quelli a' quali più fa di bisogno de' medicinali. Dividerò però anche questa parte di cura come l' anteriore, e prima dirò delle cose che possono occorrere a qualsisia parte del corpo, in secondo luogo di quelle che offendono determinate parti. Darò dunque principio dalle ferite.

*1. Delle ferite che si fanno con ferro.*

Ed in queste dovrà soprattutto sapere il  
medi-



medico, quali sian insanabili, quali difficilmente si curano, e quali speditamente guariscono. Perche è cosa da prudente non dar di mano alla cura di quel male, che non può risanarsi per non apparire d'aver ammazzato colui, che la propria disgrazia n' ha ucciso. In secondo luogo, quando v'è gran timore senza una certa disperazione convien palesare a i congiunti portar pericolo il caso dell'infermo, ed esser difficile la cura, acciò se l'arte sarà superata dal male non paja, o esserne egli stato ignorante, ovver che gli abbia ingannati. Ma siccome stanno bene ad una persona prudente tali cose, così ancora è da Ciarratano ingrandire una cosa piccola per parere d'aver fatta una operazione grande. Ed è giusto che si obblighi col confessare la spedizione della cura, affine che piu ansiosamente provveda che cio che di sua natura è piccolo, per negligenza di chi medica non si renda maggiore.

2. *Quali ferite sieno incurabili.*

Non può risanare chi ha percossa la base del cervello, il cuore, lo stomaco, vena porta, le porte del fegato, la spinalmidolla, o chi è ferito nella sostanza del Polmone, il polmone ferito nell'estremità può guarire, nell'intestin digiuno, o altro de'tenui, nel ventricolo, o ne' reni, o a chi sieno tagliate glandole, vene, o arterie intorno le fauci.

3. *Ferite difficili da risanarsi.*

Con difficoltà risanano quei, che anno ferito in qualche parte il polmone, eccettuato nell'estremità la sostanza del fegato, la membrana, la qual contiene il cervello, la milza, l'utero, la vescica, e alcuno degl'intestini, o il diaframma. (a) Sono altresì in pericolo grande coloro, a' quali il ferro si è penetrato fino a vene (b) grandi, e ascosse sotto le spalle, o nelle ginocchia. Pericolose parimente sono le ferite in qualunque luogo siano vene (c) delle maggiori, perche posson uccider l'uomo co' la profusione del sangue. (d) E cio avviene non solamente sotto l'ascelle, e sotto i ginocchi, ma in quelle vene altresì che giungono all'ano, e a' testicoli. Oltre a queste si è cattivo la ferita fatta sotto le braccia nella parte d'avanti della coscia, nelle cavità, negli articoli, o fra le dita. (e) Parimente quella che n'ha offeso un muscolo, nervo, arteria, membrana osso, o cartilagine.

4. *Ferite più facili da guarirsi.*

La ferita piu sicura si è quella che vien fatta nella carne (f) e queste ancora inquanto al luogo sono e peggiori, e miglio-

ri.

(a) Ipp. 6. *Afor.* (b) 2. *Pred.* XIV. 2.(c) *Vene grosse, o arterie.* (d) 11. *Pred.* XIX. 7.(e) *Ivi.* (f) *Nella parte muscolosa: così disse Ipp. Conc. Not. III. 390. e de morb. III. 3.*

ri. In quanto al modo puo caufar pericolo tuttociò ch'è grande.

5. *Offervazioni nella forte della ferita, e nella figura.*

Trovafi anco qualche differenza nella specie, e nella figura della ferita ; poiche peggior è quella che n'è ammaccata eziandio, di quella che puramente è tagliata, di guifa che meglio fi è l'effèr percoffo da ferro tagliente che da un ferro ottuso. Peggior ancora fi è la ferita, da cui qualche parte fta recifa: o da cui tagliata da una parte, dall'altra fta pendente. La peggiore fi è la ferita di figura rotonda : la piu ficura è la dritta come una linea. Quanto poi più fi accofta a quella, o a quefta figura, ell'è migliore, o peggiore.

6. *Operazion dell'età, del corpo, della vita, e del tempo.*

Fa però eziandio qualche differenza l'età, il corpo, il modo di vivere, e la ftazione, ftanteche più facilmente rifana un ragazzo, o giovane di un vecchio, più il robufto che il debole, colui che non è troppo gracile ne troppo graffo, che fe farà una di quefte due cofe; il fano del malfano, l'affaticato del pigro, il fobrio, e temperato di quel che è dato al vino, ed alla luffuria. Il tempo piu adeguato per la cura è la Primavera, oppure ne troppo caldo, ne troppo freddo, attesoche danneg-

gia le ferite ed il troppo caldo, e'l troppo freddo, ma molto peggiore però si è la varietà della stagione, onde dannosissimo è l'Autunno.

*7. Segni delle offese interne.*

Per lo più le ferite si vedon co' gli occhi, ed alcune ce le scuoprono i siti de' luoghi, i quali altrove abbiamo dichiarato, quando dimostravamo il sito delle parti interne. Ma essendo alcune cose in vicinanza importa se la ferita sia nella sommità, o se sia dentro penetrata: onde è necessario poner' avanti gli occhi li segni per mezzo i quali possiamo sapere ciò, che dentro sia seguito, dal che ne risulta o speranza, o disperazione.

*8. Segni della ferita del Cuore.*

Se sarà ferito il cuore vien fuori in abbondanza il sangue, manca il polso, vengono sudori freddi, e puzzolenti come nel corpo infermo e raffreddate l'estremità prestissimo ne vien la morte.

*9. Segni del Polmone ferito.*

Ferito il Polmone, v'è difficoltà di respiro, esce per bocca sangue spumoso, dalla ferita rosso, ed insieme vien fuori fiato con suono, giova il posare sulla ferita, alcuni senza cagione si alzano, molti se posano su la ferita possono parlare, se in altra parte non parlano.

*10. Segni della ferita del fegato.*

I Se-

## CAPO VENTESIMO SESTO. 57

I Segni del fegato ferito sono questi. Gran spargimento di sangue su la destra parte delle viscere, gl'intestini ridotti verso la spina, gusto di posar sul ventre, punture, e dolori fin alla gola, e al lato delle scapole congiuntole, la bocca aperta. Alle quali cose s'aggiugne alle volte il vomito bilioso.

### 11. *Segni de' reni feriti.*

Feriti poi i reni scende il dolor all'inguine, e a' testicoli, con difficoltà vien l'orina, ed è quella o sanguigna, o schietto sangue.

### 12. *Segni della ferita della milza.*

Se ne è ferita la milza sgorga dalla parte sinistra sangue nero, gl'intestini col ventricolo dalla stessa parte induriscono, ne nasce gran sete, viene in su il dolore, come nella ferita del fegato.

### 13. *Segni della percossa dell'utero.*

Ferito poi l'utero, il dolore è nell'inguine, ne' femini, e cosce. Parte del sangue esce per la ferita, parte per la natura: ne segue il vomito di bile. Alcune perdono la favella, altre escon fuori di se, alcune avendo la mente salda dicono d'esser tormentate dal dolor de' nervi, e degli occhi; e finalmente morendo patiscono gli stessi accidenti della ferita del cuore.

### 14. *Segni del cervello ferito, o sua membrana.*

Se il cervello, o la di lui membrana ha  
rice-

ricevuta ferita, esce il sangue dal naso; e ad alcuni dalle orecchie, e per lo più ne segue il vomito di bile. (a) Alcuni perdono i sentimenti, e chiamati non conoscono. Taluni sono di faccia spaventevole: ad altri si movono gli occhi qua, e là come resoluti, e per ordinario sul terzo, o quinto giorno s'aggiugne il delirio: a molti ancora vien la convulsione de' nervi, la maggior parte poi avanti la morte strappano le fasce, co le quali anno legato il capo, ed espongono al fresco la ferita nuda.

15. *Segni dello stomaco ferito.*

Ferito poi che sarà lo stomaco ne segue il singhiozzo, e il vomito di bile. Se si prende cibo, o bevanda presto si vomita, illanguidisce il polso, si fanno sudori minuti, per i quali si raffreddano l'estremità.

16. *Segni della ferita dell' Intestino digiuno e del ventricolo, e d'altri Intestini.*

Sono comuni i segni della ferita dell'intestino digiuno, e del Ventricolo, imperocchè il cibo, e la bevanda escono per la ferita, le viscere gonfiano, alle volte si getta bile per bocca. Solo l'intestino digiuno ha il sito più sotto. Gli altri intestini o rendono sterco, o odore di quello.

17. *Segni della spinalmidolla ferita.*

Percoffa la spinalmidolla ne vien paralizzata,

(a) Hipp. 6. Aph.

CAPO VENTESIMO SESTO. 59

sia, o stiramento de' nervi, si perde il senso, dopo qualche tempo le parti d'abbasso involontariamente mandano fuori o seme, o orina, o anche sterco.

18. *Segni del Diaframma ferito.*

Se è percosso il Diaframma si ritirano in su le viscere, duole la spina, con difficoltà si respira, esce il sangue spumoso.

19. *Segni della ferita della vescica.*

Nella ferita della vescica dolgono gl'inguini, si ritirano le parti sopra il pube, invece d'orina esce sangue, o dalla stessa ferita scende l'orina, (a) patisce lo stomaco, perciò o vomitano bile, o singhiozzano, ne segue il freddo, e dopo quello la morte.

20. *Del sangue, sanie, e Pus, e loro specie, e quando siano queste migliori, o peggiori.*

Conosciute queste cose, bisogna ora saperne alcune altre appartenenti a tutte le ferite, e alle ulcere, delle quali diremo. Fra queste sarà il sangue, sanie, e Pus. Il sangue da tutti è conosciuto, la sanie è di questo più sottile, in qua, e là crassa, glutinosa, e colorita. Il Pus è sodissimo, bianchissimo più viscoso del sangue dalla ferita fresca, o da quella che già risana. Si fa la sanie nel tempo di mezzo. Il Pus o marcia nell'ulcere che comincia sanarsi. Con-

ten-

(a) *Hipp. 6. Aph.*

tengono parimente sì la sanie, come il Pus alcune specie distinte con nomi greci. V'è certa sorta di sanie ἰχθὺρ μελιχρία ἐλαιώδης qual chiamasi o *Ichore*, o *melicrria*. Vi è certo pus che dicesi *Eleode*; l'*Ichore* è sottile, bianchiccio, esce dalle cattive ulceri, ed in particolare quando per l'offesa d'un nervo è seguita l'infiammazione; la *melicrria* più crassa, e più viscosa bianchiccia, ed alquanto simile al miel bianco. Esce ancor questa dall'ulceri cattive quando sono feriti nervi intorno gli articoli, e fra questi luoghi principalmente nelle ginocchia; l'*Eleode* è sottile, bianchiccio, quasi untuoso di color, e grassezza molto simile ad un olio bianco. Apparisce nelle ulceri grandi che cominciano a risanarsi. Quel sangue poi è cattivo, che si è troppo sottile, o troppo grosso, di color o lissido, o negro, o misto con pituita, o vario. Meglio si è il sangue rosso, caldo, mediocrementemente grosso, non viscoso. Per tanto presto si sanerà quella ferita, dalla quale vien buon sangue. Parimente poi sarà speranza maggiore in quelle, dalle quali fluiscono marcie di miglior sorta. Quella sanie dunque è cattiva, che è copiosa, troppo sottile, livida, o pallida, o negra, o viscosa, o di cattivo odore, o quella, che rode lo stesso ulcere, e la pelle congiuntagli. Migliore è quella non copiosa, mediocrementemente grossa, rossic-

cia.



## CAPO VENTESIMO SESTO. 61

cia, o alquanto bianca, l'ichore peggiore e in abbondanza, grosso, lividiccio, o pallido, viscoso, nero, caldo, di cattivo odore. Più comportabile si è il bianchiccio, e che ha qualità contrarie alle sopradette. La *Meliceria* è mala in copia, e sorda, migliore, più sottile, e meno abbondante. Il Pus di tutte queste marcie è il migliore. Ma quella sarà altresì peggiore, se sarà copiosa, sottile, dilavata, e tanto più se sarà tale sul principio, parimente se sarà di color simile al siero, se pallida, livida, se secciosa o puzzolente, se per altro il luogo non mandi tal'odore. Miglior è quanto è di minor quantità, più grossa, più bianca, come anche se è leggiera, senza odore, ed uguale: nella quantità però deve esser proporzionata alla grandezza della ferita, ed al tempo. Poichè più naturalmente se ne genera nella ferita grande, più non finite ancora l'infiammazioni. L'Eleode parimente peggior' è in copia e poco grasso, e quanto è in minor quantità, e più untuoso, tanto è migliore.

### 21. Rimedio alla profusione del sangue nelle ferite.

Sapute le sopradette cose dopo che alcuno è stato ferito, che sia però sanabile, di subito a due cose devonsi provvedere; che non l'uccida la profusione del sangue, o l'infiammazione; se dubitiamo della pro-

fusione

## 62 LIBRO QUINTO

fusione ( il che si può conoscere dal sito della ferita, e sua grandezza, e dall'impeto del sangue ) s' empia la ferita con asciutte taffe, e vi si ponga sopra una sponga bagnata con acqua fresca , e si prema di sopra co la mano . Se così stagnerà alquanto il sangue , si debbono spesso mutar le taffe, e se asciutte fanno poco effetto, si bagnino co'l'aceto, il qual è molto possente per stagnar il sangue; perciò alcuni gettano quello nella ferita; vi è però un' altra paura, che con troppa violenza estenuata ivi la materia ne cagioni poi una grand' infiammazione . Il che si fa finattanto che non è da servirsi di medicamenti corrosivi, ne adurenti, i quali inducono la crosta, benchè molti di questi stagnino il sangue . Ma se una sola volta dobbiamo servirsene , si ricorre piuttosto a quelli , che fanno l' istesso effetto più piacevolmente . Che se ancor essi sono superati dall' impeto del sangue si prendino le vene , che spargono il sangue, e dentro alla ferita si leghino in due luoghi , e si stringhino , acciò esse si uniscano insieme , ed abbiano le loro bocche chiuse . Quando non può farsi ciò , si può dar loro con ferro prima spento in aceto, ò vino, il ferro infocato ancor con versar molo sangue da quel luogo, nel quale non è nervo, nè muscolo come nella fronte, o sommità del capo; piu comodo

## CAPO VENTESIMO SESTO. 63

dò però è attaccare una coppetta alla parte opposta per tirar colà il corso del sangue.

### 22. *Cura dell' infiammazione delle ferite.*

Contro la profusione il Rimedio consiste nelle suddette cose : contro l' infiammazione poi nel corso del sangue. Si può questa temere quando fu offesa la cartilagine , l' osso , il nervo , o un muscolo , o quando è uscito poco sangue in comparazione della ferita. Dunque ogni volta che fosse tal cosa non bisognerà subito stagnar il sangue , ma lasciarlo uscire finche si può con sicurezza : talmentechè se parrà esserne uscito poco devesi anche cavare dal braccio , se è un corpo giovane , robusto , ed esercitato , e tanto più se sarà preceduta l' ubriachezza alla detta ferita. Che se parrà offeso il muscolo si doverà tagliare : perche percosso è morto , tagliato risana.

### 23. *Del saldare delle ferite.*

Stagnato il sangue ( se troppo ne scaturisce ) o cavato ( se da per se in poca quantità è uscito ) è bene che si saldi la ferita. E si può cicatrizzare quella che sta nella cutè , o ancora nella carne , se non n'è accaduto altro di male . Può unirsi la carne che da una parte è tagliata , dall' altra attaccata , se però è anche intera , ed è alimentata colla congiunzione del corpo.

In quelle che si uniscono s'adopran due  
forte

forte di cura. Imperocchè se la ferita è in parte molle, si deve cucire, particolarmente se è tagliata la parte di sotto del naso, o dell'orecchio, la fronte, bocca, palpebra, o labbro, la pelle intorno la gola, o il ventre. Se poi la ferita è nella carne, ed è larga, ne facilmente gli orifizj si possono tirare, non è approposito la cucitura: ma dee porvisi sopra quelle fibbie dette da' Greci *ἀγκυραι* *Ankere*, le quali ritirano insieme un pochetto le labbra della ferita, acciò poi non si faccia una cicatrice larga.

E da questo si può raccogliere, se cio, che da una parte è pendente, dall'altra attaccato ( se per anco non è del tutto alienato ) richieda la fibbia, oppur la cucitura. Nessuna delle quali cose vi si dee poner prima che dentro sia purgata la ferita, per non lasciarvi dentro qualche radunanza di sangue; stanteche questo si putrefa, genera la infiammazione, e proibisce il saldare della ferita. Nemmeno la tasta che vi fu posta per stagnar il sangue vi si dee lasciar dentro, perche anch'essa infiamma:

Si prenda però co la cucitura, o fibbia non solo la pelle, ma qualche poco ancor della carne, se questa vi farà sotto, accio con maggior forza vi stia, ne rompa la pelle. L'un'e l'altra è approposito d'accia morvida non troppo torta, acciò con minor dolore

CAPO VENTESIMO SESTO. 65

dolore posi sul corpo. Si l'una come l'altra non vi si deve metter ne troppo rara, ne troppo spessa, perche rara non tiene insieme, troppo spessa molto tormenta, perche quanto piu spesso l'ago ha trapassato il corpo tanto maggiori le infiammazioni si fanno principalmente nell'Estate. Ne l'una ne l'altra però vogliono violenza, ma sono giovevoli finattantoche la pelle quasi di per se vien dietro alla mano, che la tira. Perlopiu però le fibbie lasciano la ferita alquanto piu larga, la cucitura congiunge i labbri della ferita, i quali nemmen essi si debbon in tutto toccare, acciò se vi sia fatta dentro radunanza di materia abbia d'onde scaturire. Se qualche ferita non ammette veruna di queste cose, dee quella purgarsi.

Di poi ad ogni ferita vi si deve poner sopra una sponga bagnata d'aceto (a), se non potrà taluno sopportare la forza dell'aceto convien servirsi del vino. Una ferita leggera giovassi altresì se vi si pone sopra una sponga bagnata in acqua fresca e quella postavi in qualsisia modo giova finche è bagnata, perciò non si dee permettere che vi si riscalchi. (b) E può curarsi una ferita senza

*Celso Volg. Tom. II.*

E

me-

(a) *Se la parte è nervosa non s'usi l'aceto ma più tosto vino austero.* (b) *In parte nervosa, in tempo freddo, e se la ferita è profonda, ed in parte non calda l'acqua fredda sarà contraria.*

medicamenti stranieri, fatti con istudio, o composti. Ma se alcuno crede poco a questo vi deve poner sopra medicamento che non contenga sevo, di quelli che ho posti per utili alle ferite ancor sanguinose. E particolarmente se sarà ferita la carne, quel medicamento che chiamasi *Barbaro*, se i nervi, o cartilagine, o qualche parte eminente come l'orecchie, e i labbri, lo Sfragide di Polibio; l'unguento verde Alessandrino è buono per i nervi, ed alle parti eminenti quella che chiamasi da Greci *ράττινα* *Rattusa*.

Suole altresì nell'ammaccatura del corpo poco romperfi la pelle, il che quando segue non è fuor di proposito che sia colla lancetta allargata, se non vi siano accanto muscoli, o nervi, i quali non è ben tagliare; dopo che s'è allargata a sufficienza vi si ponga sopra il medicamento. Che se la parte ammaccata benché siasi allargata un poco, non può dilatarsi di vantaggio per cagione de' nervi, o muscoli, si adoperino quelle cose che tiran fuora piacevolmente l'umore, e particolarmente quello che ho detto chiamarsi *Ipodes*. Non è ancora fuor di proposito ogni volta che s'è fatta ferita grande, dopo applicato il medicamento circondarla di più con lana fucida bagnata con aceto, olio, o Cataplasma, se è parte molle, che mediocremente

CAPO VENTESIMO SESTO. 67

mente reprima, se è parte nervosa, o muscolosa, che mollicchi.

24. *Del modo di fasciar la ferita.*

Per fasciare, la fascia di lino è la migliore, e questa deve essere larga, acciò in una sole girata non solo prenda la ferita, ma alquanto di qua, e di là i di lei labbri. Se da una parte più che dall'altra si è ritirata la carne si atragga quella co' le mani, e se si è ritirata ugualmente si fascino attraverso i labbri della ferita, o se non comporta ciò la qualità di essa, si getti prima per lo mezzo, e di poi si rigiri dall'una, e dall'altra parte. Devesi però fasciare in modo che tenga, e non stringa. Quello che non è tenuto scorre, ciò che è troppo stretto pericola d'incancheriare cioè sfacelare. D'Inverno dee più volte girar la fascia, di Estate finche fa di bisogno, e finalmente l'estremità di quella devesi cucire insieme; attesoche il nodo offende la piaga, se per altro non è molto da quella lontano.

Ma non dee taluno esser ingannato di ricercare una cura propria delle viscere da quelle cose delle quali dissi di sopra. Mercechè la stessa ferita per di fuori deve curarsi, o colla cucitura, o con altra sorta di medicamenti nelle viscere niente si operi, se non per tagliare se sia pendente qualche particella dal fegato, milza, o estre-

mità del Polmone. Per tanto la ferita interna si sanerà con quel vitto, e co' medicamenti, che nel passato libro ho detto convenire a ciascun viscere.

25. *Come il ferito debba trattarsi.*

Disposte così nel primo giorno le cose, si ponga in letto quell' uomo ferito, (a) e se ha ferita grave dee per quanto comportano le forze astenersi dal cibo avanti l' infiammazione e bere finche spenga la sete acqua calda, o s'è di Estate ne vi sia febbre, o dolore, ancor fresca. Non sia però questa legge perpetua, ma si giudichi sempre secondo le forze del corpo talmenteche può la debolezza richiedere per necessario di subito il cibo, tenue però, e poco, che solamente lo sostenga. E molti mezzomorti per la profusione del sangue prima d'ogni cura sono da ristorarsi col vino il qual per altro è contrarissimo alle ferite. (b)

26. *De segni delle ferite.*

Che troppo poi gonfi la ferita è pericoloso, che niente gonfi è pericolosissimo; quello è segno di grand'infiammazione, questo di corpo morto. E subito se non è l' uomo alienato di mente, se non è venuta la febbre si può sapere che presto sia per guarirsi la ferita. Ma nemmen la febbre dee portar gran timore, se dura nella ferita

ta

(a) *Hipp. lib. de Affect. & ulc.*

(b) *Hipp. 5. Aph. 66.*



ta grande fino tanto che vi è l'infiammazione. Quella è dannosa, che o sopraggiunge ad una ferita leggiera, o dura più oltre dell'infiammazione, o ne cagiona delirio, o se essa non da fine a quello stiramento, ed attrazione de nervi, che proviene dalla ferita (a). Ancora il vomito bilioso non spontaneo, over subito dopo la percussione, o nell'infiammazione, è segno cattivo, solamente in quei che anno feriti li nervi, o luoghi nervosi. Il vomitare però spontaneamente non è male principalmente in quelli che l'ebber per costume, non già subito dopo il cibo, ne quando è già fatta l'infiammazione, ne quando si è il male nelle parti superiori.

27. *Delle cure delle ferite.*

Tenuta così per due giorni la ferita, il terzo si sfasci, e si asterga la marcia con acqua fresca, e vi si rimettino di nuovo le medesime cose. Nel quinto giorno però si fa palese quanta sia per esser l'infiammazione, nel qual giorno di nuovo scoperta la ferita, dee considerarsi il colore; che se quello è livido, pallido, vario, o nero, s'intende esser cattiva ferita, e quando siasi questo osservato ci può dar timore. Che se l'ulcere è bianco, o rosso, è ottimo. Parimente la cute dura, grossa, e dolente da segno di pericolo. (b) Buoni segni sono quando è questa senza dolore, sottile, e

E 3 mor-

(a) Hipp. 6. Aph. (b) Hipp. ibid.

## 70 LIBRO QUINTO

morvida. Ma se si salda la ferita , o che gonfiata è leggermente vi debbono ponerfi sopra le cose stesse, che da principio.

Se vi è grave infiammazione, ne vi sia speranza di saldare, vi si ponghino cose che promovino la marcia , ed è necessario parimente adoprare ancor l'acqua calda, la qual digerisca la materia, mollifichi la durezza, e tiri fuori la marcia. Si tempri quella in modo che sia gioconda al tatto, si adoperi finattantoche sia in parte sminuito il tumore, e paja esser ritornato all'ulcere il calore più naturale, e principalmente s'usi, se si è una ferita grande il medicamento tetrafarmaco, se negli articoli, dita, e luoghi cartilaginei il Ripodes. Dopo questo fomento se non è molto larga la piaga vi si dee subito poner sopra l'empiaastro; che se ha apertura grande, sciolgasi quell'Empiaastro con unguento irino, e si ponghino dentro la piaga tatte bagnate con esso, e dipoi vi si deve poner sopra l'empiaastro, e su questo lana sucida, e meno ancora di prima si debbono stringer le fasce.

### 28. *Cura propria degli Articoli.*

Sono da dirsi in particolare alcune cose ne gli articoli, ne' quali se sono tagliati i nervi, che li tenevano, ne vien debolezza di quella parte. (a) Se questo è in dubbio, ed è fatta la ferita da ferro tagliente, que-

(a) *Gal. tamen 6. meth.*

## CAPO VENTESIMO SESTO. 71

questa è miglior traversa, se da ottuso, e grave, non vi è differenza nella figura. Ma s'osservi se si generi la marcia sopra l'articolo, o sotto. Se si fa sotto, ed esce per lungo tempo bianca, e crassa, è credibile esser tagliato il nervo, e tanto più quanto maggiori dolori, ed infiammazioni più presto si faranno fatte. Ma benché non sia tagliato il nervo, e persista nondimeno lungo tempo intorno un tumor duro, e necessario esser lungo da guarire quell'ulcere, ed ancor sanato che vi rimanga il tumore, e seguirà che tardi si potrà stender, o piegar quel membro. Con più tempo però si stende quell'articolo, che curvo è stato curato, di quello che si pieghi quello che averemo tenuto dritto. Devesi parimente collocare il membro ferito in siti determinati. Se si ha da saldare si collochi in modo che stia voltato in su; se si trova in quello l'infiammazione, che non pieghi in alcuna parte; se già esce la marcia, che stia alquanto chinato.

Un'ottimo medicamento altresì n'è la quiete, il muoversi, e camminare, non è buono, se non a' sani; meno però è questo pericoloso a coloro, che sono feriti nella testa, o nelle braccia, che nelle parti inferiori, e molto meno il camminare conviene a chi è percosso nel femore, o nello stinco, o nel piede. Il luogo dove ripose-

rà dovrà esser tiepido . Il bagno ancora fintantoche sia poco pura la piaga si è fra le cose piu dannose, perche rende quella umida, e sordida, dal che si fa passaggio al Cancro alla gangrena o sfacelo . Si puo far bensì una leggiera frega ma in quelle parti che sono piu lontane dalla ferita .

29. *Come deve purgarsi la ferita.*

Finita che sarà l' infiammazione si dee purgar la ferita . Questo ottimamente fanno tatte tinte in miele, e sopra vi si ponga l'empiaastro tetrafarmaco , oppur l'Enneafarmaco . Allora poi sarà puro l'ulcere quando sarà rosso, e nè troppo secco , nè troppo umido . E qualunque si è senza senso; quel che non naturalmente sente ; che se è troppo asciutto, over umido; che è o pallido, o bianchiccio , o lucido , o nero non è puro .

30. *Come si riempia la ferita.*

Dopo purgata ne segue che si riempia , e allora è necessaria l'acqua calda a tal fine che si tenga lontana la marcia . E superfluo l'uso della lana sucida , meglio si fascia con lana pulita . Ma per empire la ferita giovano altresì alcuni medicamenti: per tanto non è fuor di proposito usar quelli (a), come butirro con rosa con poca quan-

(a) *Non par atto a nutrìr e produr carne potendo render sordido l'ulcere .*

## CAPO VENTESIMO SESTO. 73

quantità di miele; o coll'istesso miele, o rosa il tetrafarmaco, o tasta di rosa. Più però giova il bagno raro, cibi di sostanza, ma anche alquanto più pieni schivando tutte le cose acri. Per tanto puo darfi salvaggiame, o uccellagione, e porcina lesa. Il vino a tutti mentre vi è la febbre, e l'infiammazione è contrario come anche fin' alla viatrice se sono feriti nervi, o muscoli; e ancora se è ferita la carne profondamente. Ma s'è la ferita delle più sicure nella sommità della cute, puo il vino assai vecchio, dato però in poca quantità, giovare per riempire. Se si dee molliccare, il che è necessario nelle parti nervose, e muscolose bisogna usare eziandio sopra la ferita il cerotto. Ma se la carne è cresciuta piu del dovere, mediocrementemente reprime la tasta asciutta, piu gagliardamente la squama di rame. Se vi è sopra-cresciuta, come che debba esser levata, si adoperino ancora cose piu gagliarde che corrodino. Dopo ogni cosa sopradetta comodamente n' induce la viatrice liscio disfatto in vin passo, o latte, o anche una tasta asciutta postavi di per se sola.

### 31. *Dell'ulceri che vengono esteriormente per mezzo di ferite, e loro cure.*

Con questo ordine si cura felicemente, ma son solite però accadere alcune cose pericolose; Attesochè alle volte invecchia l'ulcere,

74 LIBRO QUINTO

re, e vi vien sopra un callo, ed i labbri intorno illividiscono, dopo le quali cose i medicamenti, che vi si mettono, poco giovano, il che per lo piu avviene a quell'ulcere che con negligenza è stato curato.

Alle volte o dalla troppa infiammazione o da' caldi eccessivi, o da gran freddi, o perche troppo è stata stretta la ferita, o perche il corpo è di vecchio, o di mal abito incancherisce. Questo Genere da' Greci si è diviso in specie, con nostri vocaboli non si trova. Ogni canchero poi non solo corrompe la parte che occupa, ma va altresì serpeggiando, e dopo con diversi segni si conosce; poichè ora cinge l'ulcere con rossore sopra l'infiammazione, e questo si avvanza con dolore; lo chiamano i Greci *ερυσιπέλας Erisipela*. Ora l'ulcere è nero perche la di lui carne è putrefatta, e si va stendendo d'avvantaggio coll'impuridire, alle volte è umido, e dall'ulcere nere esce umor pallido, e di cattivo odore, e pezzetti di carne corrotta. Alle volte ancora si corrompono i nervi, e le membrane, e postavi la tenta scende o da banda, o in giù, e di quel vizio talvolta ne partecipa anche l'osso. Or si fa quella che chiamano i Greci *γαγγραινα Gangrena*.

Le sopradette cose fanno sì in qualsiviasa parte del corpo; questa però nelle parti eminenti, cioè fra le dita, e sotto le braccia,

CAPO VENTESIMO SESTO. 75

cia, over negl' inguini , e perlopiù ne' vecchi, o in coloro che sono di corpo di abito cattivo. La carne nell' ulcere o è nera o livida, ma secca, ed asciutta; e la pelle vicina per ordinario s' empie di pustole nericie, e quella che ne segue è o pallida, o livida , perlopiù eruginosa senza senso. Quella più avanti è infiammata, e tutte le dette cose insieme serpeggiano: l'ulcere succede nel luogo delle bolle, le bolle nella parte pallida, o livida, il pallore, o il lividore nel luogo infiammato, l'infiammazione nella parte sana. Intanto poi ne vien la febbre acuta, ed eccessiva sete, alle quali cose si aggiugne ad alcuni il delirio, altri benche in se balbuzienti appena possono colla lingua dir i suoi sentimenti. Comincia a patir lo stomaco, diventa puzzolente lo stesso fiato. Ed il principio di quel male ammette cura, ma quando del tutto s'è impossessato è insana- bile, e la maggior parte con un sudor freddo se ne muojono.

32. *Cura delle Ulcere.*

Questi sono i pericoli delle ferite. L' ulcere poi invecchiato si deve tagliuzzare colla lancetta come anco i suoi labbri, e tutto ciò che è livido dee parimente tagliarsi. Se vi è dentro la varice, che non lo lascia sanare, ancor ella si tagli: Dipoi uscito che sarà il sangue, rinovata la feri-

ta

ta devesi usare la stessa cura, che abbiamo posta nelle ferite fresche. Se taluno non volesse servirsi del ferro potrà sanare quell'empiaistro che fassi \* di ladano e quando con quello è corrosa l'ulcere quel medicamento che n'induce la cicatrice.

### 33- Cura delle Rispole.

Quella che ho detto chiamarsi *Rispola* non solo è solita sopravvenire alla ferita, ma farsi altresì senza questa, ed alle volte apporta maggior pericolo se principalmente sarà circa 'l collo o capo.

Bisogna; se 'l comportano le forze, cavar sangue, dipoi imponervi reprimenti, e rinfrescanti, ed in particolare cerussa disfatta col sugo di solano, o terra cimolia con acqua piovana, o farina impastata coll'acqua stessa aggiuntovi cipresso, o se il corpo è tenero lenticchia; Qualunque cosa vi si ponga sopra, cuoprasì con foglia di bieta, e vi si ponga sopra una pezzetta bagnata con acqua fresca. Se i rinfrescanti di per se poco gioveranno si mescolino in questo modo. R. Solfo P. \* j. cerussa, Zafferano ana P. \* xij. si mescolino con vino, e si unga con dette la pezza, o se la parte è alquanto piu dura, foglie di solano

\* R. spuma di argento P. \* xl. lauduno P. \* xxxij. vetriolo \* viij. alume scissile \* xij. cera \* C. Squama \* viij. bitume \* xxxij. mirteo la 4. parte d' un emina. Vino potente.



## CAPO VENTESIMO SESTO. 77

ne ammaccate si mescolino con lardo strutto di porco, e si ponghino sopra la pezzetta.

Ma se vi è negrezza, ne ancora serpeggia vi si debbono poner sopra cose che leggermente rodino la carne putrida, e repurgato che sarà l'ulcere si nutrisca come l'altre. Se poi si è piu putrido, e gia s' inoltra, e serpeggia vi bisognano corrosivi piu gagliardi. Se nemmen questi fanno l'effetto deve darsi il fuoco alla parte finattantoche da quella non venga umidità veruna; imperciocche cio che si è sano, è secco quando si scotta, dato poi il fuoco all'ulcere putrido, vi si debbono poner sopra cose che stacchino dal vivo le croste, le quali chiamansi da Greci ἀσκαρωτικά εσχαρά. *Esclare*. Dopo che faranno quelle staccate dee purgarfi l'ulcere principalmente con miele, e ragia di terebinto adusta, e puo ancora curarsi coll' altre cose co' le quali si curano le marcie, ed in tal modo ridurfi alla sanità.

### 34. Cura della Gangrena.

Non è cosa molto difficile da curar la Gangrena se non ha preso del tutto possesso, ed è ancora sul principio, in un corpo giovine; e tanto piu se non saranno toccati i muscoli, se non saranno offesi i nervi, o leggermente, ne alcuno articolo della mano sarà scoperto, o se sia poca carne

carne in quel luogo, onde poco vi fosse da imputridire, e se si ferma il male in quel luogo, il che puo farsi principalmente in un dito. In simil caso conviene in primo luogo, se le forze lo comportano, cavar sangue, di poi tagliare fin' alla parte sana tutto cio, che è arido, e con certa estensione travaglia la parte prossima.

Mentre poi serpeggia il male non si debbon adoprare alcuni medicamenti di quelli che promovono la marcia, e perciò nemmeno acqua calda. I gravi ancora benché reprimenti non sono buoni, ma vi bisogna leggierissimi, e sopra le parti infiammate convien servirsi di rinfrescanti. Se non si è perciò fermato il male dee darsi il fuoco a cio, che ritrovasi fra 'l sano, e' l viziato.

Ed in tal caso devesi principalmente ricorrere non tanto a i medicamenti quanto alla regola di vivere. Perche questo non è male se non da corpo corrotto e viziato. Dunque in principio se non osta la debolezza si usi astinenza. E dappoi si diano in cibo, e bevanda cose che astringhino il ventre, ed in conseguenza il corpo ancora, ma siano quelle leggieri. Se s'è fermato il male, si debbono poner sopra la piaga le cose stesse, che si sono prescritte nell'ulcere putrido. Ed allora parimente farà lecito servirsi di cibi piu pieni di mezzana materia, tali però che rifeccchino alquanto  
il

il ventre, ed il corpo, e d'acqua piovana fresca. Il bagno ( se non vi è già certa fidanza di racquistata salute ) è contrario, stanteche l'ulcere mollificato in esso di nuovo, presto ripiglia lo stesso male. Suol però alle volte niente giovare alcun rimedio, e andar nondimeno serpendo quel canchero. Miserabile in vero, ma unico rimedio si è, acciò sia sicuro il resto del corpo, tagliare quel membro che va a poco poco morendo.

35. *Cura delle ferite con ammaccatura, o fissione.*

Sono queste le cure dell'ulceri più gravi. Ma non sono da trascurarsi anche quelle, quando essendo la pelle intera, la parte interna n'è ammaccata, o quando è rafa, o percossa qualche parte, o qualora una schieggia è rimasta nel corpo, ovver quando è leggiera ma profonda la ferita.

Nel primo caso si può cuocere in vino scorza di melagrani, e la parte interna di quella pestarla, e mischiarla con cerotto fatto di rosa, e purnelo sopra, di poi refa che farà ruvida la pelle adoperarvi un medicamento mollificante, qual sarebbe quel detto *χλωράς lipara*.

Alla parte poi rafa, o ammaccata vi si mette l'empiaastro Enneafarmaco, e si diminuisca il vitto, e tolgasi'l vino, ne questo ancorche non abbia profonda la ferita  
deve

## 80 LIBRO QUINTO

deve perciò dispreggiarsi stanteche da simili casi spesso si fanno i cancheri. Che se sarà questo male leggiero, ed in una piccola parte potremo esser contenti del sopradetto medicamento emolliente.

La Schieggia poi ( se sia possibile ) bisogna trarla fuori o co la mano, o col ferro. Se è rotta, o se è profundata in modoche in tal guisa non si possa svelgere, bisogna tirarla fuori col medicamento. Ed ottimamente la tira fuori la radice di canna postavi sopra, se è tenera infranta, se è già alquanto dura cotta prima in vino mielato, alla quale sempre si dee aggiugnere miele; ovvero aristolochia con lo stesso miele. La peggior delle schieggie si è la canna, perche è ruvida, e lo stesso danno fa la felce. Ma per esperienza si è conosciuto che una è rimedio dell'altra, se ammaccata vi sarà posta sopra. Fa eziandio l'istesso effetto in ogni sorta di schieggia quel medicamento che a forza d'estrarre lo stesso è adattato alla profonda, e alla leggiera ferita. A quelle molto convien l'empiaastro di Filicrate, a queste quello d'Ecateo.

36. *In che modo s' induca la cicatrice alla ferita, e come quella si purghi.*

Quando poi in qualsivisa ferita si è giunto all'indur della cicatrice, il che è necessario alle ulceri ben purgate, e ripiene,  
pri

## CAPO VENTESIMO SESTO. 81

primieramente bisogna ponervi una tasta bagnata d'acqua fresca, mentre si alimenta la carne, dappoi quando già dee trattenerfi vi si ponga asciutta finche si forma la cicatrice, indi convien legarvi sopra piombo bianco, dal quale si reprime la cicatrice, e riceve il color molto simile al corpo sano. L'istesso fa la radice di cocomero salvatico: il medesimo la mestura che contiene Elaterio P. \* j. schiuma d'argento P. \* ij. Ghianda Unguentoria P. \* iiij. le quali cose si mescolano con ragia di terebinto finche pervenga alla crassezza dell'empiaastro. E parimente le cicatrici nere piacevolmente purgano mischiati in porzioni eguali, Verderame, piombo lavato, e l'istessa ragia cotta, e si ugne la cicatrice, il che puo farsi nella faccia, o vi si pone all'uso dell'empiaastro, la qual cosa piu commodamente puo farsi nell'altre parti.

Ma se rimane troppo alta, o concava la cicatrice, è cosa stolta per la bellezza di nuovo sottoporsi al dolor, ed a' medicamenti. Puo per altro rimediarsi, ed all'uno, ed all'altro male. Giacche l'un' e l'altra cicatrice si puo tagliuzzare co la lancetta. Se alcuno desidera piuttosto un medicamento, l'istesso fanno quelle composizioni che rodono la carne; Quando sarà esulcerata la cute su la carne, che avanza fuora, si debbon poner medicamenti corrosivi, sopra

## 82 LIBRO QUINTO

la concava medicamenti che riempino, fin-  
che così l'un che l'altro ulcere si uguagli  
alla pelle sana, ed allora s'induca la ci-  
catrice.

## C A P O XXVII.

*Delle ferite che si fanno per mezzo di  
morsicature, e loro cure.*

**H**O detto di quelle ferite, che si fanno  
per lo piu col ferro, ne segue, che io  
dica di quelle che si fanno col morso, or'  
di uomo; or' di scimia, spesso di cane, al-  
levolte di fiere o d'altri animali o serpen-  
ti. Ed ogni morso di fiera ha in se un  
certo veleno; per tanto s'è grande la feri-  
ta bisogna attaccarvi una coppetta, se leg-  
giere, subito vi si dee poner sopra l'em-  
piastro, ed in particolare quello di Dioge-  
ne. (a) Se non avete questo, qualsivoglia  
altro di quelli, che ho posti contro i mor-  
si de' serpenti, se nemmen questo averete,  
qualisia altro non pingue di quelli che si  
adoprano alle ferite fresche. Il sale parimen-  
te è rimedio, ed in specie al morso del  
cane, se si pone sopra alla ferita una ma-  
no, e si percuote sopra con due dita, es-  
sendoche tira fuori la marcia, e si può an-  
cora

(a) Se tali cose non si trovano, l'empiaastro per-  
de Alessandrino.

## CAPO VENTESIMO SETTIMO. 83

cora legarvisi sopra detta piaga il Sale .  
( *salsamentum* )

### 2. Cura del morso del Can rabbioso .

Se il cane era rabbioso, è necessario, tirar fuori con una coppetta il veleno di quello, e dappoi se il luogo non è nervoso, ne muscoloso si dia il fuoco alla ferita, se non si può far ciò non è fuor di proposito cavar sangue . Indi alla ferita scottata vi si ponghino sopra le stesse cose, che all'altre scottature: sopra quella che non ha avuto il fuoco si ponghino gagliardi corrosivi . E poi non con alcun nuovo medicamento, ma con que' posti di sopra converrà empir la ferita, e ridurla a sanità . Alcuni dopo il morso del cane arrabbiato di subito mettono quell' uomo nel bagno, e ve lo lasciano sudare finche comportano le forze, co la piaga aperta, accio tanto piu anche da quella sgorghi fuori il veleno, indi la bagnano con molto, e possente vino il qual è contrario ad ogni veleno . E fatto cio per tre giorni si crede che sia l' uomo sicuro dal pericolo . Suol però da quell' ulcere, quando vi si è preso poco rimedio, generarsi un tumore dell'acqua chiamato da Greci *ἰδρῶσις* *Idrosia*, male in vero miserabile, nel quale il paziente, ed è tormentato dalla sete, e dalla paura delle acque . Vi è poca speranza di quelli, che oppressi sono dal suddetto ma-

le, ma l'unico rimedio però si è gettarlo all'improvviso, quando non se l'aspetta, in un'acqua, e se non sa nuotare, ora lasciarlo sott'acqua bere, ora trarlo fuori, se fa nuotare, alle volte per forza tuffarcelo, acciò anche contro sua voglia si sazii d'acqua, stanteche in tal guisa si toglie via e la sete e il timore dell'acqua. Ma ne vien un altro pericolo, che il corpo debole travagliato dall'acqua fredda non sia assalito dall'istensione de' nervi: acciò questo non segua subito cavato dall'acqua deve mettersi nell'olio caldo. (a) Per antidoto poi si dee dare principalmente quel che ho posto nel primo luogo, se cotesto non vi è, un altro, e se il paziente non ha per anco in orrore l'acqua, gli si dia da bere nell'acqua, e se lo disgusta l'amarrezza si aggiunga miele. Che se già l'ha sorpreso il detto male, può prendersi in pillole.

### 3. Cura comune a tutti i morsi de' Serpenti.

Ancora le morsicature dei serpenti non ricercano cura molto differente, benché gli antichi abbiano variato assai in quella, di modo che in ciascuna sorta di serpenti n'anno imposta varia sorta di medicamento, dando ad uno una cosa, all'altro l'altra. Ma in tutte giovano molto le stesse cose. Primieramente dunque si legghi sopra la ferita,

(a) Si può anche con giovamento disfare la terriaca con olio rosato, e metterla dentro la ferita.



## CAPOVENTESIMO SETTIMO. 85

rita, quella parte, non però troppo stretta, accio non intorpidisca, e di poi conviene tirar fuori il veleno. Questo fa ottimamente la coppetta; ne è ancor fuor di proposito tagliar prima co la lancetta intorno la ferita, acciò che si cavi più del sangue infetto. Se non vi è la coppetta, il che appena è possibile, può far lo stesso altro vaso simile, se non si ha neppure questo si chiami un uomo, il qual succhi la ferita.

Ne in verità anno verun particolar sapere coloro, che chiamiamo *Pfills*, Incantatori delle serpi, ma ardire approvato coll'esperienza; poichè il veleno della serpe, come alcuni altri veleni, i quali adopra-  
no i Francesi non sono nocivi coll'esser mangiati, ma nella ferita. E per tanto la stessa vipera sicuramente si mangia, il di lei morso uccide, e se essendo quella incantata (il che fanno con certi medicamenti gl' Incantatori de' serpi) alcuno le mette un dito in bocca, ne è morficato, non è nocumento veruno in quella saliva. (a) Dunque chi seguendo l'esempio dell' Incantatore succhierà quella ferita, ed esso sarà sicuro, e renderà sano quell'uomo. Doverà però osservarsi, se non vuol  
F 3 mori.

(a) Abbia però prima preso cibo, e si sia lavata la bocca con vino, e nel succhiare tenga un poco d'olio in bocca.

## 86 LIBRO QUINTO

morire, di non aver alcun'ulcere nelle gengive, o palato, ed altra parte della bocca. Dopo queste cose pongasi l'infermo in luogo caldo in modo che la parte percossa stia di sotto. Se non v'è ne chi succhi, ne la coppetta, convien beber brodo d'occa, o di vitella, e vomitare, e dividere un pollastro vivo per il mezzo, e subito caldo ponerlo sopra la ferita, in modo che la parte interna di esso tocchi il corpo. Fa lo stesso ancora il capretto, o l'agnello fatto in pezzi, e la sua carne calda applicata alla ferita, come pure l'empiastri posti di sopra; il migliore si è o l'Efesio, o quello che gli è collocato di sotto. Ed opportuno rimedio è qualche antidoto. Se non vi è comodità di quello, è necessario beber una bevanda di vin puro con pepe, o altro che muova calore, acciò non lasci congelare interiormente i liquidi, perche la maggior parte de' veleni uccide colla freddezza. Sono altresì utili tutte le cose che movono l'orina, comeche assottigliano la materia.

### 4. *Cure particolari contro i morsi de' Serpi, e prima contro il morso dell'Aspido.*

Queste sono le cose comuni ed utili a tutti i morsi, ma l'esperienza ha insegnato, che il ferito dall'Aspido deve piuttosto beber aceto. ( a ) Il che dicesi aver fatto

( a ) *E quanto è più forte, tanto è migliore.*

CAPO VENTESIMO SETTIMO. 87

fatto palese il caso d'un certo fanciullo, il qual essendo stato morficato dall'Aspido, e parte per lo stesso male, parte dal caldo intollerabile avendo gran sete, e riseccati li luoghi non ritrovando altro umore, bevette l'aceto, il qual a caso seco aveva, e guarì. Credo perche sebben questo ha forza di rinfrescar, ha eziandio virtù di dissipare. Ond'è che la terra bagnata con esso ne bolle. Pertanto è verisimile che l'interna umidità, che va invassandosi dall'istessa violenza di quello sia disciolta, e così rendersi la sanità.

5. *Contro il morso dello Scorpione.*

Parimente in alcuni altri serpenti sono noti abbastanza alcuni certi rimedj. Poiche lo Scorpione è a se stesso squisitissimo rimedio. Alcuni pestato lo bevono in vino. Altri pure pestato lo pongono su la ferita, taluni postolo su la brace affumigano la morficatura, ponendovi intorno la veste da ogni banda, accio il fumo non vada altrove, dappoi legano sopra di quella il carbone di esso. Bisogna però bere seme d'erba girasole, la quale chiamano i Greci *ηλιοτροπιον* *Eliotropio*, o almeno le foglie di quella in vino. Sul morso poi semola intrisa in aceto, o rutta salvatica vi si puo metter sopra, o sale abbrustolito con miele. (a) Ho conosciuto però medi-

F 4 ci,

(a) Se però non è per anco sparso per tutto il corpo il veleno.

ci, che alli morsicati da' Scorpioni niente altro fecero che cavar sangue dal braccio.

6. *Per il morso del Ragno, e Scorpione.*

Al morso del ragno, (a) e dello scorpione si mescola regolarmente aglio con ruta, e pestato in olio vi si pone sopra.

7. *Contro il morso del Ceraſte, Dipsa, ed Emorroide.*

Chi è percoſſo da queſti Serpenti dee dividere in due porzioni aſodelo aſciutto che ſia in quantità d' una fava Egiziaca, e vi ſi aggiunga un poco di ruta. Giovano ancora trifoglio, mentaſtro, e panace con aceto, giovano preſe in bevanda, cannella, Coſto, e Caſia.

8. *Per il morſo del Cherſidro, e Ceraſte.*

Contro il morſo del Cherſidro ſi ſuma panace, ovvero laſer P. \* xj. o ſugo di porro in un' emina di vino, e ſi mangi molta ſantoreggia. Devveſi poi poner ſopra'l morſo ſterco, (b) di capra cotto in aceto, o farina d' orzo, o ruta nello ſteſſo, o niepitella trita con ſale, aggiuntovi miele. Il che parimente ha virtù eguale nel morſo del Ceraſte.

9. *Per il morſo del Falangio.*

Nel morſo del falangio, oltre quella cura,

(a) *Topo cieco, o topo ragno mangiſi anche l' aglio, e vi ſi beva ſopra vin gagliardo.*

(b) *Lo ſterco di capra ſfatto in aceto dice Gal. eſſer buono alli morſi delle vipere.*

## CAPO VENTESIMO SETTIMO. 89

ra, che fassi co le mani, spesso si dee por-  
ner quell'uomo nel bagno, e dargli mirra,  
e una taminia porzioni uguali in una emi-  
na di passo, (a) o seme di radice, o radice di  
loglio in vino, e sopra il morso semola  
cotta in aceto, e si facci riposare l'infermo.

10. *Contro i morsi de' Serpenti d' Italia, che  
sono meno terribili degli stranieri.*

Ma queste sorte di serpenti e sono stranie-  
ri, ed alquanto piu velenosi, e nascono ne'  
luoghi molto caldi. L'Italia, ed i paesi piu  
freddi anche in questo sono piu salubri, che  
producono serpenti meno terribili. Contro  
i quali assai puo l'erba betonica, o cantabri-  
ca, o centaurion, o l'agrimonia, o triflag-  
gine, o personata, over due, o tre pastina-  
che marine pestate, e date a bere in vi-  
no, e poste su la ferita. Bisogna poi saper  
che il morso d' ogni serpe che e digiuno,  
ed a colui ch' e digiuno piu e nocivo. Per-  
cio dannosissimi sono quando covano, ed e  
bene quando alcuno teme delle serpi non  
metterli prima in viaggio d' aver mangiato  
qualche cibo.

11. *Rimedio Generale contro tutti li Veleni presi  
in cibo, o in bevanda.*

Non cosi facilmente puo porgerli ajuto a  
coloro che prefero veleno nel cibo, o nella  
bevanda, primieramente perche non subito  
se n'accorgono come quei che sono percosi  
dal.

(a) Seme di radice s'intende di rasano,

dal serpente, e però non vi possono nemmeno rimediare, in secondo luogo perche il nocumento non comincia dalla pelle, ma dalle parti interne: la cosa più speditiva però si è, subito che taluno se n'è accorto, senza metter tempo in mezzo bere molto olio, e vomitare. E da poi vuotate le budella bere l'antidoto, se questo non si ha, anche vino puro.

*12. Particolari rimedj contro alcuni veleni, e prima contro le Cantarelle.*

Sono alcuni rimedj proprj a certi veleni, e quelli molto ordinarij. Poiche se alcuno ha bevute cantarelle devesi dare panace pesta con latte, o galbario, aggiuntovi vino, o latte solo.

*13. Contro la Cicuta.*

Se cicuta, bevasi molto vino e caldo con ruta e dappoi si provochi il vomito, indi si dia il lafer in vino. E se colui è senza febbre si ponga in bagno caldo, se l'ha, si unga con calefacienti, dopo le quali cose gli è necessario il riposo.

*14. Contro il Jusquiamo.*

Se si è divorato Jusquiamo bisogna beber vino mielato bollente, o qualsivoglia latte, ma principalmente di asina.

*15. Contro la Cerussa.*

Se Cerussa, il sugo di malva, o di ghian-da pestata in vino molto giova.

*16. Contro la Sansuga, e il latte che dentro accaglia.*

Se

## CAPO VENTESIMO SETTIMO. 91

Se si è bevuta la sanfuga convien bere aceto con sale, se latte che dentro accaglia, o caglio, (a) o passo, o laser con aceto.

### 17. *Contro i funghi cattivi.*

Se alcuno averà mangiati funghi cattivi beva sugo di ravanello in posco, o si deve mangiare con sale, ed aceto. Ma questi stessi funghi, e dalla specie si possono discernere da' buoni, e nel cuocerli rendersi meno cattivi. Atteso che se l'anno bollito in olio, o se una mazzetta di pero ha con quelli bollito, sono senza nocumento veruno.

### 18. *Delle Scottature, e loro cure.*

Colle scottature ancora ne vien di fuori il nocumento, perciò ne segue, ch'io debba, dir ancor di queste. Si curano quelle ottimamente con foglie o di giglio, o di lingua di cane, o bieto la cotta in vino vecchio, ed olio, ciascuna delle quali cose postavi sopra subito risana. Ma si può anche dividere questa cura in que' medicamenti che mediocrementemente corrosivi, e reprimenti sul principio e non lasciano venir le vesciche, ed increspano la sommità della pelle, ed in quei che come lenitivi risanano. Del primo genere è la farina di lenticola con miele, o mirra con vino, creta cimolia pestata con scorza d'incenso, e unita con acqua, e in caso di necessità disfatta in aceto. Della  
secon-

(a) Caglio principalmente d' Agnello, di lepre, e di porco.

seconda sorta qualsivoglia *lipara*, ma più a proposito è quella che contiene o schiuma di piombo, o rosso d'uovo. Vi è anche quella cura delle scottature mentre dura l'infiammazione il tenervi sopra lenticola con miele, quando quella è cessata, farina con ruta, o porro, o marrubio finché cadino le croste. Dapoi moco con miele, o iride, o ragia di terebinto, finché siasi purificato l'ulcere; in ultimo una secca, o asciutta pezzetta di lino.

## C A P O XXVIII.

*Delle Ulcere interne, che si fanno per corruzione di qualche parte del corpo.*

I. *Del Carboncello, e sua cura.*

**D**A quelle cose, che avvengono dal di fuori, bisogna far passaggio a quelle, che internamente nascono per corruzione di qualche parte. Fra le quali non vi è peggiore del Carboncello. I di cui segni sono questi. Vi è rossore, e sopra quello le bolle non molto rilevate, ma nere assai, allevolte lividiccie, o pallide. Pare che in esse si contenga marcia, sotto vi è color nero, la parte stessa è più secca, e più dura di quel che deve essere naturalmente, intorno alla quale sta quasi una crosta, e questa n'è circondata da infiammazione, ne  
in



in quel luogo si può alzare la pelle, ma è come attaccata alla carne di sotto. Vi è la sonnolenza, alle volte il freddo, o ne vien la febbre, o l'uno e l'altra. E questo male va sotto serpeggiando quasi con alcune ascosse radici, or più presto, or più tardi parimente sopra allargandosi divien bianco, dappoi illividisce, e nascono intorno bollicelle. E se generasi intorno alle fauci, o allo stomaco spesso all'improvviso ammazza. Non vi è meglio quanto dargli prontamente il fuoco; ne ciò è di travaglio poichè non si sente, essendo quella carne morta, ne si lascia di scottarla finche da ogni parte si senta il dolore, dappoi la piaga si cura come le altre scottature, stante che ne vien via sotto medicamenti corrosivi la crosta staccata da ogni banda dalla carne viva, la qual tira seco quello che era corrotto, e purificata la cavità si può curare con medicamenti che riempino. Che se il male è nella superficie della pelle possono giovare alcuni puri corrosivi, o ancora adurenti. (a) Convien usar la violenza secondo la grandezza del male. Ma qualsivoglia medicamento che vi sia posto sopra, se farà sufficiente giovamento subito staccherà la parte corrotta dalla viva. E può darne certa speranza, che da ogni parte sia per staccarsi la carne viziata, se da

(a) Vi s'usi l'arsenico.

qualche banda simil medicamento va roden-  
do. Se questo non segue, ed è superato dal  
male il medicamento si ricorra al fuoco. Ed  
in simil caso bisogna astenersi dal mangiare,  
e dal vino; si può bere però abbondante-  
mente acqua, e tanto più s'osservino dette  
cose, se vi sarà aggiunta la febbretta.

2. *Del Carcinoma, e sua Cura.*

Non apporta lo stesso pericolo il *Carci-*  
*ma καρκινωμα* se non è inasprito dall' impru-  
denza di chi lo cura. Nasce questo male per  
lo più nelle parti superiori intorno la faccia,  
naso, orecchie, labbra, mammelle delle don-  
ne, e viene altresì dal fegato, o dalla mil-  
za. Intorno al luogo si sentono quasi cer-  
te punture, e quello immobile egualmente  
gonfia, alle volte ancora intorpidisce. In-  
torno quelle le vene gonfiate quasi s' incur-  
vano, e queste diventano pallide, o livide,  
benespesso eziandio ad alcuni si ascondono.  
E quel luogo toccato porta dolore alle altre  
parti, ne gli altri luoghi non ve lo ha. E  
alle volte senza l'ulcere è più duro, o più  
morvido di quel che deve esser naturalmen-  
te, alle volte a queste cose si aggiugne l'ul-  
cere, talvolta non ha cosa di proprio, alle-  
volte è simile a quei che chiamano i Greci  
*δονδύλωμα* *Condilomi* sì nella sua asprezza,  
come nella grandezza. Ed il suo color è  
rosso, o simile alla lenticchia, ne con sicurezza  
si taglia; stante che in breve ne segue lo sti-  
ramen-

ramento, o paralizia de' nervi. Spesso l'uomo tagliato perde la parola, ed il senso. Ad alcuni ancora se si preme l'istessa piaga si stirano, e gonfiano le parti prossime. Atteso che questa è la peggior sorta, e per lo più sul principio fassi quello che chiamano i Greci *κακοεθε* *Cacoethe*, dopo quello il Carcinoma senz'ulcere, indi l'ulcere, da questo il Timio.

Il solo *Cacoethe* può guarirsi, l'altre eolla cura si rendon più gravi, e quanto maggior violenza vi è stata adoperata tanto più alcuni si sono serviti di medicamenti adurenti. Altri l'anno dato il fuoco, altri l'anno tagliati colla lancetta, ne ad alcuno mai il rimedio ha giovato. (a) Ma subito dopo il fuoco si sono inaspriti detti mali e sono cresciuti fin a darne la morte. Tagliati, anche dopo saldata la cicatrice, sono ritornati, ed anno causata la morte. Mentre alcuni senza usarvi violenza veruna per tentar di toglier via quel male, ma col ponervi solo medicamenti lenitivi, i quali, per dir così l'accarezzino non ne sono impediti di giugnere ad un'ultima vecchiaja. Che faccia poi passaggio il *Cacoethe* il qual ammette cura, al Carcinoma che non l'ammette, nessuno lo può sapere se non col tempo, e coll'esperienza. Dunque subito che si è osservato il male vi si debbono poner sopra medicamen-

(a) *Hipoc. 6. Aph.*

ti adurenti, se si alleggerisce il male, e si diminuiscono gl'indizj di quello, puo avanzarsi la cura ed al ferro, ed al fuoco; se subito si è inasprito convien saperfi esser già fatto il Carcinoma, e debbonsi rimover tutte le cose acri, e gagliarde. Ma se quella parte è dura senz'ulcere, basta ponervi sopra un fico de' più grassi, o l'empiaastro detto *Pipodes*. Se l'ulcere è uguale, pongavisi sopra cerotto rosato, e vi si aggiunga polvere di quel vaso di terra pestato dove i fabbri di ferro sogliono spegnere il ferro infuocato. Se quello è troppo sopracresciuto si tenti la squama di rame, la qual è la più piacevole degli adurenti, a tal fine che non lasci avanzar fuori cos' alcuna; ma si facci così se non ha in verun conto inasprito. Se sarà altramente doveremo contentarci dello stesso cerotto.

### 3. *Del Therioma, e sua cura.*

Vi è ancor un ulcere, che chiamano i Greci *Therioma*. Nasce questo di per se, ed alle volte sopraggiugne ad alcun ulcere fatto per altra cagione: il suo colore è o livido, o negro, l'odore cattivo, l'umore è abbondante, e simile al moccio. L'ulcere non sente ne il tatto, ne il medicamento, ma solo il prurito. Intorno poi vi è dolore ed infiammazione. Benespesso ne vien altresì la febbre, alle volte dall'ulcere esce sangue. Ed anche questo male serpeggia, le quali cose spesso vanno crescendo,

e fatti

e fassi da quelle l'ulcere che chiamano i Greci *ερωετα* ed *ιδιμενον* *Erpeta Estiomenon* perche col serpeggiare, e penetrar prestamente rode il corpo fin'all'ossa. Quest'ulcere è ineguale, simile al fungo, e vi è dentro molto umor viscoso, l'odore è insopportabile, e l'infiammazione piu di quello ricercherebbe l'ulcere. Si l'uno come l'altro come ancora ogni cancro si genera per lo piu ne' vecchi o in quei che sono di mal abito di corpo.

La cura si dell'uno che dell' altro è la stessa, ma nel male maggior è piu necessaria. E primieramente s'incomincia dalla Dieta, si facci riposare l'infermo in letto, s'astenga ne' primi giorni dal cibo, beva molt'acqua, e parimente gli si mova il ventre. Dopo finita l'infiammazione prenda cibo di buon nodrimento, fuggendotutte le cose acri, beva quanto vuole in modo che però la mattina si contenti dell'acqua, a cena beva qualche poco di vino austero. Non doverà perciò ugualmente imporsi la fame a coloro che faranno tormentati da gl' *Erpeti*, come a quelli che averanno anche il *Thestoma*. Ed il vitto in vero dev'esser tale. Su la piaga poi convien spargervialloe seco, e pestato, se poco gioverà, calciti. Ma se si è scoperto qualche nervo essendo consumata la carne, dee prima coprirsì con una pezzetta, acciò non

fi abbruci sotto quel medicamento . Se vi fa bisogno altresì di medicamenti piu gagliardi , ricorrasì a quelle composizioni , che piu gagliardamente abbruciano . Cio che vi si pone , vi si dee gettare col manico dello specillo , e sopra applicarvi con miele o tate di lino , o foglie d'olivo cotte in vino , o marrubio , e dette cose si coprimo con pezzetta bagnata in acqua fresca , e poi bene spremuta . Ed intorno dove cagiona tumore l'infiammazione si applichino unguenti reprimenti . Se con questi non si giova , diafi alla parte il fuoco col ferro , coperti però prima con diligenza i nervi , se ve ne fossero di scoperti . Abbruciato o con medicamenti o col ferro il corpo prima deve purgarfi , indi empirfi , si fa chiaro ad ogn'uno dalle cose suddette .

#### 4. *Del fuoco Sacro , e sua Cura .*

Anco il fuoco sacro dee riporsi nel numero dell'ulceri cattive . Le di lui specie son due . Uno è rossiccio , o misto di rossore , e pallore , e ruvido per cagione di continuate bollicelle , nessuna delle quali è maggior dell'altra , ma molte assai piccole . In queste quasi sempre ritrovafi marcia , e spesso rossore con calore , serpeggia questo allevolte col risanamento della parte prima viziata , allevolte essendo ancor ulcerata per la rottura delle bollicelle farfi maggior l'esculcerazione , ed esce un tumore  
il

CAPO VENTESIMO OTTAVO. 99

il qual può parere che sia fra la sanie, e il pus. Generasi per lo più nel petto, o ne' fianchi o nelle parti eminenti, e principalmente nelle piante. L'altro poi consiste nell'ulcerazione della sommità della pelle, ma senza profondità; è largo, lividiccio, ma però inegualmente, nel mezzo guarisce allargandosi l'estremità, e bene spesso la parte che parrà sana di nuovo s'esculcera. Ma la pelle vicina, dove è per passar il male, si fa alquanto più rilevata, e dura, e acquista un colore prima rosso, e poi nericcio. (a) E ancor di questo male patiscono i corpi più vecchi, o che sono di cattivo abito, e per lo più delle gambe.

Ma siccome ogni sorta di fuoco sacro, fra tutti i mali che serpeggiano è meno pericoloso, così quasi più difficilmente di tutti si guarisce. Il più valido medicamento di quello si è una febbre d'un giorno, che consumi l'umor peccante; la marcia del quale quanto è più crassa e più bianca, tanto è meno pericolosa. Giova eziandio che si tagli sotto l'apertura dell'ulcere, acciò esca più marcia, e venga fuori quel che vi è di corrotto, ma se vi si farà aggiunta la febbretta vi bisogna l'astinenza, il riposo, e la purga del ventre. In ogni sorta di fuoco sacro ne si ricercano cibi dol-

G 2 ci,

(a) Dal serpeggiare fu detto da Greci Orpete il fuoco sacro, onde Ippocr. 2. Prad.

ci, e viscosi, ne salsi, e mordaci, ma di qualità mezzana, come sarebbe pane non fermentato, pesce, capretto, uccelli, ed ogni sorta di selvaggiume eccetto cinghiale. Se non vi è la febbre è buono l'esser portato, il camminare, il vino austero, e il bagno. E ancor in questo genere il bere deve esser piu copioso del mangiare, l'ulceri poi se mediocrementemente serpeggiano si fomentino col'acqua calda, se altrimenti col vino. Dappoi col'ago s'aprono tutte le bollicelle, indi vi si applichino cose che rodino la carne marcia. Tolta che sarà l'infiammazione, e ripurgato l'ulcere vi si dee poner il medicamento lenitivo. (a) Nell'altra sorta poi possono giovare pomi cotti in vino, e pestati. Può parimente esser utile l'Empiastro di Era, o il Tetrafarmaco, al quale sia aggiunta una quinta porzione d'incenso, puo ancora l'edera nera cotta in vino austero, e se prestamente serpeggia il male non vi è cosa migliore. Purgato che sarà l'ulcere che ho detto esser nella sommità della pelle, assai gioveranno per risanare gl'istessi medicamenti lenitivi.

##### 5. Dell'Ulcere Chironio, e sua cura.

Ulcere poi Chironio chiamasi quello che ed è grande, ed ha i margini duri, callosi, e gonfi. N'esce marcia non in copia,  
ma

(a) l'unguento di litargirio.



CAPO VENTESIMO OTTAVO. 101

ma tenue, vi è odor cattivo; ne nell'ulcere, ne nel suo tumore sta infiammazione, ha poco dolore. Non serpeggia, per tanto non vi è pericolo veruno, ma difficilmente risana. Benespesso s'induce una debole cicatrice, e di nuovo rompendosi, rinnovasi la piaga, e principalmente ne' piedi, e nelle gambe. Convien applicarvi cosa che abbia del lenitivo, del gagliardo, e del reprimente, che si compone a tal'effetto delle cose infrascritte. R. squama di rame, piombo lavato abbruciato ana P. VI. Cadmia, cera ana P. \* viij. olio rosato quanto basta a mollicicare la cera insieme con l'altre cose.

6. *Dell'ulceri che si fanno per il freddo nelle mani, e piedi, e loro cura.*

Si fanno eziandio nell'inverno per il freddo alcune ulceri, e principalmente ne' piedi e' loro diti, talor anco nelle mani de' fanciulli. V'è rossore con mediocre infiammazione; nascono prima alle volte bollicelle, dappoi l'esculcerazione. Vi è poco dolore, maggior è il prudere, alle volte esce umor, ma in poca quantità, che par simile alla Sannie, o al pus.

Primieramente bisogna fomentare con molta acqua calda, nella quale siano cotte rape, o se quelle non si anno, allume, verbenà ch'è delle reprimenti. Se non è ancor aperta la piaga vi s'acposti il rame

caldo quanto uno lo possa comportare. Se già è fatta l'ulcerazione, vi si dee poner sopra allume pestato con incenso in porzione uguale, aggiuntovi vino, o scorza di melagrana cotta in acqua, e poi contuso. Se si è staccata la prima pelle, fanno anche meglio i medicamenti lenitivi.

7. *Della Scrofa e Sua Cura.*

Ancor la Scrofa o Gavina è un tumor, nel qual sotto un aggregato di sangue, e marcia nascono quasi certe glandole, le quali sogliono dar da fare a' medici, essendochè cagionano le febbri, ne mai facilmente maturano. E si curino o col ferro, o col medicamento per lo più di nuovo rinascono accanto le stesse cicatrici, e molto dopo vogliono nuova cura. Alle quali si aggiugne ancor questo, che durano lungo tempo. Vengono principalmente nel collo, ed ancora sotto le ascelle, e negl'inguini, e ne' fianchi. Ed afferma il Chirurgo Meges d'averle ancora ritrovate nelle mammelle delle donne.

Perciò ordinariamente dassi ellebero bianco, ed anche più volte finchè quelle si digerischino. E vi si pongono medicamenti o che tirino fuori; o che dissipino l'umore, de'quali si è fatta d'sopra menzione. Adoprano altresì alcuni adurenti che rodono, ed inducono la crosta, indi la curano come ulcere. Ma in qualunque modo si cu-

ri,

ri, purificato l'ulcere s'eserciti, e si nutrifca il corpo, finache giunga a formar la cicatrice. Le quali cose essendo insegnate da' medici, si è conosciuto per esperienza di certi Contadini, che colui il quale è travagliato dalla gavina se mangia un Serpe si libera.

8. *Del Fignolo, e sua cura.*

Il Fignolo poi è un tumoretto acuto con enfiaggione, e dolore, principalmente nel generarsi la marcia, il quale quando è aperto, ed ella esce, apparisce sotto parte della carne convertita in marcia, parte corrotta, e bianchiccia alquanto rossa, la qual chiamano alcuni il ventricolo del fignolo. In quello non vi è pericolo veruno ancor che niente si curi, stantechè maturazione di per se, e scoppia, ma il dolore fa che si ricorra al medicamento, accio più presto risani.

Il di lui proprio medicamento è il Gabbano, e altre cose dette di sopra. Se mancano gli altri medicamenti sul principio conviene ponervi empiaastro non grasso, accio quello reprima, dappoi se non l'ha represso, qualsivoglia che sia a proposito a suppurare. Se ne men questo vi è, si applichi o raga, o lievito. Cavata la marcia non vi fa di bisogno d'altra cura.

9. *Del Fima, e sua cura.*

Fima chiamasi un tumoretto simile al fignolo,

gnolo, ma piu tondo, e piu piatto, spesso anche maggiore. Attesoche il Fignolo di rado arriva alla grandezza di un mezz'uovo, mai la trapassa. Il Fima ancor è solito allargarfi di vantaggio, ma contiene minore infiammazione, e minor dolore. Cavata ch'è la marcia nello stesso modo apparisce il ventricolo, che non si ritrova nel fignolo. Ogni carne corrotta poi si converte in marcia. Questo nasce piu spesso ne' ragazzi, e piu facilmente si guarisce, ne' Giovani di rado nasce, e piu difficilmente si cura. Nell'età avanzata ne tampoco generasi. Con quali medicamenti poi si curi s'è detto di sopra.

10. *Del Figetlo, e sua cura.*

Il Figetlo è un tumore non alto, ma largo, nel quale si è una certa simiglianza colla bolla. Il dolore e stiramento è gagliardo, e maggior della grandezza del tumore, si aggiugne alle volte anche una febbretta, e questo tardi matura, ne molto si converte in marcia. Nasce per lo più nella testa, sotto le ascelle, o negl'inguini.

I latini lo chiamano *Pano* per la similitudine della figura. E con qual medicamento questo si guarisse l' ho accennato di sopra.

11. *Degl' Ascessi.*

Ma non essendo questi se non minuti ascessi sotto un nome generale puo compren-

prenderfi un male alquanto largo che venga a suppurazione. Si genera cotesto per ordinario dopo le febbri, o dopo i dolori di qualche parte, e principalmente dopo quei del ventre. E per lo piu sta esposto alla vista, essendoche gonfia qualche parte alquanto in larghezza, a similitudine di quello che ho detto chiamarsi *fima*, e divien rossa con calore, e poco dopo anche con durezza, e piu con danno indolisce, cagiona sete, e toglie il sonno. Alle volte però non vi si puo vedere nella cute cosa veruna di queste, e in particolare quando fassi la marcia in profondità. Ma cola sete, e vigilia si sentono dentro alcune punture, e quel che non si fa subitamente duro è migliore, e quello, il qual sebben rosso è altresì di color per altro mutato in bianco. I quali segni vengono quando già generasi la marcia. Il tumore, ed il rossore cominciano molto avanti.

Ma se la parte è morvida dee impedirsi la strada alla materia per mezzo d'empiastri, i quali sieno insieme reprimenti, e rinfrescanti, che altrove, e poco prima d'ora nella pesipola ho proposti. Se già n'è duro si deve venire a quelle cose, che digeriscono, e risolvono, come sarebbe fico secco ammaccato, over feccia d'olio mescolata con cerotto, il qual sia composto di grasso porcino, o radice di coccomero  
salva.

## 106 LIBRO QUINTO

salvatico alla quale s'iano aggiunte due parti di farina, cotte prima in vin mielato. Si puo ancora mescolare in porzioni uguali ammoniaco, galbano, propoli, visco, ed aggiungervi mirra la metà delle cose antedette. E fanno ancora lo stesso gl' empiastri, e unguenti che ho posti di sopra.

Quel che non sarà risoluto da questi medicamenti è necessario che si maturi. Ed acciò questo piu presto segua si applichi farina d' orzo, e vi si puo mescolare acqua cotta alla quale sia mescolato qualche erbaggio. E queste stesse cose convengono ancora ne gli ascessi minori, i nomi, e le proprietà de' quali ho dette di sopra. E di tutte si è la stessa maniera di curare, non solo vi è differenza nel modo. Crudo poi si è quello, nel quale ritrovasi quasi un moto maggiore di vene, (a) gravezza, calore, stramento, dolore, rossore, e durezza. E se sarà eziandio maggiore l' ascesso dura il freddo over ancor la febbretta; e la suppurazione assai nascosta, in vece di quelle cose che in altra parte la cute dimostra, vi sono punture, quando sono queste scemate, e ormai prurisce tal parte, e n'è o lividiccia, o bianchiccia è matura la suppurazione. E aperta che sarà quella o da se o per mezzo di medicamenti, o dal ferro, si dee cavar fuori la marcia. E se'l male  
sarà

(a) cioè di arterie.

farà sotto le ascelle, o negl'inguini si nutrisca senza tasta. Nell'altre parti ancora, se è profonda la piaga, e piccola, se fu ordinaria la suppurazione, se non si farà profundata molto, se non vi è febbre, se è gagliardo il corpo, sono parimente superflue le tastre. Nell'altre si debbono poner ma parcamente, e se vi è solamente gran piaga. Comodamente però applicasi miele sopra le tastre, o senza queste lenticchia in miele, o scorza di melagrana cotta in vino, le quali cose, e di per se, e miste sono a proposito.

Se le parti circonvicine sono indurite, per mollificarle vi si ponga sopra malva pestata, o seme di fien greco, o di lino cotto in vin passo. Tutto ciò poi, che vi si è applicato non dee stringersi, ma leggiermente esser legato. Da questo nessuno sia ingannato, di adoperare in questo genere il cerotto. Le altre cose che appartengono al purgar dell'ulcere, ad empire, allo indurne la cicatrice, sono convenienti quelle, che abbiamo esposte nelle ferite. (a)

#### 12. Delle fistole.

Bene spesso da simili ascessi, e altre sorte d'ulceri ne nascono le fistole. Questo nome ha un certo ulcere profondo, stretto, calloso. Si genera quasi in ogni parte del corpo, e ha alcune cose di proprio in ciascuno luogo.

ghi.

(a) Hipp. 6. Aph.

ghi. Dirò prima delle comuni. Li generi dunque delle fistole sono molti. Attesochè altre sono corte, altre più profundano, altre per dritto s'internano, altre, e molte più assai attraverso; alcune sono d'un sol canale, alcune di due, altre di tre nate da una sola bocca, le quali dentro diventano tre, o ancora si dividono in più cavità. Altre sono rette, altre torte, e serpeggianti. Altre terminano dentro la carne. Altre giungono fin'all'osso, o cartilagine, o quando non vi è sotto alcun di questi arrivano all'interiora. (a) Altre poi con facilità, altre difficilmente si curano, e alcune eziandio se ne ritrovano dell'incurabili.

La cura più facile è nella fistola semplice, fresca, che sia nella parte carnosà; ed ajuta l'istessa corporatura s'è di Giovine, s'è robusta. Il contrario a questo è tutto danno. Parimente se la fistola ha offeso l'osso, cartilagine, nervo, o muscolo, se ha impedito un articolo, se è giunta o alla Vescica; o al polmone se utero, e a vene grandi, e arterie; o alle mascelle, come gola, stomaco, torace. Che quella vada anche verso gl'intestini sempre è pericoloso, e per lo più mortale. Alle quali cose molto di male si aggiugne se il corpo farà infermo, debole, o di abito cattivo.

In primo luogo convien metter dentro la  
fistola

(a) *Hipp. ibid.*



fistola la tenta per poter sapere dove quella si porti, e quanto si sia profundata, come anche se sia umida, over asciutta, il che vedesi, cavata che sarà la tenta. Se poi l'osso sia viziato, o no, ancor questo puo conoscersi, e se la fistola sia penetra:ta fin' all'osso, e quale sia il nocumento, che ne ha cagionato, essendochè s'è morvido ciò che si trova col' estremità della tenta, il male ancora ritrovasi dentro la carne. Se fa resistenza s'è giunto all'osso; in secondo luogo se ivi sdrucchiola la tenta, non è ancor quello carioso, se non isdrucchiola, ma nel poggiare lo sente uguale, è carioso bensì ma leggermente. Se poi si è inuguale e rozzo, è molto corrosivo quell'osso. La cartilagine poi quando vi è sotto il sito medesimo ce l'insegna, ed essersi giunto a quella puo conoscersi dalla resistenza.

Ma dalle cose sopradette si ricavano i siti delle fistole, la profondità, e il nocumento. Se poi siano quelle semplici, o divise in più seni si puo conoscere dalla quantità della marcia; la quale se è in copia maggiore di quello che conviene ad un semplice canale, rendesi manifesto esser più d'una la cavità. Ed essendo per lo più accanto alla carne, e al nervo, e qualche parte nervosa, come sarebbono le tuniche, e le membrane puo comprendersi dalla qualità

## 110 LIBRO QUINTO

lità della marcia ; se più seni averanno dentro corrose diverse parti del corpo . Imperocchè dalla carne esce marcia liscia , e bianca in copia . Ma dal luogo nervoso dello stesso colore , più sottile , e in minor quantità . Dal nervo grassa , e simile all'olio . Finalmente ancora la corruzione del corpo ci manifesta se le fistole sieno penetrate a parti diverse , perchè spesso nel posarsi alcuno diversamente , e nel posare differentemente una parte , comincia a venire la marcia , che già era cessata , e ci fa vedere non solo esser differente cavità d'onde n' esce , ma che è voltata verso differente parte del corpo .

Che s' è nella parte carnosa , se è dritta , e semplice , ne crespola , ne in parte concava , ne in un articolo , ma in quel membro che di sua natura immobile si move solo col corpo tutto , assai gioverà l'empiaastro , che si pone sopra alle ferite , fresche , purchè contenga o sale , o alume , o squama di rame , o verderame , o qualche cosa estratta da metalli . E di quello dee farsi un collirio una parte più liquido , e l'altra parte più piena e quella porzione più liquida andando avanti all' altra più soda , deve infonderfi nella fistola , fintantoche apparisca il sangue puro . Il che dee perpetuamente osservarsi in tutti li collirj  
delle

**CAPOVENTESIMO OTTAVO. IIII**

delle fistole. Dipoi lo stesso empiastro s' applichi sopra la pezzetta di lino, e sopra pongavisi una sponga bagnata prima in aceto, e basta che si disfasci dopo cinque giorni. (a) E si usi tal sorta di vito, qual ho insegnato che nutrisce la carne.

Se poi è la fistola lontana dalle viscere, è necessario che digiuno mangi di quando in quando del rafano, e dapoì uomiti.

Coll' invecchiare diventa callosa la fistola; il callo poi non può ingannarne alcuno, perchè è duro, o bianco, o pallido, ma allora n'abbisognano medicamenti più gagliardi. Qual è quello che contiene: Opio P. \* j. gomma P. \* iij. cadmia P. \* iij. Vetriolo P. \* viij. Delle quali cose impastate in acqua fassi il Collirio. Ovvero quell'altro, nel quale ritrovafi. Galla P. \* j. verderame, sandracca, alume, egiziaco ana P. \* j. vetriolo adusto P. \* ij. Oppur quello che n'è composto di calcite, e pietra di calcina, alle quali cose, s'aggiugne Orpimento la metà meno delle cose antedette, e si mescolano con miel cotto. Facilissimo però è, per insegnamento di Megete, pestare erugine rasa P. \* ij. dapoì disfare col'aceto ammoniacò timiama ana P. \* ij. e gettatolo sopra l'arugine mescolarla insieme. E questo è de' principali medicamenti. Ma siccome

(a) Ippocr. vuol che si sfasci ogni giorno, e che si netti, e visi metta il Verderame.

ficcome questi sono d' grandissima possanza, se alcuno non avesse li detti in pronto potrà facilmente consumar il callo con qualsia medicamento adurente, e chi non averà medicamenti a tal effetto potrà corroder quello con corrisivi, ed è bastante ugnere col medicamento, o papiro (*carta*) torta, o qualch' altro stoppone all' uso del collirio: la scilla cotta parimente mescolata con calcina rode il callo.

Se poi sarà la fistola lunga, e trasversa, introduttavi la tenta è meglio che si tagli di contro la cima di quella e vi si metta dall'una e l'altra parte il Collirio.

Ma se giudichiamo, che la fistola sia di due o più canali in modo però, che sia corta, e dentro la carne, non dobbiamo adoperar un collirio, che curi una parte, e tralasci le altre; ma gli stessi medicamenti asciutti si mettono in una penna da scrivere, e questa s'accosti all'orifizio della fistola, e vi si soffi dentro accio que' medicamenti si spinghino dentro. Oppure le stesse cose si liquefaccino nel vino, o se è sordida la fistola nel vino mielato, se callosa nell'aceto, e vi s' infonda dentro qualunque cosa vi si trova. Vi si debbono applicar sopra rinfrescanti, e reprimenti. Imperocche per ordinario le parti intorno la fistola anno qualche poco d' infiammazione. Ne sarà fuori di proposito quando l'  
**averà**

averà sciolta prima di gettarvi di nuovo altri medicamenti lavar la fistola co' lo schizetto, se viene in quantità la marcia col vino, se il callo è duro, co' l'aceto. Se già si purga col vin mielato, o con acqua, nella quale sia cotto moco in modo che ancora a questa s'aggiunga un poco di miele.

Per ordinario però segue, che quella tunica che si è tra 'l forame, e la carne sana, vinta da tanti medicamenti, n' esca tutta, e sotto sia puro l'ulcere. Il che se farà seguito, si applichinò agglutirianti, e in specie una sponga bagnata con miel cotto. E mi è noto esser piaciuto a molti di ponervi dentro una tasta intinta di miele, aggiustata a foggia di collirio, ma questo anzi si agglutina, che si empia. Ne si dee dubitare, che un corpo puro congiunto al corpo puro non si unisca, co' l'aggiungervi anche i medicamenti a tal effetto proporzionati, essendochè spesso l'esculcerazione de' diti, se con gran diligenza non vi provvederemo nel risanare, congiugne quelli insieme.

### 13. Dell' Ulcera detto Cerion.

Vi è ancora una sorta di ulcere, che dalla similitudine dello sciame dell'api chiamasi da Greci *Cerion*. E questo contiene due specie: Un'è bianchiccio simile al fignolo, ma più grande, e con dolor maggiore. Il quale quando matura ha certi fori, da' quali esce l'u-

mor viscoso, e marcioso, ne però risana. Se si apre vi si trova piu di corrotto dentro che nel signolo, e piu di effo s'interna. Di rado nasce fuori de'capelli.

L'altro è minore, ed eminente sopra del capo, duro, largo, verdiccio, un poco bianco, piu esulcerato, poichè sono i fori accanto le radici di ciascun pelo, da'quali esce umor viscoso, bianchiccio, di consistenza simile al miele, o visco, allevolte come olio; Se si taglia, apparisce dentro la carne verde; Il dolor poi, e l'infiammazione è grande talmente che è solito anche arrecare la febbre acuta.

Sopra quello che da meno spessi fori n'è esulcerato vi si puo metter e fico secco, e seme di lino cotto in vino mulso, e l'empiastri, e malammi per tirar fuori la materia, e che fanno a questo proposito l'ho detto di sopra.

Sopra l'altro sì gl'istessi medicamenti come anche farina cotta in mulso, dimodoche gli si aggiunga la metà di ragia di terebinto, e fico cotto in vin mielato, al quale sia aggiunto un poco d'issopo pestato, e la quarta parte di Brionia nera, (*una taminia*) aggiuntovi il fico. Che se i medicamenti nell'un' e nell'altra sorta poco giovano, bisogna tagliar tutto l'ulcere fin' alla carne sana. Levato l'ulcere poner sopra la piaga medicamenti prima che tirino fuori la marcia,

marcia, dipoi che purghino, finalmente che riempino.

14. *Dell' Acrocordone, Timio, mermeggie, e Cbiodo.*

Sonovi alcuni mali simili a i porri, (a) i quali siccome sono diversi, così anno differenti nomi. E' chiamato da' Greci *Acrocordone*, quando sotto la pelle si fa una radunanza dura, e allevolte con un poco d'asprezza dello stesso colore, di sotto sottile, accanto la pelle piu largo. E questo piccolo perche di rado trapassa la grandezza d' una fava. Appena ne nasce un solo nello stesso tempo, ma per l'ordinario piu d'uno e in particolare ne' ragazzi, e quelli allevolte all'improvviso guariscono, allevolte cagionano una mediocre infiammazione. Ve ne sono altresì alcuni che si suppurano.

Chiamasi poi *Timio* quello che avanza sopra il corpo come una erruca, accanto la pelle, piu largo di sopra, sottile, duro, e nella cima molto ruvido. E questa sommità mostra il colore del fiore timio, dal quale piglia il nome, e in quella parte facilmente si rompe, e si lacera, allevolte manda fuor alquanto sangue, e ordinariamente è minor in grandezza d'una fava egiziaca, di rado maggiore, allevolte molto piccolo, ora un solo, ora piu d'uno, nascono o vicino il calcagno, o nel-

H 2 le

(a) cioè nerruche che nascono nelle mani.

le palme delle mani, o nelle parti inferiori dei piedi. I peggiori però sono nelle parti vergognose, e principalmente quando mandano sangue. (a)

Mermeggie poi chiamansi quelli che sono più bassi del Timio, e più duri, e che più profundano le radici, e movono maggior dolore, sotto più larghe, sopra più sottili, e gettano meno sangue, in grandezza mai appena passano la figura di un lupino. Vengono ancor esse o nelle palme delle mani, o nelle parti di sotto de' piedi. (b)

Il chiodo poi vien allevolte anche altrove, ma per lo più però ne' piedi, e principalmente da qualche contusione benché allevolte altrimenti generasi, e ne cagiona dolore, se non in altro modo almeno nel camminare.

Di questi mali l' Acrocordone, come anche il Timio spesso guariscono eziandio di per se, e tanto più quando sono minori. Le mermeggie, ed il chiodo appena mai guariscono senza curarsi. L' Acrocordone se è tagliato non vi lascia radice veruna, e per tanto nemmen rinasce. Il Timio e il Chiodo tagliati che sono nasce sotto una radice tonda, la quale giugne fin' alla carne, e rimanendovi quella, rinasce esso pure di

(a) *Myrmecia* così detto da morsi delle formiche. (b) Chiodo cioè callo.



## CAPO VENTESIMO OTTAVO. 117

di nuovo. Le mermeggie sono attaccate con radici più larghe, e però neppure possono tagliarsi senza grand'esulcerazione. Il chiodo è ben raderlo di quando in quando; perchè senz'alcuna violenza così si ammollifica, e se anche sarà uscito un poco di sangue per lo più va via. Si guarisce pure se alcuno lo purgherà intorno, e vi porrà raga di terebinto, alla quale abbia mischiato un poco di quella polvere, la qual averà fatta di pietra da molino pestata. L'altre sorte poi sono da curarsi con medicamenti adurenti. Ed agli altri è approposito quello che fassi di feccie di vino, alle mermeggie quello, che è composto d'alume, e sandracca. Ma si debbon coprire con foglie le parti prossime, accio ancor esse non s'esulcerino, dappoi vi s'applichi lenticchia. Il Timio vien guarito ancora dal Fico secco cotto in acqua.

### 15. *Delle sorte delle Pustole, e loro cure.*

Le Pustole si generano principalmente nella Primavera. Le loro sorte sono più. Attesoche allevolte per tutto il corpo, o per qualche parte si fa una certa ruvidezza simile a quelle pustole, che generansi dall'ortica, o dal sudore, i quali i Greci nominano *Efantemi*, e quelle talvolta non son differenti dal color della pelle, allevolte vengono in quantità simili al vaiuolo, allevolte sono bolle maggiori. Le Pustole li-

vide, o pallide, o nere, e per altro di color mutato dal naturale, e sotto a queste ritrovafi umore. Aperte che sono apparisce dentro carne come ulcerata, in Greco chiamafi *Eliode*. *ελκῶδες* Nascono o per il freddo, o per il fuoco, o da medicamenti.

Il Flizacion *φλυζακτιον* ovvero *ψυδρακτιον* ò pur *ψυξεακτια* poi è una bolla alquanto piu dura, bianchiccia, aguzza, dalla quale ciò che si sprema è umido: Dalle bolle talvolta fannofi piccole ulcere o più asciutte, o più umide, ed ora solamente con prudere, or con infiammazione, o dolore insieme, e scaturisce o Pus, o Sanie, o l'un' è l'altro. E questo principalmente accade nella fanciullezza, di rado in mezzo al corpo, ma spesso nelle parti eminenti.

La peggior delle pustole è quella che chiamafi *Epiniſtis*. *επιπυκτις* E' cotesta di color o lividiccia, o alquanto nera, o ancor bianca. Intorno a questa poi vi è grande infiammazione, e aperta che ella è vi si trova dentro un' esulcerazione mucosa, il colore è simile al suo umore. Il dolore che reca è maggiore della sua grandezza, imperocchè non è piu grande d' una fava. E ancor questa nasce nelle parti eminenti, e per lo piu di notte, onde ne ha anche ottenuto da Greci il nome di *Epiniſtis*.

In ogni sorta di pustole la cura principale

capale si è camminar molto, ed esercitarsi; se questo vien impedito, farsi portare. In secondo luogo convien sminuire il cibo, astenersi dagli acidi, e dagli attenuanti, e lo stesso debbono far le nutrici, se il fanciullo che latta averà questo male. Oltre tali cose l'uomo già robusto, se sono minute le pustole, deve sudare nel bagno, ed anche sparger sopra quelle nitro, e mescolar olio, e vino, e così ungersi. Dipoi scender nel bagno. Se così niente si giova, o pur se sarà nata una sorta di pustole maggior, vi si ponga sopra lenticchia, e tolta via la pellicina facciasì passaggio a' medicamenti lenitivi. L'Epiniētis dopo la lenticchia curasi a proposito co' l' erba sanguinella, o coriandro verde.

L'ulceri fatte dalle pustole si sanano co' la schiuma d'argento mescolata con seme di fien greco, in modo che a dette cose si aggiunga olio rosato, e sugo d'endivia finattantoche si faccia la crassezza del miele. In specie poi a quelle pustole che travagliano i fanciulli si mescola pietra mare Gesita P. \* viij. con num. 50. noci amare e vi s'aggiugne olio ciati tre. Ma debbono prima ungersi le pustole con cerassa, e dappoi empiastrarle col suddetto medicamento.

16. *Della Rogna, e sua cura.*

Rogna poi si è la pelle fatta più dura, e rossa, dalla quale nascono bollicelle al-

cune piu umide . altre piu asciutte . Esce-  
da alcune la marcia , e fassi da quelle una  
continua esulcerazione con prudore , e in  
alcuni prestamente serpeggia . E in altri in  
tutto veramente termina , in altri poi a  
certi tempi dell' anno ritorna . Quanto è  
piu ruvida , e quanto è maggiore il pru-  
dore tanto più difficilmente si guarisce .  
Percio questa tale la chiamano i Greci *A-  
grian* , cioè selvatica .

In questa pur conviene lo stesso modo  
di vivere detto di sopra . Il medicamento  
poi di essa quando è sul cominciare , è ap-  
proposito quello che si compone di spodio ,  
croco , verderame ana P. \* j. pepe bianco ,  
agresto ana P. \* j. Cadmia P. \* viij. O-  
ver quando è gia fatta l'esulcerazione quel-  
lo che fassi di solfo P. \* j. cera P. \* viij.  
pece liquida un' emina , olio il terzo d'un  
fiasco . Le quali cose si cuocono insieme  
finche venga alla crassezza del miele . Vi  
è ancora quello che si riferisce a Protar-  
co . Contiene questo farina di lupini un se-  
stario , nitro ciati quattro , peceliquida un'  
emina , ragia umida mezza libra , aceto  
ciati tre . Mescolansi parimente con pro-  
fitto Croco , licio , verderame , mirra , cene-  
re in porzioni eguali , e si cuocono in vin-  
passo , e questo reprime da per tutto la ro-  
gna . Che se non vi è altro la morca cot-  
ta atta terza parte , over solfo misto con  
pece

pece liquida, siccome diffi degli armenti così anche giovano all'uomo che abbia la rogna.

17. *Delle Specie, e cure delle Peteggini.*

Le specie delle Peteggini sono quattro. La miglior è quella che somiglia la rogna, perche è rossa, e dura, ed è esulcerata, e prude. E' però differente da quella perche ha maggior esulcerazione, e le bollicelle simili al Vaiolo, e pare che sieno in quella quasi certe bollicelle, dalle quali di quando in quando si staccano le croste, e ritorna questo a tempi determinati.

L'altra sorta è peggiore, e per lo piu simile quasi alle papule, ma piu aspra, e piu rossa, di varie figure, le croste si distaccano dalla superficie della pelle, è maggior il prurito, più presto, e piu in larghezza si avvanza, e generasi, e cessa a tempi anche piu certi della prima, chiamasi questa rossa.

La terza è ancor di quella peggiore, stantechè ed è piu crassa, piu dura, e pin gonfia, nella sommità della cute si apre, e piu gagliardamente prude.

Ancor essa squamosa, ma nera si allarga, e ne tarda, e meno, ne a tempi determinati nasce, o termina, ne in tutto si toglie via, chiamasi Petiggine nera.

La quarta sorta si è quella che non ammette cura, di differente colore, imperocchè si è bianchiccia, e simile ad una cicatri-

catrice fresca, ed ha le scaglie pallide, alcune bianchiccie, altre simili alla lenticchia, quali levate alle volte esce il sangue, Ma per altro l'umor di quella è bianchiccio, la cute dura, e con fisure, e piu si dilata. Tutte queste sorte poi per lo piu nascono nelle mani, e ne' piedi, e ancora molestanto l'ugne. Non vi è medicamento piu gagliardo che quello che ho riferito esser buono anche alla rogna per invenzione di Protarco. Serapione poi mescolava con abbondante ragia nitro P. \* ij. solfo \* iiij. e di quello servivasi.

18. *Delle Papule, e sue cure.*

Le sorte poi delle Papule sono due. La prima è quella, nella quale con minime bollicine la pelle s'irruvidisce, e rosseggia, e leggermente si rode, ha il mezzo alquanto piu liscio, tardi serpeggia, comincia questo male molto rotondo, e nello stesso modo rotondo si avvanza. La seconda è quella, che chiamano i Greci *Agrian* cioè selvatica, nella quale parimente sì, ma divantaggio la cute s'irruvidisce, e si esulcera, e piu pizzica, e rosseggia, talvolta ancora rimette i peli.

Quella che è meno tonda piu difficilmente risana, se non è levata via si converte in Petiggine, ma la papula leggera se si stropiccia ogni mattina a digiuno co la saliva guarisce; la maggior comodamente

CAPO VENTESIMO OTTAVO. 123

mente sanasi co' l'erba murale, se vi si pone sopra pestata. Per venir poi a' medicinali composti quello stesso di Protarco tanto è di maggior virtù in queste, quanto minor è il male. L'altro di micone vale al medesimo. R. nitro rosso, incenso ana \* j. cantarelle purgate P. \* ij. Solfo Vergine \* ij. trementina liquida P. \* xx. farina di loglio Sestarij iij. Gith ciati tre, pece cruda sest. uno.

19. *Delle specie della vitiligine, cioè Alfo, melane, e Leuce, e loro cure.*

Ancor la vitiligine benchè di per se non porti pericolo veruno contutto ciò è deforme, e nasce da mal abito di corpo. Le di lei specie sono tre. *Alfos* *αλφος* chiamasi quando è di color bianco, un poco ruvidiccio, e non continuato, talmentechè paiono come gocce sparse, allevolte ancora serpeggia lontano, e con certe intermissioni. Il *Melas melas* è di color differente da questo, perchè è nero, e uniforme all'ombra, nel resto è simile. La *leuce* hà non focche di simile all'*Alfo*, ma è più bianca, e più s'interna, ed in quella sono peli bianchi, simili alla lanugine. Tutti questi mali serpeggiano, ma in chi più presto, in chi più tardi l'*Alfo*, ed il *melas* in certi varj tempi nascono, e terminano. Quando è venuta la *leuce* non facilmente si parte.

I due primi ammettono cura non molto diffi-

difficile , il terzo appena mai risana , se qualche poco si sarà scemato quel male, non perciò in tutto si restituisce il color sano. Se poi l'uno di questi mali sia sanabile, o non si conosce con una facile sperienza. Imperocchè deve tagliarsi la pelle , o pungerli co'l ago , se n'esce sangue , il che segue per lo piu ne' primi due , il male si è rimediabile; se n'esce umor bianchiccio non può sanarsi. Pertanto questo convien lasciarlo stare.

Sopra quello poi che ammette cura vi si deve poner lenticchia mista con solfo , ed incenso talmente che quella sia pestata in aceto. Un altro vale all' istesso effetto, la invenzione di cui si riferisce a Ireneo. R. schiuma di mare, nitro, cumino, foglie di fico secche si pestano in porzioni uguali, aggiuntovi aceto. Con queste cose al sole s' unge la vitiligine, dappoi non molto dopo, accio non troppo si roda, lavasi. In specie poi alcuni per autorità di Micone ungono con questo medicamento quel che ho detto chiamarsi Alfoso R. solfo P. \* ij. nitro P. iiij. mirra secca pestata acetabolo; dappoi nel bagno sopra la vitiligine vi s' ispruzzano farina di fave, indi vi si pongono le cose suddette. Il melane poi curasi quando pestate insieme schiuma di mare, incenso, orzo, fava; e tali cose senz'olio, nel bagno prima di sudare si gettan sopra, e poscia si stropiccia detta sorta di Vitiligine.



## LIBRO SESTO.

## C A P O I.

*De' Mali di ciascuna parte del corpo.*

**D**issi di quei mali, che generandosi per tutto il corpo richiedono l'aiuto de' medicamenti. Ora verrò a dir di quei, che non sono soliti farsi se non in parti determinate del corpo, dando principio dal capo.

*1. Del cader de' capelli.*

Da questo dunque cadendo i capelli, il piu delle volte si rimedia col raderli spesso. Ed ancora gli da una certa forza per star attaccati il laudano mescolato con olio. Parlo però ora di quei capelli, che per lo piu cadono dopo le malattie. Essendo che non puo in verun modo rimediarsi che a certuni non si renda il capo calvo per la vecchiaia.

## C A P O II.

*Della Porrigine; e sua cura Gracè p<sup>ro</sup>visata*

**P**orrigine poi si è quando fra' peli si alzano come certe scagliette, e quelle si staccano dalla pelle, e talvolta sono umide,

de, per lo piu però asciutte. Ed accade questo allevolte senz'ulcere, allevolte co' l' esulcerazione della parte, e questo segue talor con cattivo odore; talor senz'alcun accidente. Per lo piu nasce questo ne capelli, di rado nella barba, talvolta anche nelle ciglia. Ma non vien questo male senza qualche difetto del corpo, neppur del tutto è inutile stanteche essendo ben sano il capo non esce tal materia, e quando vi è qualche vizio è meglio che si corrompa la sommità della pelle, che quella materia nociva si rivolti a qualche altra parte piu necessaria.

Dunque meglio si è di quando in quando purgarlo col pettine, che del tutto impedirlo. Se però tal cosa n'apporta troppo fastidio, il che puo farsi escendone umore, e tanto piu se questo è di odore cattivo, devesi spesso radere il capo, dappoi applicarvisi qualche reprimente leggiero, come sarebbe nitro con aceto, o ladano con vino e mirtino; o mirobalano con vino. Se queste cose poco giovano possono adoperarsi piu gagliarde, con questo però che sappiamo, non esser una tal cosa utile sul principio del male.

*Del Sicosi, e sua cura.*

**R**itrovafi ancora un'ulcera la qual dalla similitudine che tien col fico chiamafi da' Greci *Sicosis*. (συκώσις) Suol crescere la carne, ed è questa cosa generale. Sotto questa poi sono due specie. Un sicosi è duro, e tondo, l'altro umido, e inuguale. Dal duro esce poca, e viscosa materia. Dall'umido piu copiosa, e di odore cattivo. Generafi l'uno, e l'altro in quelle parti, che sono coperte da peli, ma quello che si è calloso, e tondo, per lo piu nella barba, quello poi, che è umido nei capelli.

Sopra l'uno e l'altro convien porvi elaterio, ovvero seme di lino macinato, e unito in acqua, o fico cotto nell'acqua, o l'empiaastro tetrafarmaco disfatto in aceto, si ugne ancora con terra Eutria disfatta parimente in aceto.

## C A P O IV.

*Dell' Aree, ovvero Piazzette, e loro cura.*

**D**ell' Aree parimente sono due specie. E' comune all'una, ed all'altra che ammortita l'ultima pellicola i peli prima s'este-

s'estenuano, e poi cadono, e se quella parte si forerà uscirà sangue liquido, e di odore cattivo, e va crescendo l'uno, e l'altro, in alcuni presto, in alcuni tardi. Peggior è quella sorta, che rende la cute densa, alquanto untuosa, ed in tutto senza peli; ma quella che chiamasi *Alopecia* αλωπεκία si allarga in qualsivoglia figura, generasi ne' capelli, e nella barba. Quello poi che dalla similitudine del serpente vien detto *Ophiastis* (οφίαστις) prende principio dalla collottola, non trapassa la larghezza di due dita, serpeggia per due strade verso le orecchie, e ad alcuni ancora fino alla fronte, finattantoche i due capi nella parte d'avanti si unischino insieme; quel mal fassi in qualsivoglia età, questo per lo più ne' fanciulli. Quello quasi mai senza cura, questo di per se spesso guarisce.

Sono alcuni che tali sorte d'ave tagliuzzano co' la lancetta, alcuni l'empiastrano con adurenti in olio, e principalmente con carta bruciata. Altri vi applicano trementina con trapfia. Ma non v'è meglio che raderle ogni giorno col rasoio, dal quale scorticatafi appoco appoco l'estrema pellicola si scuoprono le radici de' peli. Ne prima si dee usare, che si vedino spessi nascere i peli; la parte poi che si va radendo, basta che sia empiastrata col vetriolo,

*De Varj, Lentiggine, ed Efelide, eloro cure.*

**E'** Quasi scioccheria il medicare i Varj, le Lentiggini, e l'Efelidi, ma non può impedirsi alle donne la cura della lor bellezza. Di queste che ho dette i Varj, e lentiggini sono volgarmente note, benché sia un poco rara quella specie, la qual chiamano i Greci *παρία* essendo una lentiggine più rossa, e più ineguale. L' Efelide poi dalla maggior parte non è conosciuta, la qual non è altro se non una certa asprezza, e durezza di cattivo colore; l'altre non sogliono nascere se non nella faccia, le lentiggini alle volte anche in altra parte, delle quali però non mi è parso comodo scriverne in altro luogo.

Ma i Varj curansi facilmente col povervi sopra trementina, alla quale sia aggiunto altrettanto alume scissile, ed un poco di miele: tolgono la Lentiggine il Galbano, e nitro in porzioni eguali, e pestati in aceto finché sieno sodi come miele. S'empiastrì con queste cose, e lasciatevele stare molte ore; la mattina si lavi, e leggiermente si unga con olio.

L' Efelide si guarisce co la trementina, a cui sia aggiunta una terza parte di sal forsile, ed un poco di miele. A tutti que-

*Celfo Volg. Tom. II.*                      I                      Ri

sti mali, e di piu a colorire le cicatrici  
puo molto quella composizione, che si at-  
tribuisce a Trifone il vecchio. Contiene  
questa porzioni uguali di mirobolario, cro-  
comagna, creta cimolia, noci amare, fari-  
na d'orzo, di moco, struzio bianco, seme  
di fertula campana. (a) Le quali cose tut-  
te pestate si mescolano in miele del piu a-  
maro, e tenutevi sopra dalla sera alla mat-  
tina, dappoi si lava.

## C A P O VI.

*De' mali degli occhi, e loro cure, e princi-  
palmente di quelli, che curansi con  
medicamenti lenitivi.*

**S**ONO però questi mali ordinarj. A gra-  
vi, e diversi accidenti sono esposti gli  
occhi nostri; i quali avendo una gran par-  
te nell'uso, e giocondità della nostra vita  
debbonfi con somma diligenza custodire.

Subito dunque che sarà cominciata la la-  
grimazione sonovi alcuni segni, da' quali  
possiamo ricavare cio che ne sia per segui-  
re. Attesochè se subito che averanno co-  
minciato la lacrima, il tumore, e la pi-  
tuita crassa; se quella pituita è mescolata  
co la lagrima, e quella lagrima è calda,  
e la

(a) Si trova del miel amaro fatto dalle pecchie  
che hanno succhiato erbe amare.

e la pituita bianca, e morvida, il tumore non duro, non si dee temer per lunga la malattia. Ma se la lagrima è copiosa, e calda, la pituita poca, il tumor piccolo, e cio in un occhio solo, è per esser questo mal lungo, ma senza pericolo. E questa sorta di lagrimazione è senza dolore, ma appena si guarisce prima di venti giorni; dura talvolta due mesi, ed alle volte si guarisce prima (a).

Se comincia la pituita ad esser bianca, e tenera, e mescolasi co le lagrime, ovvero se queste cose infestano l'un, e l'altro occhio puo esser piu corta, ma vi è pericolo di ulceri. La pituita poi secca, ed asciutta muove veramente il dolore, ma finalmente piu presto finisce se non averà fatta qualche esulcerazione.

Il tumor grande se è senza dolore, e secco, non è pericoloso. Se è secco, ma con dolore per lo piu esulcera ed alle volte segue, che in tal caso la palpebra si attacca co l'occhio. Vi è l'istesso pericolo d'esulcerazione nelle palpebre, e pupille quando oltre un gran dolore scorrono lagrime false, e calde, ovvero ancora se finisce il tumore, fluisce per lungo tempo lagrima con pituita.

E ancor peggio quando la pituita è bianca, o livida, scaturisce la lagrima calda

I 2 in

(a) cioè in giorni 40 come dice Ippocr.

in copia, è caldo il capo, giugne dalle tempie fin agli occhi il dolore, manca il sonno la notte. Atteso che con queste cose rompesi per lo piu l'occhio, e si può sperare solamente che si esulceri, all'occhio rotto dalla parte di dentro da giovamento una piccola febbre. Se la rottura è dalla parte di fuori non v'è rimedio. Se del nero dell'occhio qualche parte è diventata bianca vi sta lungo tempo. Ma se vi è asprezza, e crassizie anche dopo la cura vi lascia qualche segno.

Che si curino poi gli occhi colla missione del sangue, con il purgante, e col bagno, e col vino lasciollo scritto Ippocrate Autore Antichissimo. Ma i tempi di quelli, e le cagioni poco spiegò, nelle quali consiste la somma del medicare. E talor non è minor l'ajuto, che ne porge l'astinenza, ed il mover del ventre. Sono dunque questi allevolte infiammati, quando in essi ritrovasi dolore con tumore, e ne viene un corso di pituita allevolte copioso, ovvero acre, allevolte nell'un, e l'altro genere piu moderato. In simil caso i primi rimedj sono il riposo, e l'astinenza. Doverà dunque nel primo giorno giacere in luogo oscuro, e astenersi ancora dal discorrere, non prender cibo; se sia possibile nemmen acqua, se non certo meno che si possa.

Che



Che se sono grandi i dolori piu comodamente nel secondo giorno, se poi l'urgenza così comporta anche nel primo devessicar il sangue, principalmente se le vene della fronte gonfiano, e se essendo robusto il corpo l'abbonda la materia. Se poi minor sarà l'impeto di quella ricerca altresì meno vemente la cura; si mova il ventre, ma solo nel secondo, o terzo giorno. Che se sarà piccola l'infiammazione non richiede alcuno di questi due rimedj, ed è abbastanza usare la quiete, e l'astinenza.

Non dee però esser lungo il digiuno nell'infiammazioni degli occhi, accio non si affottigli, o pigli acrimonia la pituita. Ma nel secondo giorno dee darsi quel cibo, che puo parere piu leggiero fra quelle cose, che rendono la pituita piu crassa, come farebbero vova a bere. Se si diminuisce il male ancor una minestrina, o pane inzuppato in latte. (a) Ne' giorni seguenti quanto scemerassi l'infiammazione tanto potrai accrescer il cibo, ma dell'istessa sorte, in modo però, che non si prenda roba salsa, acre, o che affottigli; niente altro si beva che acqua. E tal modo di vivere è veramente molto necessario.

Subito poi nel primo giorno si prenda.

I 3

Croco.

(a) Non a qualsivoglia lippitudine convien il latte, ma a quella originata da umori acri.

Croco P. \* j. fior di farina bianchissima P. \* ij. e si mescoli co la chiara d' uovo finche abbia la sodezza del miele, e s'empiafri sopra una pezzetta e si attacchi su la fronte, acciò per la compressione delle vene s'impedisca il flusso alla pituita, se non si ha il croco fa lo stesso l'incenso; che si ponga poi sopra pezzetta di lino, o lana niente importa. Debbono gli occhi ancor esser unti con questa composizione. Si prenda Croco quanto sene puo prendere con tre dita, mirra quanto una fava, opio quanto una lenticchia, e si mescolino co' vin passò, e co lo specillo si ponghino sopra l'occhio. (a) Altro all'istesso effetto. Mirra \* j. sugo di mandragora P. \* ij. foglie di rosa, seme di cicuta ana P. \* iij. acazia P. \* iij. gomma P. \* viij. E queste cose vi si ponghino di giorno; di notte poi acciò piu facilmente venga il sonno non è fuor di proposito ponervi sopra midolla di pane bianco disfatta in vino, poiche reprime la pituita, e se esce qualche lagrima la sorbisce, e non lascia, che l'occhio si attacchi. Se ciò parrà duro, e peso per il gran dolore degli occhi si getti in un vaso il bianco, ed il rosso di un uovo; e vi s'aggiunga un poco di mulso, e si mescoli col dito, quanto si è mescolato vi si ponga dentro

(a) Questo come narcotico non si deve usar se non in gran necessità.

dentro lana morvida ben scardazzata, che le assorbiſce quella compoſizione, e pongaſi ſopra gli occhi. Queſta coſa ed è leggiera, e col ſuo rinfreſcare tien a freno la pituita, e non riſecca, ne laſcia attaccare l'occhio inſieme. Vi ſi pone altresì comodamente farina d'orzo cotta, e meſcolata con mela cotogna cotta. (a) Ne è fuor di ragione ſervirſi d'uno ſtraccetto bagnato in acqua ſe piccola è l'inſiammazione, ſe poi è maggiore, in aceto adacquato. Le coſe ſopradette debbono legarſi con ſcia, accio non cadino nel dormire, e queſto baſta che vi ſi ponga ſopra, perche puo facilmente eſſervi da eſſo infermo rimieſſo, ed eſſendo raiſciutto di nuovo biſogna ribagnarlo. Se il male è coſì grande che tolga per lungo tempo il ri-poſo, diaſi alcuno di quei medicamenti, che chiamano i Greci narcotici *Anodini*. Ed è aſſai per un fanciullo quanto un moco, per un uomo in quantità d'una fava. Nell'occhio poi il primo giorno regolarmente non vi ſi pone coſa veruna, ſe per altro non foſſe grandiffima l'inſiammazione: ſtantechè ſpeſſo dal medicamento ſi accreſce il fluſſo della pituita piuttosto che ſi diminuiſca. Dal ſecondo giorno in poi anche la grave lippitudine ſi medica con applicarvi medicamenti, quando o farà fatto la miſſione del

I 4

ſan-

(a) migliori ſono i ſemi di melacotogna.

sangue, o purgato il ventre, o sarà manifesto nessuna di queste due cose esser necessaria.

2. *Diversi Collirj per gli Occhi.*

Vi sono molti Collirj, e di molti Autori, che sono buoni a questo, e con nuove misture ancora si possono temperare; essendochè i medicamenti lenitivi, e che mediocrementemente reprimono con facilità, e variamente si mescolano. Io porterò i più celebri.

3. *Collirio di Filone.*

V'è il Collirio di Filone, il qual contiene cerussa lavata, spodio, gomma, ana P. \* j. opio adusto P. \* j. Deve però sapersi che qui ancora tutti i medicamenti si pestano prima di per se, e dappoi di nuovo quando sono mescolati, aggiuntavi appoco appoco, o acqua, o altro liquore; la gomma avendo alcune altre virtù, opera questo principalmente, che essendosi seccati i collirj già fatti stiano insieme, e non si stitolino.

4. *Collirio di Dionisio.*

Il Collirio di Dionisio è questo. Opio abbruciato finche diventi tenero P. \* j. incenso bruciato, gomma ana P. \* ij. spodio P. \* iij.

5. *Collirio di Cleone.*

Molto celebre si è quello di Cleone. Opio fritto P. \* j. croco \* j. gomma P. \* v. alle quali cose mentre si prestano s'aggiugne sugo di rosa. Altro più possente

dello stesso, squama del ferro che chiama-  
no *Stomoma* \* j. croco P. \* ij. spodio P.  
\* iiij. piombo lavato, e abbruciato P. \* j.  
gomma altrettanto. Altro dello stesso prin-  
cipalmente quando scorre in copia la pi-  
tuita: Castoreo P. \* j. aloe P. \* j. mirra  
P. \* ij. cadmia curata P. \* viij. stibio P.  
\* viij. sugo d'acazia \* xij. il che mesco-  
lato con gomma si conserva liquido nel  
vaso. Teodoto poi aggiunse a questa com-  
posizione opio abbruciato P. \* j. rame a-  
dusto, e lavato \* ij. ossi di datteri abbru-  
ciati P. \* x. gomma P. \* xij.

6. *Collirio di Teodoto detto Acaristo.*

Del medesimo Teodoto, quel Collirio  
che da alcuni chiamasi Acaristo è questo.  
Castoreo nardo indico ana P. \* j. licio  
P. \* j. opio P. \* j. mirra \* ij. croco, ce-  
rassa lavata, aloe ana P. \* iiij. cadmia, bo-  
tri lavata, rame abbruciato ana P. \* viij.  
gomma P. \* xviii. sugo d'acazia P. \* xx.  
stibio altrettanto, alle quali cose aggiugne-  
si acqua piovana.

7. *Collirio Cition, o Tefrion.*

Oltre questi fra piu usati Collirj si è  
quello che alcuni chiamano *Cition*, o *Te-  
frion* dal color di cenere che mostra. Ami-  
do, draganti, sugo d'acazia, gomma ana  
P. \* j. opio P. \* ij. cerussa lavata P. \*  
iv. schiuma d'argento lavata P. \* viij. le  
quali cose parimente si uniscono insieme  
con acqua piovana.

8. *Col-*

8. *Collirio d' Evelpide chiamato Trigodes.*

Evelpide poi, il qual a' nostri tempi fu un gran medico di occhi adoperava quello che egli aveva composto qual chiamava Trigodes. Castoreo P. \* ij. licio, nardo, opio ana P. \* j. croco, mirra, aloë ana P. \* iiij. rame abbruciato P. \* viii. cadmia, stibio ana P. \* xij. sugo d'acazia P. \* xxvi. gomma altrettanto.

Quanto poi è maggior l' infiammazione tanto piu devesi mitigare col medicamento, con aggiugnerci o chiara d' uovo, o latte di donna. Che se alle volte non è in pronto il medicamento, ne il medico, l'una di queste due cose infusa nell' occhio con un pennellino fatto a questo effetto mitiga il male. Sgravato poi che sarà l' infermo alquanto, ed è fermata la flussione della puita, l'avanzi che forse sarebbero per esser piu piacevoli, si tolgon via col bagno, e col vino. Pertanto devesi lavar leggiermente, fregatosi prima con olio, e piu a lungo nelle gambe, e cosce, e fomentar gli occhi co l'acqua calda, (a) dappoi bagnarsi il capo prima con acqua calda, poi co la tiepida, guardarsi dopo il bagno di non esser offeso dal freddo, o dal vento, dopo queste cose prender cibo alquanto piu pieno de i giorni anteriori, schivando però tutte

(a) Se vi si aggiugne all'acqua sien greco, e meliloto è meglio,

tutte le cose che affottigliano la pituita. Beva vino piacevole, alquanto austero, un poco vecchio ne eccessivamente, ne troppo poco; accio non si generi crudezza da quella e si concilj il sonno, e si mitighino internamente gli acri. Ma se taluno nel bagno sentirà maggior perturbazione d'occhi di prima che vi entrasse, il che suol accadere a coloro, che durante per anco la flussione della pituita, hanno avuta fretta d'entrarvi, dee quanto prima escirne, non bever niente vino in quel giorno, e prender meno cibo del giorno avanti, e dappoi cessata che sarà la pituita abbastanza, di nuovo usar il bagno.

Suol però accadere talvolta o per difetto delle stagioni, o de' corpi che in molti giorni non terminano ne il dolore, ne l'infiammazione, e molto meno la flussione della pituita. Il che quando avviene, e che già col suo tempo sia mitigato il male, dalle stesse cose devesi prender il rimedio, cioè dal bagno, e dal vino. Imperocchè siccome non convengono queste cose ne' mali freschi, perchè possono inasprire, ed accrescer quelli, così ne' mali invecchiati che non anno caduto ad alcuni altri rimedj sogliono esser molto efficaci. E in questo male ancora come ne gli altri, rese che sono vane le cose giovevoli, danno ajuto le contrarie. Devesi prima però radere il  
capo

capo fin' alla cotenna, dapoi nel bagno fomentare il capo, e gli occhi con molta acqua calda, indi asciugare l' uno, e gli altri con una pezzetta, ed ungere il capo con unguento Irino, e trattenerfi in letto finchè cessi il concepito calore, e termini il sudore, che per necessità sarà radunato nel capo. Indi si venga alla stessa sorte di cibo, e di vino in modo che si beva il vino schietto, si copra il capo, e si prenda riposo. Atteso che spesso dopo tali cose un grave sonno, un sudore, un getto di ventre da fine alla flussione della pituita. Se si è alleggerito il male, ( la qual cosa spesso avviene ) faccisi lo stesso per più giorni finattantochè si giunga del tutto alla sanità. Se ne gli stessi giorni non rende di per se il ventre, si deve moverfi, acciò tanto più si sgravino le parti superiori.

Ma talvolta una infiammazione grande vien con tanta violenza, che caccia fuori dal suo luogo gli occhi. *Proptossin* *αφωλυσιν* chiamanlo i Greci perchè stanno cadenti gli occhi. A questi se le forze il comportano è necessario si cavi sangue, se questo non può farsi, movasi il ventre, e s' imponga un più lungo digiuno. Fa poi di bisogno di medicamenti molo lenitivi; perciò adoprano alcuni quel Collirio di Eleone che s'è posto avanti de i due ultimi, ma il migliore si è quello di Nileo, ne d'alcun



d'alcnu altro piu convengono fra loro tutti i medici.

9. *Collirio di Nileo miglior di tutti.*

Contiene questo nardo Indico, (a) opio ana P. \* j. gomma P. \* j. croco P. \* ij. foglie di rosa fresche P. \* iiij. le quali cose mescolansi insieme, o con acqua piovana, o con vino piacevole un poco austero. Ne è fuor di proposito cuocere scorza di melagrana, e sertula campana in vino, e dappoi pestarla, o mischiare mirra nera con foglie di rosa, o pur foglie di Jusquiamo con rosso d'uovo cotto, o farina con sugo d'acazia, o vin passo, o mulso. Alle quali cose se s'aggiungono anche foglie di papavero sono alquanto piu efficaci. Preparata qualcheduna di queste cose si fomentino gli occhi con pezzetta bagnata in acqua calda, nella quale siano cotte prima o foglie di mortella, o di rose, dappoi vi si applichino alcune delle dette composizioni. Oltre queste cose s'incida una coppetta alla collotolla.

Che se con queste operazioni l'occhio non è ritornato nel suo luogo bisogna sapere esser persa la vista, e che quell'occhio indurirà, o si convertirà in marcia. Se apparisce la suppurazione diafi il taglio all'occhio da quell'angolo che è piu vicino alla

(a) Galeno ed Egineta lo chiamano Nilo non Nileo.

alla tempia, acciò cavata la marcia finisca l' infiammazione\* e il dolore e le tuniche posino dentro, accio si renda minore la deformità della faccia. E debbono usarsi dappoi gli stessi collirj di latte, uovo, o croco, al quale si mescoli chiara d'uovo. E se è diventato duro, e così è mortificato, nè si suppara, se ne tagli tanto quanto con deformità avanza, talmente che si prenda co l' amo la tunica esteriore sotto quello, indi colla lancetta si tagli: e finalmente vi si ponghino medicamenti finche si termini ogni dolore. Degli stessi medicamenti convien servirsi in quell' occhio che prima cade in fuori, e poscia in piu parti è diviso,

10. *De' Carboncelli degli occhi, e loro cura.*

Sogliono ancora generarsi i Carboncelli dall' infiammazione allevolte negl' istessi occhi, alle volte nelle palpebre, ed in quelle or dalla parte di dentro, or di fuori. (a) In questo caso movasi il ventre, si sminuisca il cibo, diafi a bere il latte, accio si mitighino gli acri che fecero il male. In quanto appartiene ad unzioni, e medicamenti, convien servirsi di quelli che si sono proposti contro la infiammazione. (b) Ed anche a questo è squisitissimo il Collirio

(a) *Se il corpo è pletorico si deve ancora cavar sangue.* (b) *Si fuggino i cataplasmi rinfrescanti come che respinghino in dentro la materia che fluisce.*

rio di Nileo, se però i carboncello è nella parte esterna della palpebra; per l'empia-  
stro è ottimo il seme di lino cotta in mul-  
so, o se questo non si ha, farina di frumen-  
to cotta nello stesso modo.

11. *Delle Pustole degli Occhi, e loro cure.*

Nascono eziandio talvolta dall'infiamma-  
zioni le pustole. Il che se accade subito ne'  
principj più devono osservarsi quelle cose  
che ho dette di sopra intorno il sangue ed  
il riposo, se accadono più tardi talmente  
che non possa cavarli il sangue si dee non-  
dimeno mover il ventre. Se questo ancora  
vien da qual cosa impedito, si osservi al-  
meno la dieta. I medicamenti poi ancor  
qui vi bisognano lenitivi, qual'è quello di  
Nileo, o di Cleone.

12. *Collirio di Filete per le Pustole degli occhi.*

Anche quello che chiamasi di Filalete  
è buono a questo effetto: R. Mir-  
ra, opio ana P. \* j. piombo lavato, cre-  
ta Samia, che in greco *Aster* *αστηρ* chiama-  
si, dragante ana P. \* iiij. Stibio cotto,  
amilo ana P. \* vj. spodio lavato, cerussa  
lavata ana P. \* viij. Le quali cose si me-  
scolan con acqua piovana, e si usa il col-  
lirio o in novo, o in latte.

13. *Delle Ulceri degli occhi, e loro cure, e  
del Collirio Diabalantu* *διαβαλαντ, o διαβαλαντ.*

Generansi talvolta dalle pustole le ulce-  
ri, e quelle essendo fresche si debbono pa-  
rimen-

rimente nutrire con medicamenti lenitivi, e per lo piu di quelli ch' ho posti di sopra nelle pustole. Se ne compone a queste uno appropriato il quale chiamasi *Diabalanu*. Contiene rame bruciato e lavato, opio fritto ana P. \* j. spodio lavato, incenso stibio bruciato, e lavato, mirra, gomma ana P. \* ij.

14. *Curade gli occhi per qualche accidente impiccoliti.*

Segue altresì che gli occhi o tutti, o un solo impiccolischino piu dell'ordinario. E di ciò ne son la cagione sì un flusso di pituita mordace nella lippitudine, sì pianti continuati, ovvero colpi poco ben curati. In questi casi convien altresì usare gli stessi medicamenti lenitivi in latte di donna, e cibi tali che sogliono molto nutrire, ed empire il corpo, e bisogna necessariamente fuggire quella cagione, che produce le lagrime, e ogni travaglio delle cose domestiche, delle quali se qualche cosa contraria accade, convien celarla all'infermo; e parimente gli acri medicamenti, e cibi acri non per altro motivo nuocono a questi, quanto perche muovono le lagrime.

15. *De Pidocchi delle Palpebre.*

Vi è eziandio una sorta di male, nel quale fra li peli delle palpebre nascono i pidocchi; chiamano questo i Greci *Fobiriasis*. Il quale provenendo da mal abito di corpo,

corpo; di rado non passa piu oltre, ma per lo piu interposto un poco di tempo ne vien una flussione terribile di pituita, ed esulcerati malamente gli occhi, impedisce ancora la stessa vista.

A costoro devesi mover il ventre, rader il capo fino alla cute, e molto fregare ogni mattina a digiuno. Si faccino con diligenza queste cose, si camini molto, e s'usino altri esercizi, si gargarizzi col mulso, nel quale sia decotta niepitella, e fico crasso, spesso si fomenti il capo nel bagno con molta acqua calda, si fughhino cibi acri, si usi latte pingue e vino, e prendasi piu in copia la bevanda che il cibo. I medicamenti poi di dentro si debbono dar lenitivi, accio non eccitino pituita acre. Sopra i Pidocchi poi altri medicamenti che possino farli morire, ed impedire che ne naschino altri. A questo effetto R. schiuma di nitro P. \* j. sandaraca p. \* j. una raminia P. \* j. insieme si pestano e vi s'aggiugne olio vecchio e aceto in porzioni uguali finoche rassodi come miele.

16. *De' piu gravi mali degli occhi, che nascono dall' infiammazioni, e che curansi con piu gagliardi medicamenti, e del Collirio d' Andrea, e del Diaceratos diaxspatos.*

I mali degli' occhi detti fin qui si curano con medicamenti lenitivi. Sono poi altre sorte che vogliono diversa cura, e per lo piu anno origine dall' infiammazioni, ma

Celfo Volg. Tom. II. K che

che durano, ancor finite quelle. Eprimieramente in alcuni persiste la flussione di pittura sottile, a' quali per di sotto si dee mover il ventre, e scemar qualche cosa del cibo. Ne è fuor di proposito ugnere la fronte col medicamento d'Andrea. La qual contiene gomma P. \* j. cerussa, stibio ana P. \* ij. schiuma d'argento cotta, e lavata P. \* iiij. ma questa schiuma cuocesi in acqua piovana, e questi medicamenti asciutti si pestano insieme col sugo di mortella. Unta la fronte con queste cose bisogna ancora poner vi sopra un'empiaastro di farina, la qual sia impastata con acqua fresca, e alla quale sia aggiunto sugo d'acazia, o cipresso. Regularmente ancora s'incide una coppetta su la cima del capo, o si cava sangue dalle tempie. Devesi poi ugnere con quel medicamento che contiene squama di rame, opio ana P. \* ij. corno di cervo bruciato, e lavato, piombo lavato, gomma ana P. \* iiij. incenso P. \* xij. Questo collirio perche contiene del corno chiamasi *Diaceratos*.

Ogni volta che non dico qual sorta d'umore vi si debba aggiugnere, voglio che s'intenda dover esser l'acqua.

17. *Memigmenon Collirio e Evelpide.*

Vale all'istesso il collirio d'Evelpide, che chiamava *Memigmenon*. E' composto d'Opio, pepe bianco ana oncia \* j. gomma una libra, rame bruciato P. \* j. Mentre s'usano queste cose

se dopo qualche intermissione giovano il bagno, ed il vino. E devonfi veramente da tutti i lippienti fuggire i cibi, che affottigliano, ma principalmente da quelli, a' quali fluisce a lungo l'umor sottile. Che se già saranno venute a fastidio quelle cose, che rendono la pituita piu grossa, come in simil sorta di materia suol farsi, devesi ricorrere a quelle che astringendo il ventre astringono anche il corpo.

18. *Delle ulcere degli occhi, sopracrescenti, sordide, cave, invecchiate.*

Ma se le ulceri non anno avuto fine coll' infiammazione sogliono essere o sopracrescenti, o sordide, o concave, o almeno invecchiate. Fra queste le sopracrescenti squisitissimamente si riprimono col collirio, che chiamasi *memigmenon*. Le sordide si purgano o col' istesso, o con quello che si chiama *Smilion*.

19. *Collirio Smilion.*

Contiene Verderame P. \* vj. gomma P. \* vj. ammoniaco, minio sinopico ana P. \* xvj. le quali cose alcuni le dis fanno in acqua, altri accio sieno piu possenti in aceto.

20. *Collirio Finone d' Evelpide.*

Ancor quel collirio di Evelpide che nominava *Finone* è utile a questo. R. croco P. \* j. opio, gomma ana P. \* ij. rame bruciato, e lavato, mirra ana P. \* iiij. pepe bianco P. \* vj. E prima con questo si unga.

21. *Collirio Sferion d' Evelpide.*

E' buono allo stesso effetto quello dell'istesso Evelpide nominato da lui *Sferion*. R.  
Pietra ematite lavata P. \* ij. pepe grani  
vj. cadmia lavata, mirra, opio ana P. \*  
iiij. croco P. \* iiij. gomma P. \* viij. Le quali  
cose mescolansi insieme con vino generoso.

22. *Collirio liquido d' Evelpide.*

Componeva altresì al medesimo effetto  
un medicamento liquido, che era fatto di  
queste cose. Verderame, \* minio abbrucia-  
to, vetriolo, cinnamomo ana \* iiij. croco,  
nardo, opio ana P. \* j. mirra \* ij. rame  
bruciato \* iiij. \* *cenere d'odori* P. \* iiij. pe-  
pe grani xv. Si pestano queste cose in vin  
austero, e dappoi si cuocon con tre emine  
di passo finattantoche siasi fatto un corpo  
solo. E questo medicamento quanto più  
invecchia tanto è più possente.

23. *Delle ulceri concave degli occhi.*

Le ulceri poi concavi si riempiono, fra  
quelle cose, che si son poste sopra col Col-  
lirio *Sferion*, e con quello che chiamasi  
di Filalete Filete. Lo stesso *Sferion* guari-  
sce ottimamente l'ulceri invecchiate, e che  
con difficoltà si cicatrizzano.

24. *Collirio d' Ermone.*

V'è ancor un collirio, il qual essendo  
buono

\* *misì* ovvero cinapro, o pur minio sinoprico non  
minio ispano. \* non si sa cio che sia, se forse  
non deve dire.



buono a molte cose pare però che giovi  
affai in queste sorte d' ulceri . Si riferisce  
la sua invenzione ad Ermone . Contiene pepe  
lungo P. \* j. \* ji. pepe bianco \* v. cinnamomo ,  
e costo P. \* j. vetriolo, nardo, casia, casto-  
ro ana P. \* ij. galla P. \* v. mirra croco,  
incenso, licio, cerussa, ana P. \* viij. opio  
P. \* xij. aloe, rame bruciato, cadmia ana  
P. \* xvj. acazia, stibio, gomma anna P.  
\* xxv.

25. *Delle cicatrici degli occhi, che sono fatte  
dall'ulceri. E de Collirj Asclepia.*

*Canopite, e Pissino.*

Le cicatrici che son fatte dalle ulceri por-  
tano rischio di due difetti, cioè di esser con-  
cave, o rilevate. Se sono concave, le può  
riempire quello che chiamarsi *Sferion* ho det-  
to di sopra, o quello che chiamarsi *Asclepia* .  
Contiene Opio P. \* ij. Sagapeno, opopanace  
ana P. \* iij. verderame P. \* iij. gomma P.  
\* viij. pepe P. \* xij. cadmia lavata, cerus-  
sa ana P. \* xvi. Se poi sono rilevate le  
cicatrici l'estenna il collirio *Smilion*, o *Ca-  
nopite* il qual contiene cinnamomo, acazia  
ana P. \* j. cadmia lavata, croco, mirra,  
opio, gomma, ana P. \* ij. pepe bianco,  
incenso ana P. \* iij. rame bruciato P. \* ix.  
mescola con acqua piovana; ovvero il Col-  
lirio *Pissino* d' Evelpide che è composto di  
queste cose. Sal fossile P. \* iij. ammoniac  
co timiama P. \* viii. opio P. \* xij. ce-

ruffa P. \* xv. pepe bianco, croco di Cilicia  
 ana P. \* xxxij. gomma P. \* xiiij. cadmia lava-  
 ta P. \* ix. piu d'ogn'altro pare che levi via  
 la cicatrice quello che contiene gomma P. \*  
 iij. Verderame P. \* j. crocomasma \* iij.

26. *Di un'altra sorta d'inflam-  
 mazione d'occhi.*

V'è ancora un'altra sorta d'*inflammazio-  
 ne* (a) nella quale se sono gonfi, e si stirano con  
 dolore gli occhi è necessario che si cavi il  
 sangue dalla fronte, che si fomenti con mol-  
 ta acqua calda il capo, e gli occhi, convien  
 gargarizzare con lenticchia, o cremor di fi-  
 co, e ugnersi con quei medicamenti che si  
 sono posti di sopra, e principalmente con  
 quello ch'è detto *Sferion*, che contiene pie-  
 tra ematite. E sono buone anche altre co-  
 se che compongonfi per estenuare l'asprezza,  
 della quale di qui a poco dirò.

Ed a questa per lo piu segue l'*inflam-  
 mazione* degli occhi, allevolte piu grave,  
 allevolte piu leggiera. Talvolta ancor do-  
 po l'asprezza fassi la lagrimazione, indi cre-  
 sce la istessa asprezza, ed è quella in altri  
 breve, in altri lunga, che mai appena ha  
 fine.

In questa sorta d'infermità alcuni fregano  
 le palpebre crasse, e dure con una foglia di  
 fico, e co' lo specillo ruvido, ed allevolte le  
 radono co' la lancetta, e ogni mattina rivol-

tate

(a) *Si dubita che debba dire inflazione.*

tate le fregano con medicamenti. Le quali cose non devono però farsi spesso, e solo nell'asprezza grande, e invecchiata. Attesoche giugnessi meglio al fine desiderato co' la regola di vivere, e co' medicamenti proporzionati. Ci serviremo dunque dell' esercizio, di frequente bagno, e fomenteremo le palpebre degli occhi con molta acqua calda. Prenderemo poi cibi acri, e attenuanti.

### 27. *Collirio Cesariano.*

Quel medicamento che si nomina Cesariano contiene Vetriolo P. \* j. misì P. \* j. pepe bianco P. \* v. Opio, gomma ana P. \* ij. cadmia lavata P. \* iij. stibio P. \* vj. Ed è manifesto che questo collirio è buono ad ogni sorta di male d'occhi, eccetto quelli che si curano con lenitivi.

### 28. *Collirio di Serace.*

Ancor quello che chiamasi di *Serace* è buono per l'asprezza. Contiene mirra P. \* j. ammoniaco timiama P. \* ij. erugine rasa P. \* iij. mescola con acqua piovana. Allo stesso è buona anche quella che chiamasi *Canopite*, e lo *Smilion*, e il *Pissino*, e lo *Sferion*. Se non si hanno i medicamenti composti curasi l'asprezza comodamente con fiel di capra, o col miele del migliore.

### 29. *Della Xerostalmia sorta d'arida lippitudine.*

Ritrovasi altresì una sorta di lippitudine asciutta chiamata da Greci *Xerostalmia*. Non

sono ne gonfi gli occhi, ne lagrimano, ma sono puramente rossi, e con un certo dolore ordinariamente leggiero, e prurito, sono pesi, e le palpebre senza durezza alcuna; di notte si attaccano per la pituita troppo viscosa: e quanto è maggiore la flussione di questa sorta di materia, tanto è meno spedito il fine.

In questo male è necessario caminar assai, far molto esercizio, lavarsi spesso in bagno e ivi molto sudare, e usar molto le freghe. I cibi sieno tali che ne troppo riempino, ne siano troppo acri, ma di mezzana qualità. La mattina quando si conosce d'aver concotto non è fuor di ragione gargarizzarsi con senapa, e dappoi alungo stropicciare il capo, e la faccia.

### 30. Collirio detto *Rinion*.

Per Collirio poi è squisitissimo quello che chiamasi *Rinion*. Contiene mirra P. \* j. opio, sugo d'acazia, pepe, gomma ana P. \* j. pietra ematite, pietra frigia, licio, pietra scissile ana P. \* ij. rame bruciato P. \* iiij. Fa lo stesso effetto ancora il collirio *Pissino*.

### 31. Collirio per gl'occhi scabrosi.

Se sono scabrosi gli occhi, il che suol accadere principalmente negli angoli puo giovare quel *Rinion* detto di sopra. Puo parimente giovare quello che contiene erugine rafa, pepe lungo, opio ana P. \* ij. pepe bianco, gomma ana P. \* iiij. cadmia lavata, cerussa

cerussa ana P. \* vj. Nessuno però è migliore di quello d'Evelpide, che chiamava *Basilicon*. Contiene Opio, cerussa, pietra assiana P. \* ij. gomma P. \* xiiij pepe bianco P. \* iiij croco P. \* vj. pforico P. \* xiiij. Non v'è però materia veruna che di per se si chiami *pforico*, ma pigliasi alquanto di calcite, cadmia il doppio più, si pestano insieme in aceto, e questo riposto in vaso di terra, e coperto di foglie di fico si sotterra, e ricavato fuori dopo venti giorni di nuovo si pesta e chiamasi con questo nome *Pforicon*. Ma del Collirio *Basilicon* convienfi esser quello buono a tutti i mali degli occhi che non si curano con *lenitivi*.

Quando non si anno poi medicamenti composti tolgono la scabrosità degli angoli il miele, e il vino. E si rimedia a questa, e alla lippitudine asciutta, se alcuno pone sopra l'occhio pane inzuppato in vino. Stanteche essendo per ordinario qualche umore, il quale or inasprisce gl'occhi, or gli angoli, e le palpebre, in tal guisa se esce qualche umore si estrae, e se ven'è in vicinanza si reprime.

### 32. Dell'abbagliamento di occhi.

Sogliono talvolta per la lippitudine abbagliarsi gli occhi, ed alle volte anche senza questa, per la vecchiaia, o per altra infirmità. Se questo vizio nasce dalla lippitudine, giova il Collirio che chiamasi *Asclepsas*,

*psas*, giova ancor quello che fassi di fec-  
cia di croco.

### 33. *Collirio Diacrocu.* ANACARDIUM

Propriamente ancora a questo effetto com-  
ponesi quello che *Diacrocu* chiamasi. Con-  
tiene pepe P. \* j. voco cilicio, opio, ceruf-  
sa, anna P. \* ij. pforico, gomma ana P. \* iiij.

### 34. *Per l'abbagliamento che avviene per la vecchiaia, o altra debolezza.*

Se dipende questo dalla vecchiaia, o al-  
tra debolezza, si puo ugnere col miele del  
migliore, e ciprino, e olio vecchio. E' me-  
glio però mescolare balsamo parte una o-  
lio vecchio, o ciprino, parti due, miele  
del piu possente parti tre. Sono ancora uti-  
li a questo i medicamenti che quì sopra si  
sono posti per l'abbagliamento, e quelli  
che si sono esposti per impiccolire le cic-  
trice. (a)

A chiunque poi abbaglian gli occhi, fa  
di bisogno caminare, ed esercitarsi molto,  
bagnarsi spesso, e nel bagno farsi freghe  
per tutto il corpo, e in particolare nel ca-  
po, e col'olio irino ungerfi, fregghi forte-  
mente finche sudi, e si copra dapoi, ne si  
scuopra finche incasa il sudor, e il calor  
sia cessato. Dappoi usi cibi acri, e attenuan-  
ti, e frapposti alquanti giorni si gargariz-  
zi con senapa.

### 35. *Del-*

(a) L' esercizio in luogo ombroso è giovevo-  
le.

35. *Della suffusion degli occhi.*

Parimente la suffusione, che chiamano i Greci *Iprchisi*  $\nu\pi\sigma\chi\upsilon\sigma\iota\varsigma$ , allevolte si oppone alla potenza visiva degl'occhi, la quale se sarà invecchiata devesi curare colla mano. Talvolta nel principio si guarisce con certe osservazioni. Giova cavar sangue dalla fronte, o del naso, scottare le vene nelle tempie, tirar fuori la pituita col gargarizzare, far suffumigj agl'occhi con medicamenti acri, e ugnerli. Il cibo migliore si è quello che affotiglia la pituita.

36. *Della risoluzione degli occhi.*

E nemmeno la risoluzione degl'occhi, che chiamano i Greci *Paralifia* si dee curare con altra sorta di cibi, o medicamenti diversi. Basta aver esposta la sorta del male. Segue dunque questa ora in un occhio, ora in tutti e due per qualche colpo ricevuto, o per il maleduco, o per la distenzione de' nervi, dalla quale fortemente l'occhio è stato mosso dal suo luogo, in modo che ne si possa quello indrizzare in parte alcuna determinata, ne del tutto star fermo, ma si mova qua e là senza regola, e per tanto non lascia veder le cose.

37. *Della Midriasi degli occhi.*

Non è molto differente da questo male quel che i Greci nominano *Midriasi*. Vien in fuori e si slarga la pupilla, e s'indebolisce la di lei vista, e sul principio s'abba-



abbaglia. E con grandissima difficoltà si toglie simil sorta di infirmità. Nell'un' e nell'altra poi, cioè nella Paralizia e nella Midriasi debbon usarsi le cose stesse appunto che si sono comandate nell'abbagliamento degli occhi con mutar solamente poche cose: poiche nell'ugnerli il capo si aggiugne all'irrito alle volte aceto, alle volte nitro, e basta che gli occhi si empiastino col miele. Alcuni nella Midriasi si sono serviti dell'acqua calda, e son migliorati. Altri senza alcuna manifesta cagione all'improvviso sono accecati. De'quali altri non vedendo prima cosa veruna, di subito per una profusione di ventre recuperarono la vista. Dalla qual cosa par conveniente, che essendo fresco il male, e posto un poco di tempo in mezzo si tentino le deiezioni, le quali scaccino ogni materia nociva per le parti d'abbasso.

38. *Della debolezza degli occhi.*

Oltre queste infirmità vi è la debolezza degl'occhi, per la quale alcuni di giorno vedono a sufficienza, di notte non vedono niente, il che non succede ad una femmina se fluiranno le purghe mensuali. Ma chi patisce questa imperfezione convien che s'unga col sangue di fegato principalmente di becco, ( o almeno di capra ) ricevuto quando quello si cuoce arrosto, e si deve mangiar ancora l'istesso fegato. Si può eziandio



andio con giovamento servire taluno degli stessi medicamenti, che diminuiscono le cicatrici, ovvero l'asprezza; alcuni pestato seme di porcellana vi aggiungono miele, affinche non cada la goccia dalla spatola, e con quello ungono. Devono questi parimente servirsi delle stesse cose, cioè bagno, freghe, ed esercizio.

39. *Agli occhi che per lesione esterna sono sparsi di sangue.*

E queste infirmità anno origine negl'istessi corpi. Per di fuori poi allevolte se qualche percossa offende l'occhio in modo che si sparga il sangue. In questo non v'è meglio che ugnarlo col sangue di colomba, o di palombo, o di rondine. Ne cio si fa senza giusto motivo, stanteche la vista di queste offesa esteriormente fra qualche tempo risana, e piu presto dell'altri della rondine. Onde ancora si è sparsa la favola che dalle madri con una cert'erba detta chelidonia, si restituisca la vista a questi uccelli, essendoche la vista di questi offesa esteriormente dopo alquanto di tempo ritorna nel primiero stato, e principalmente alla rondine. Il sangue dunque di questi guarisce ottimamente gli occhi nostri da colpi esterni, con quest'ordine però che quello di rondine è il migliore, dappoi quel di palombo, di minor effetto è si a quelli come a noi quel di col omba.

So-

Sopra l'occhio percosso per mitigare l'infiammazione non è fuor di proposito il mettervi ancor unguenti. Però deve si pestare (a) armeniaco; o qualsivoglia altro del migliore, e li s'aggiunga olio appoco appoco finattontoche sia sodo come feccia. Dapoi si mescoli questo con farina d'orzo, la qual sia stata cotta in mulso. Ma considerati bene tutti i rimedi, che ancor da' medici sono stati esposti, puo ciascun comprendere, appena ritrovarsi alcun de' mali de gli occhi detti di sopra, il qual non possa guarirsi con semplici, e pronti medicamenti.

## C A P O VIII.

*De' mali degli occhi.*

**I** Mali detti fin qui si ritrovano nell'occhi, ne' quali molto possono i medicamenti, perciò si dee far passaggio agli orecchi, l'uso de' quali dopo gli occhi è il maggior che la natura ci abbia dato. Ma in questi vi è pericolo alquanto maggiore, stanteche i mali degli occhi a quelli solo nuocono l'infiammazioni, e i dolori dell'orecchie allevolte precipitano anche in pazzia, e alla morte. Perloche più prontamen-

(a) Sale ammoniaco, ma meglio armeniaco pietra.

te su' principj dee rimediarsi , acciò non si facci maggior il pericolo .

Subito che dunque alcuno sente il dolore deve astenersi , e contenersi . Il secondo giorno se si è fatto maggiore il male , si deve radere il capo , e ugnere quello col' unguento Irino caldo , e coprirlo . Che se sarà grande il dolore con febbre , e senza sonno , richiede , che si cavi ancora il sangue . Se questo vien da qualche cagion impedito , convien mover il ventre . Fanno ancora giovamento , mutati di quando in quando , fomenti caldi o di sien greco , o di lino , o d' altra sorta di farina cotta in mulso . Si applicano altresì con giovamento ad ogni tanto spugne bagnate in acqua calda . Dapoi alleggerito il dolore convien lasciarvi il cerotto fatto d'Irino , o ciprino . Il alcuni però giova piu quello fatto di rosa . Se la infiammazione gagliarda toglie il sonno del tutto debbon aggiugnervisi al Cataplasma scorze di papavero fritte , e pestate ; talmente che di queste si ha la metà , e poi dette cose insieme si cuocan in vin passo , o mulso . Dentro l'orecchio poi bisogna infondere qualche medicamento che sempre convien prima far tiepido , e comodissimamente s'infonde colo schizzetto . Ripieno che è l'orecchio vi si ponga sopra lana morvida , ovvero il fioco di Asturia , la quale ritenga dentro quel liquido

liquido . E queste sono cose comuni .

Il medicamento poi è sugo di rosa , e di barbe di canne , e olio nel quale sieno cotti lombrici , e umore cavato da \* noci ( mandorle ) amare , ò dalla mandorla della pesca . ( a ) I medicamenti composti poi per mitigare il dolore , e l' infiammazione per ordinario son questi . Castoreo , opio ana parti eguali si pestano , e dapoì vi si aggiugne vin passo . O pure . Opio , croco , mirra ana parti eguali , e così pestasi , che vi s'instilla a vicenda or olio rosato , e or vin passo . Overo pestaficio che sta d'amaro nella fava Egiziaca con aggiugnervi olio rosato , alle quali cose da alcuni si mescola anche un poco di mirra , over opio , opur incenso con latte di donna , over olio di noci ( mandorle ) amare con sugo di rosa ; O pure Castoreo , mirra , opio in porzioni eguali mescolati con passo . Overo croco P. \* j. mirra , alume scissile ana P. \* iij. alle quali cose nel pestarle appoco appoco si mescolano ciati tre di vin passo , e miele meno di un ciato . E questo è de' principali medicamenti . Overo opio in aceto . Si puo altresì adoperare la composizione di Temisone , la qual contiene Castoreo , poponace , opio in aceto ana P. \* ij. schiu-

\* Per noci amare s' intende mandorle amare .

( a ) Non s' usino se non in estrema necessità tali medicamenti , e una ò due sole volte .

schiuma di nitro, P. \* iiij. le quali cose pestate si mescolano con vin passo, finche siano sode come cerotto, e così si riponghino. Quando dee adoprarli di nuovo lo stesso si pesta con aggiugnervi del passo. Quello sempre dee osservarsi ogni volta che un medicamento è piu sodo di quel che deve esser per poterli infonder nell'orecchio, che bisogna aggiugnervi quel liquore, del quale deve esser quello composto, finche sia a sufficienza liquido.

2. *Della marcia, e del fetore degli orecchi.*

Che se gli orecchi contengono anche la marcia è bene che vi s'infonda licio solo, ovvero unguento irino, o sugo di porro con miele, o sugo di centaurea con passo, o sugo di melagrana intiepidito nella scorza dell'istesso, aggiuntavi una piccola porzione di mirra. Bene ancora si mescolano queste cose, mirra, che vien chiamata *Stacten* *σακτην* \* j. croco P. \* j. noci amare xxv. miele un cizato, e mezzo, le quali cose pestate, quando debbon adoperarsi s'intiepidiscono nella scorza di melagrana. Parimente que' medicamenti che si fanno per l'esculcerazione della bocca risanano anche l'ulceri degli orecchi. Le quali se sono invecchiate, ed esce molta marcia, è buona quella composizione che si attribuisce ad Erasistrato. Pepe crociana \* j. mirra, mischi cotto ana P. \* ij. rame bruciato P. \* ij. Queste cose si mescolano col  
L vino,

vino, dappoi quando sono seccate, si aggiungono emine tre di passo, e si cuocon insieme. Quando deve adoperarsi si aggiugne a dette cose miele, e vino. Ritrovafi anche il medicamento di Tolomeo Chirurgo, il qual contiene lentisco P. \* j. galla P. \* j. agresta P. \* j. sugo di melagrana. V'è quel di Menosilo molto possente, il qual è composto di queste cose. Pepe lungo P. \* j. castoreo P. \* ij. mirra, croco, opio, nardo siriacco, incenso, scorza di melagrana, la parte di dentro della fava Egiziaca, noci amare, miele del migliore ana P. \* iiij. Alle quali cose mentre si pestano aggiungasi aceto fortissimo finche si rassodino queste come passo. Vi è quel di Cratone Cinamomo, cassia ana P. \* j. licio, nardo, mirra ana \* j. aloe P. \* ij. miele ciati tre, vino un Sestario. Delle quali cose il licio si cuoce col vino, e dappoi l'altre cose si mescolano con queste. Ma se v'è gran quantità di marcia, e odore cattivo R. erugine rasa, incenso ana P. \* ij. miele ciati due, aceto ciati quattro, e si cuocon insieme: quando deve adoperarsi vi si mescola vin dolce. Ovvero si mescola alume scissile, opio, sugo d'acazia ana parti eguali, ed a queste cose s'aggiugne sugo di Jusquiamo la metà d'una delle dette porzioni, e pestate dette cose si disanno in vino. Giova altresì abbastanza il solo sugo di Jusquiamo.

3. *Composizioni a tutte le infermità degli orecchi.*

Un comune medicamento poi per tutti i mali degli orecchi, e già sperimentato lo compose Asclepiade. Contiene quello Cinnamonomo, casia ana P. \* j. fior di giunco rotondo, castoreo, pepe bianco, e pepe lungo, amomo, mirobalano ana scrop. ij. incenso maschio, nardo siriaco, \* mirra pingue (Stacte), croco, schiuma di nitro ana P. \* ij. le quali cose pestate ciascuna di per se, di nuovo si pestano insieme mescolate con aceto, e così riposte, quando debbono adoperarsi, si dis fanno di nuovo co' l'aceto. Nell'istesso modo è rimedio comune a gli orecchi infermi la sfragide di \* Polibio liquesfatta in vin dolce, la qual composizione è posta nel Libro superiore.

Che se fluisce la marcia, e v'è tumore, non è fuor di proposito, che mescolandovi vino si lavi con quello l'orecchio, per opra dello schizzetto, e dappoi v's' infonda vino austero mescolato con olio rosato, al quale sia aggiunto un poco di spodio, ovvero licio con latte, o sugo d'erba sanguinale con olio rosato, o sugo di melagrana con piccola porzione di mirra.

4. Dell'ulcere sordida degli orecchi. *Pl.*

Se sono le ulcere ancor fardide , meglio  
L. 2. fi la-

\* Pinguetudine di mirra, qual chiamasi da Diosc.  
 ftaffe. \* Deve dire Polijda e così in altri luoghi.

si lavano col mulso, e indi vi s'infonde alcuno de' soprascritti medicamenti, il qual contenga miele. Se d'avvantaggio ancor esce la marcia, deve si radere il capo, e lavare con molta acqua calda, e gargarizzarsi, e camminare finche colui si stracchi, e cibarsi poco. Se sarà venuto fuori dell'ulceri ancora sangue deve si infonder licio con latte, ovver acqua nella quale sia cotta rosa aggiuntovi sugo d'erba sanguinale, o d'acazia.

Che se è cresciuta la carne sopra le ulcere e quella getta marcia di cattivo odore deve lavarsi co' l'acqua tiepida, ed infondervi quella composizione, che fassi d'incenso, verderame, e aceto, e miele, ovvero miele cotto con verderame. Ancora la squama di rame pestata con sandaraca regolarmente s'infonde per mezzo di uno schizzetto.

#### 5. *Contro i Vermi degli Orecchi.*

Quando poi vi sono nati i vermi, se sono quelli vicini, si devon col specillo tirar fuori; se sono in lontananza conviene farli morire con medicamenti, (a) e procurar che poi non ne rinaschino; All'un e l'altro giova l'elleboro bianco pestato in aceto. Bisogna altresì lavar l'orecchio col vino, nel quale sia decotto marrubio. (b) Così li vermi morti si faranno venire nella prima par-

(a) *Tutte le cose amare & acri uccidono i vermi.*

(b) *L'istesso fa l'assenzio cotto in vino, se con tal decozione si lava l'orecchio.*



parte dell' orecchio, d' onde facilissimamente possano cavarfi.

6. *Per i fori degli orecchi chiusi.*

Se il forame dell' orecchio è chiuso, e dentro v' è sotto marcia soda, vi si deve aggiungere miele ottimo, se questo poco giova ad un ciato, e mezzo di miele s'aggiunga, e vi si cuoca dentro P. \* ij. d' erugine rasa, e di questo si adoperi; l' istesso pure fa l' Iride con miele, e parimente miele, e rosa scrop. ij. Parimente galbano P. \* ij. mirra con miele, e fiel di toro ana P. \* ij. vino quanto basta per disfar la mirra.

7. *Per la Sordità.*

Quando poi alcuno incomincia a sentir male ( il che principalmente suol accadere dopo i lunghi dolori di capo ) bisogna in primo luogo considerare lo stesso orecchio. Poiche vi si vedrà o una crosta come nasce sopra l'ulceri, o una radunanza di fucidume. Se vi è la crosta vi si dee infondere o olio caldo, o verderame con miele, o sugo di porro, o un poco di nitro con mulso. E quando la crosta già si stacca bisogna lavar l' orecchio con l' acqua tiepida, accio piu facilmente separatafi da se si possa colo specillo auricolare trar fuori. Se il fucidume è egualmente morvido si tiri fuori colo stesso specillo, se è duro vi s'infonda aceto con un pochetto di nitro, e quando farà mollificato con-

vien nella stessa maniera lavare, e purgare l'orecchio. Che se persiste la gravezza del capo, si rada quello, e si fregghi a lungo ma leggiermente, adoprandò olio Irino, o di lauro, e all'uno, o l'altro si mescoli un poco d'aceto, indi si cammini molto, e dopo la unzione leggiermente si fomenta il capo co' l'acqua calda. E si usino cibi di materia sottilissima, e mezzana, e piu si usino bevande adacquate, e di quando in quando si gargarizzi. Dentro l'orecchio poi deve infondersi castoreo con aceto, e olio di lauro, e sugo di scorza di radicetta. Ovvero sugo di cocomero selvatico aggiuntevi foglie di rose pestate. Giova eziandio assai alla sordidezza sugo d'agresta con olio rosato infuso nell'orecchio.

8. *Al Romore degli Orecchi.*

V'è un'altra sorta d'infermità, ed è quando suonano dentro gli orecchi. E questo fa che non si senta il suono che vien di fuori. Di minor pericolo è quando vien da raffreddamento. Peggior quando accade per malattie, o dopo lunghi dolori di testa. Pessimo si è quando ha origine da gran mali, e particolarmente dal mal caduco. Se proviene da raffreddamento bisogna nettare l'orecchio, e non respirare finattantoche da quello venga fuori con spuma qualche umore. Se diviene da malattia, o dolore di testa, in quanto appartiene all'esercizio, freghe, bagno, e gargarizzazione si fac-

si facciano le stesse cose dette di sopra. I cibi non si usino se non attenuanti. Dentro l'orecchio vi si getti sugo di radicetta con olio rosato, o con sugo di barba di cocomero selvatico, ovvero castoreo in aceto, e olio laurino. Pestasi ancora elleboro con aceto; poscia si mescola con miel cotto, e indi fattone collirio mettesi dentro l'orecchio. Se comincia questo male senza questi antecedenti, e perciò ne da un nuovo timore, dentro l'orecchio deve pondersi castoreo con aceto, o olio irino, o di lauro, o con questo mescolato castoreo con sugo di noci amare, o mirra, o nitro con olio rosato, e aceto: più però giova ancor in questo male il modo di vivere, e si debbon far le stesse cose, che ho dette di sopra ed ancor con maggior diligenza, e inoltre finche non termini quel romore convien astenersi dal vino.

Che se vi è insieme il romore e l'infiammazione, basta avervi gettato l'olio di lauro, o quel di noci amare, alle quali cose alcuni aggiungono, o castoreo, o mirra.

9. *Per tirar fuori ciò che è entrato nell'orecchio.*

Suol anche alle volte entrar qualche cosa dentro l'orecchio, come pietruccola, o qualche animaletto. Se vi è dentro un pulice, vi si deve cacciar dentro un poco di lana, nella quale essa entri e insieme con quella tirasi fuori, se non è uscita, e sia

altro animaletto s'involga lo specillo auricolare con lana, e s'intinga in qualche cosa viscosa, e particolarmente nella trementina, e si facci penetrar quello dentro l'orecchio, e vi si giri dentro che certamente lo prenderà, e trarrà fuori, se poi è cosa che non sia animale bisogna tirarlo fuori co' lo specillo auricolare, o co' l'amo ottuso un poco oncinato. (a) Se queste cose non sono sufficienti può nello stesso modo tirarsi fuori co' la trementina. Comodamente ancora lo caccian fuori li sternuti, oppure vi si getta dentro con impeto l'acqua co' lo schizzetto. Si pone anche al fianco una tavola in modo che stia per aria da tutte e due le teste, e vi si lega sopra quell'uomo da quella parte che è l'orecchio impedito, talmente però che l'orecchio sopravanzi alla tavola, dappoi si percuote con un martello la testa della tavola che è da' piedi, e così scuotendosi l'orecchio vien fuori ciò che v'è dentro.

## C A P O VIII.

*De' mali, e delle cure del naso.*

**I**L naso per di dentro esulcerato bisogna fomentarlo col fumo d'acqua calda, cioè bagnando in quella una sponga, ed accostan-

(a) Cioè un sifoncolo per attrar l'aria.

costandola al naso. Fassi ancora con porre sotto un naso di bocca stretta pieno d'acqua calda. Dopo questo fomento debbon ugnersi l'ulceri o con schiuma di piombo, o con cerussa o con schiuma d'argento. Ovvero quando uno pesta alcuna delle dette cose nel pestarla vi aggiunga a vicenda vino, e olio mirtino; finche sia sodo come miele. Se poi quell'ulceri sono dentro le narici, e hanno molte croste, e puzzolente odore, la qual sorta chiamano i Greci *Ozena* οζινα deve saperfi appena esser rimediabile detto male. Nondimeno però possono sperimentarsi queste cose, che si rada la testa, e continuatamente forte si fregghi, indi si bagni con molta acqua calda, cammini il paziente molto, si cibi poco, e non sia ne di cose acri, ne di gran sostanza il cibo. Dappoi nell'istesse narici si ponga miele con un poco di trementina, il che fassi parimente co' lo specillo circondato di lana, e si tira a se col fiato quel sugo finche si senta colla bocca il sapore di esso, attesoche con queste cose si staccano le croste, le quali poi debbon cacciarsi fuori per opera degli sternuti. Purificate che sono l'ulceri vi si dee poner sotto il vapore d'acqua calda. Indi vi s'adoperi o licio disfatto in vino, o morca, o agresta, o sugo di menta, o di marrubio, o vetriolo, il qual abbruciato,   
 sia

fia dappoi pestato, o la parte interna della scilla pestata, e ad una di queste cose, si aggiunga il miele, Del quale nell'altre deve esser la porzione molto piccola, col vetriolo sia tanta, che quella mistura sia liquida, co' la scilla sia la porzione maggiore. Si rinvolti con lana lo specillo, e s'intinga quello nel medicamento e con esso si riempino le ulceri. E parimente facciasi una lunga tasta di fila, e s'intinga in quel medicamento, e pongasi dentro il naso, e dalla parte di sotto leggermente si legghi, e questo nell'Inverno, e nella Primavera dee farsi due volte il giorno, nell'Estate, e nell'Autunno tre volte.

## 2. De' polipi del Naso.

Nascono altresì allevolte nelle narici alcuni pezzetti di carne simili a i capezzoli delle mammelle delle donne, e stanno attaccate alle parti di sotto, che sono cartilaginose. Queste debbon curarsi con medicamenti adurenti, co'quali del tutto si consumano. Il Polipo poi è un pezzetto di carne or bianca, or rossiccia, la quale sta attaccata all'osso del naso e allevolte pendendo fino a'labri riempie il naso, allevolte per di dietro per il foro, dal qual passa il fiato dal naso alle fauci, cresce talmente che può vederfi dietro l'ugola, e soffoga l'uomo principalmente soffando i venti Aulro, ed Euro, e per ordinario è mortale,

vida, di rado soda, e quanto più impedisce il fiato, e allarga il naso, e ordinariamente e *Carcinode*; *καρκινώδης* perciò non deve toccarsi. Quell' altra sorta poi ordinariamente curasi col ferro, alle volte però si rifecca se vi sarà messa con tasta, o penisillo quella composizione, che contiene minio sinopico, calciti, calcina, sandaraca ana P. \* j. vetriolo P. \* ij.

## C A P O I X.

*Del dolore de' denti.*

**N**El dolor poi de' denti che ancor esso può riponerfi nel numero de' tormenti grandi, devesi in tutto levar il vino, e sul principio astenersi ancora dal cibo, e successivamente prenderne poco, e tenue, acciò non irriti li denti nel masticare, di fuori poi per mezzo d' una sponga vi si accosti il vapor dell' acqua calda, e convien ponervi sopra il cerotto fatto di ciprino, o irino, e si fasci questo con lana, e si copra il capo. Che s' è anche più gagliardo il dolore con giovamento si move il ventre, e si pongono sopra la mascella caldi Cataplasmi; e si tiene in bocca liquor caldo con alcuni medicamenti e spesso si muta; (a) per il qual effetto si cuoce  
la

(a) *L'istessa masticata giornalmente conserva i denti.*

la radice del cinque foglie in vino, e la radice di Jusquiamo cuocesi, o in aceto adacquato, o in vino talmente che si aggiunga a queste cose un poco di sale, e scorze secche di papavero, e radice di mandragora nell'istessa maniera. Ma in queste tre cose si dee osservare di non inghiottire ciò che s'è preso in bocca. Si può anche cuocere per questo effetto la scorza della radice del pipoppo bianco nel vino, e limatura di corno di cervo nell'aceto, e niepitella con teda grassa, e con fico parimente grasso cotto in mulso, o in aceto e miele, nelle quali cose ben cotto che si è il fico si cola quel liquore. Si pone altresì lo specillo circondato di lananell'olio caldo, e con quello si fomenta il dente. Anziche si pongono sullo stesso dente alcuni quasi fomenti, o cataplasmi. Per il qual effetto si pesta la parte di dentro della scorza di melagrana agra, e seccata con porzioni eguali di galla, e scorza di pino, e si mescola con dette cose minio, e pestate s'infondono nell'acqua piovana, e si cuocono. Oppure panace, opio, peucedano, vua taminia senza seme, si pestano in porzioni uguali. Ovvero galbano parti tre, opio una quarta parte. Tuttocio che si è posto sopra i denti benche sia su la mascella quel cerotto, che ho posto di sopra, deve esser coperto con lana. Alcuni empiastrano sopra una pezzetta le cose infrascritte pestate mirra, cardamo-



damomo ana P. \* j. croco , piretro , fichi , pepe ana P. \* iiij. senape P. \* viij. e lo pongono da quel lato che è il dente che duole , s' è quel di sopra , verso le spalle , se di sotto , verso il petto . E questo diminuisce il dolore , e quando lo ha levato , subito si dee tor via .

Se poi il dente è corrosivo non convien affrettarsi a cavarlo , se la necessità non ci sforza , ma con tutti i fomenti detti di sopra si aggiunghino anche alcune composizioni più gagliarde che alleggeriscono il dolore , qual ordinariamente è quello che contiene . Opio P. \* j. pepe P. \* ij. pfori P. \* x. le quali cose pestate si mescolano col Galbano , e questo vi si fascia sopra , ovvero quel di menemaco principalmente per i denti mascellari , che contiene croco P. \* j. cardamomo , fuligine d'incenso , fichi , pepe piretro ana P. \* iiij. senape P. \* viij. altri poi mescolano piretro , pepe , elaterio ana P. \* j. alume scissile , opio , vua taminia , sulfo crudo , bitume , coccole d'alloro , senape ana P. \* ij. Che se il dolore costringe a cavarlo , il seme del pepe mondo dalla scorza , e la coccola d'edera nell' stesso modo posta in quel forame spezza il dente , e quello verrà fuori in pezzi . Pigliasi anche l'aculeo del pesce che i latini chiamano *Pastinaca* , i Greci *Trigone* , e si abbrucia , dipoi si pesta , e mescolasi con trementina , la qual posta intorno

torno al dente rompe quello. E l' alume sciffile posto in quel foro tira fuora il dente. Ma però è meglio, che quello rinvolto in lana vi si metta dentro, perchè così conservato il dente toglie il dolore. Queste cose si sono intese da' medici, ma si è conosciuto per esperienza de' contadini, che quando duole un dente si deve svelgere co' le sue radici l'erba mentastro, e ponerli dentro un catino, e gettarvisi sopra acqua, e ponervi accanto a sedere il paziente tutto da ogni banda ricoperto di panni, poscia gettarvi dentro pietre infocate in modo che venghino coperte dall' acqua, e quell'uomo riceva a bocca aperta quel fumo, rinchiuso da ogni parte come s'è detto di sopra. Essendochè esce molto sudore, e dalla bocca fluisce continua pituita, e questo libera da simil dolore allevolte per un anno, allevolte ancora per più.

## C A P O X.

*De' Gottaccioli.*

**S**E i Gottaccioli senz' esulcerazione con infiammazione sono gonfi si deve coprire di fuori 'l capo, quel luogo si fomenti con vapori caldi, si cammini molto, tengasi alto il capo nel letto, e si gargarizzi con reprimenti. Fà lo stesso la regolizia pesta.

pestata, e cotta in vin passo, o mulso. E non è fuor di proposito d'ugnerli con certi lenitivi, che si fanno cost. Si esprime il sugo della melagrana dolce, e un Sestario di quello si cuoce a fuoco lento finche rassodi come miele, indi pestansi da per loro croco, mirra, alume scissile ana P. \* ij. e appoco appoco s'aggiugne ad essi due ciati di vin piacevole, e un di miele, dappoi si mescolano queste cose col primo sugo, e di nuovo lentamente si cuoccon insieme. Ovvero cuocesi nell' istesso modo un Sestario dello stesso sugo e s'aggiungono pestate nell'istessa guisa queste cose. Nardo P. \* v. onfacio \* j. cinamomo, mirra, casia ana P. \* j. E queste stesse cose sono buone alla marcia delle orecchie, e del naso. Ancor in questo male il vitto deve esser piacevole che non inasprisca. Che se è talmente grande la infiammazione che impedisca il respiro, si stia in letto, non si prenda cibo, ne si suma cosa veruna, eccetto acqua calda. Movasi anche il ventre, si gargarizzi con fico, e mulso, si unghino con miele, e agresta. Per di dentro vi si usi ma alquanto a lungo il vapor d' acqua calda, finche que'tumoretti si suppurino, e di per se si rompino, se essendovi dentro la marcia non scoppiano questi tumoretti, bisogna tagliar quelli, dipoi gargarizzarsi con mulso caldo, e fico. Ma se è picciolo il

tumo-

tumore, e l'esculterazione, s'aggiunga un poco di fico al cremor di semola per gargarizzare, e si ungano l'ulceri con questo medicamento. Si cuocino tre emine di vin passo dolcissimo finche si riduca ad una, poi aggiungasi incenso P. \* j. croco, mirra ana P. \* j. e lentamente di nuovo ogni cosa insieme si fa bollire. Purificate che sono le ulceri convien gargarizzarsi co'lo stesso cremore di semola, o di latte. E anco qui parimente convien il vitto piacevole, a cui puo aggiugnersi vin dolce.

## C A P O X I.

*Delle Ulceri della bocca, e loro cure, e quali siano l'Antere.*

**L**E ulceri poi della bocca se sono con infiammazione e poco pure, e rosse, si curano ottimamente con que' medicamenti, che posti di sopra componansi di melagranne, e spesso si tenga in bocca il cremor reprimente, al quale sia aggiunto un poco di miele. S'usino gli esercizi, e i cibi non agri, ma quando cominceranno ad esser pure le ulceri tengasi in bocca qualche umor dolce, allevolte ancor acqua della migliore. E giova bere vin puro, e vitto piu pieno, purché sia senza cose agri. E convien spruzzar sopra le ulceri alume scissile,

sciffile , al quale sia aggiunto il doppio di galla acerba . Se già anno le croste , come sogliono aver quando sono scottate , vi si debbono adoperare queste composizioni , le quali chiamano i Greci *Antere ardupa* . Giunco quadrato , mirra ana \* ij. Iride alume sciffile sandaracca \* ij. foglie di rosa \* iiij. Ove-ro Croco , mirra ana \* ij. iride , alume sciffile , sandaracca ana \* iiij. giunco quadrato \* viij. Alcuni poi mescolan croco \* j. alume sciffile , mirra ana \* j. sandaracca \* ij. giunco quadrato \* iiij. le prime s'aspergono secche , questa s'empiastra con miele non solo sull'ulceri , ma ancora su gottaccioli . Sono però molto pericolose quell'ulceri , quali chiamano i Greci *Aftas* , ma ne' ragazzi poiché spesso l'ammazzano , ne' gli uomini , e donne non v'è lo stesso pericolo . Queste ulceri incominciano dalle gengive , dipoi occupano il palato , e tutta la bocca , indi scendono all'ugola , e fauci , quali occupate non è facile , che risani il fanciullo , e più miserabile anche si è se il patto è ancor di latte , perche non gli si può comandare rimedio veruno , ma si costringa la nutrice in primo luogo ad esercitarsi col camminare , e in quei lavori , ne' quali si movono le parti di sopra , si metta nel bagno , e si faccia lavar co' l'acqua calda le mammelle , dappoi si nutrisca con cibi non agri , e altri che difficilmente

si corrompono. In bevanda se il fanciullo ha febbre si dia acqua, e se è senza febbre vino adacquato. E se non è ubbidiente alla nutrice il ventre le si mova. Se la di lei pituita si raduna nella bocca deve vomitare, indi le stesse ulceri si unghino col miele, al quale sia aggiunto ros siriacco, ovvero noci amare, oppur mescolando fra loro foglie di rose secche, pinocchi, una pianta di mentastro, e miele. Ovvero quel medicamento che fassi di more, il sugo delle quali si cuoce nella stessa guisa come quel della melagrana fin alla sodezza del miele e nello stesso modo le si mescola croco, mirra, alume, vino, e miele, ne deve darli cosa che possa tirar fuori l'umido. Se poi il fanciullo è più adulto deve gargarizzare per ordinario con le cose dette di sopra. Ma se poco giovano a quello i medicamenti lenitivi, si debbono adoperare quelle cose, che fanno la crosta su le ulceri, qual sarebbe l'alume scissile, il calciti, o il vetriolo. Giova altresì la fame, e astinenza quanta mai sia possibile. Il cibo deve esser piacevole: darsi però alle volte per purgare le ulceri cacio con miele.

*Delle ulcere della lingua.*

**P** Arimente le ulcere della lingua non richiedono altri medicamenti che quei che si sono posti nella prima parte del capo superiore. Ben è vero che quelle, che vengono ne' lati di quella durano lunghissimo tempo. E si dee osservare se dirimpetto vi sia qualche dente più acuto degli altri, il quale spesso non lascia risanare l'ulcere in quella parte, per tanto fa duopo timarlo.

## C A P O XIII.

*Delle Parodontidi tumoretti delle Gengive e altre ulcere delle medesime.*

**S**ogliono ancora talvolta nascere accanto a' denti nelle gengive alcuni tumoretti con dolore, i quali chiamano i Greci *παρυσίς* *paculidi Parodontidi*. Queste bisogna sul principio leggiermente fregarle con il sal pestato, ovvero con una mistura di sal forfile bruciato, cipresso, e niepitella, indi lavar la bocca col cremor di lenticchia, e intanto star co la bocca aperta finche n'esca pituita abbastanza. Nell'inflammazione poi maggiore convien servirsi degl'istessi medicamenti, che si sono detti di sopra per l'ulcere della boc-

ca, e alquanto di pasta morvida si ricopra con alcuna di quelle composizioni, che ho dette chiamarsi *Anthere*, e si ponga fra'l dente, e la gengiva; che se l'infiammazione sarà piu dura, e impedirà questo, vi s'applichi per di fuori il vapor caldo di una sponga, e vi si ponga sopra il cerotto. Se si scoprirà la suppurazione, piu a lungo convien servirsi di quel vapore, e tener in bocca mulo caldo, nel quale sia cotto fico, e parimente convien tagliar quel tumoretto, acciocche stando divantaggio ivi quella marcia non offenda la bocca; che se il tumore è piu grande, tutto meglio si taglia in modo che da amendue le parti si liberi il dente. Cavata la marcia se è piccola la piaga, basta tener in bocca acqua calda, e di fuori fomentarla co lo stesso vapore, se è piu grande col cremor di lenticchia, e servirsi degli stessi medicamenti, co' quali si curano le altre ulceri della bocca. Altre sorte di ulceri ancora nascono nelle gengive, le quali si sanano con gli altri medicamenti della bocca. Bisogna però masticare il ligustro, e tener in bocca il sugo di quello. Segue eziandio alle volte, che dall'ulcere delle gengive, o sia quella parodontide, o no, n' esce a lungo la marcia. Il che suole accadere à per esser guasto il dente, o rotto, o dall'osso in altro modo viziato, e principalmente per una fistola. Quando cio accade convien aprir quella



### CAPO DECIMO TERZO. 181

quella parte, e cavar il dente, se qualche scaglia dell'osso n'è uscita fuori, si seghi, se v'è qualche cosa di guasto si rada, dopo le quali cose ciocche debba farsi si è detto di sopra nella cura dell'altre ulceri. Se poi le gengive si allontanano da i denti giovano gli stessi medicamenti detti Antere. E' parimente giovevole masticare pere, e mele non troppo mature, e tenere in bocca quel sugo. Può parimente far lo stesso effetto l'aceto non troppo forte tenuto in bocca.

### C A P O XIV.

*Del mal dell' Ugola, e sua cura.*

**P**UO recare anche spavento una gagliarda infiammazione dell'ugola. Perciò in questa, ed è necessaria l'astinenza, e si può cavar sangue, e se ciò viene da qualche cosa impedito moverli con giovamento il ventre, e di più si tenga coperto, e alto il capo, dappoi si gargarizzi con acqua, nella quale sia cotta lenticchia, e ovo insieme. Ungasi poi la stessa ugola con agresta, o galla, o alume scissile talmente che si aggiunga ad alcune delle dette cose il miele. Ritrovassi ancora un medicamento buono a questo, che nominasi Andronio. E' composto di queste cose: alume scissile, squama di rame rosso, vetriolo, galla, mirra, misi, le quali

cofe pestate prima separatamente e dappoi mescolate insieme si pestano , aggiugnendovi appoco appoco vino austero , finattantoche venga alla sodezza del miele . Ancor il sugo di Chelidonia posto con un cucchiaro sopra l'ugola molto giova . Unta che si è l'ugola con alcuna delle sopradette cose , per ordinario fluisce copiosa pituita , e cessata che farà quella , bisogna gargarizare col vin caldo . Che se non è così grande l'infiammazione basta pestare il laser , e gettarvi sopra acqua fresca , e quell'acqua presa col cucchiaro ponerla sotto all'ugola : e ancora mediocrementemente ripercuote l'enfiagione di essa l'acqua fresca postavi sotto nello stesso modo . Convienet altresì gargarizzare co la medesima acqua , o col laser , o senza . Il modo poi di curare la procidenza dell'ugola co la mano piu sotto si è detto .

## C A P O XV.

*Del cancro della bocca .*

**S**E poi alcuna volta le ulceri della bocca sono incancherite , in primo luogo bisogna considerare se vi sia cattivo abito di corpo , e a quello bisogna rimediare , indi convien curare le stesse ulceri . Che se questo male ritrovassi nella sommità , giova abbastanza l'Antera spruzzata asciutta su l'ulcere

re umido, che se l'ulcere è cattivo si em-  
piastra con un poco di miele, se è un po-  
co profundato si prenda carta bruciata par-  
ti due, orpimento la terza parte. Se del  
tutto è profundato, carta bruciata parti  
tre, orpimento parte una. Ovvero parti eguali  
di sale adusto, e iride fritta. Opure porzioni  
uguali di calciti, calcina, orpimento. Ma  
è necessario intingere in olio rosato una  
pezzetta di lino, e ponerla sopra i medica-  
menti adustivi acciò non diano nocumento  
alla parte vicina, e sana. Alcuni pongono  
anche in un' emina d' aceto forte sal bru-  
ciato, finche sia disfatto, dappoi cuocono  
quell' aceto finche si riscalchi, e spruzzano  
quel sale pestato sopra la piaga. Ogni vol-  
ta però che vi si pone il medicamento, co-  
si prima che dopo convien sciacquarsi la  
bocca, o col cremore di lenticchia, o con  
acqua, nella quale sia stato cotto moco, o  
foglie d'olivo, o verbenaca, e ad alcuna  
di queste si mescoli miele. Giova ezian-  
dio assai a queste ulcere l' aceto scillitico  
tenuto in bocca, e l' aceto mischiato di  
nuovo col sale cotto in aceto come s'è  
detto di sopra. Ed è necessario tener lun-  
go tempo in bocca una di queste due co-  
se, e far ciò due o tre volte al giorno  
secondo che sarà gagliardo il male; che se  
sarà un ragazzo a cui sarà venuto questo  
male, bisogna intinger lo specillo ricoperto

di lana nel medicamento, e tenerlo sopra l'ulcere, acciò imprudentemente non inghiottisca i medicamenti adurenti. E se il dolore è nelle gengive e alcuni denti si movono bisogna svelgergli, perche impediscono grandemente la cura. Se niente gioveranno i medicamenti diafi'l fuoco all'ulceri. Il che non è però necessario nelle labbra, perche si rende piu comodo il tagliarle. E questo in vero ugualmente scottato, e tagliato non può riempirsi senza quella cura, che fassi al corpo colla mano: l'ossa poi delle gengive, che sono deboli scottandole si rendono nude per sempre, poichè non vi cresce piu la carne sopra; se poi sono state scottate, vi si dee poner sopra lenticchia, finche recuperino quella sanità ch'è possibile.

## C A P O XVI.

*Delle Parotidi che nascano sotto gli orecchi.*

**Q**uesti sono que' mali che sono nel capo per ordinario. Sotto gli orecchi poi sogliono venire le Parotidi, talor in sanità facendosi ivi l'infiammazione, talor dopo lunghe febbri, rivoltandosi a quella parte l'impeto del male. Questa è una sorta d'ascesso, per tanto non ricerca alcuna cura particolare: Solamente v'è necessaria-

## CAPO DECIMO SESTO. 185

cessaria questa considerazione che s'è venuto il tumor senza infirmità si devon prima sperimentare i reprimenti, e se siano fatti dopo la malattia, questo è contrario, ed è meglio, che si maturino, e si aprino quanto prima.

## C A P O XVII.

*Della cura dell'Ombelico, che avanza fuori.*

**A**lla prominenza poi dell'Ombelico pur per non dover venire al ferro, e all'operazione della mano, prima si deve provare, che s'astenghino tali infermi dal cibo, si mova loro il ventre, e si applichi sopra l'ombelico il medicamento, che è composto delle seguenti cose. Cicuta, e fuligine d'incenso ana \* j. cerussa lavata \* iij. piombo lavato \* viij. vovi due, a'quali si aggiunga anche sugo di Solano. Questo vi deve esser posto sopra molto adacquato, e intanto, stia l'uomo a riposo, prenda poco cibo talmente che fugga tutte le cose che gonfiano.

## C A P O XVIII.

*De mali, e cure delle parti Vergognose.*

**N**E seguono i mali che appartengono alle parti vergognose, i nomi delle quali

quali appresso i Greci sono piu tollerabili, e ammessi gia dall'uso, essendo sparsi per i volumi di quasi tutti li medici, e ne discorsi d'ogn'uno. Appresso di noi le parole piu sporche non ci sono permesse, neppur da veruna consuetudine di persona che parli modestamente di modo che si rende difficile lo spiegare queste cose a chi vuol mantener la modestia, ed i precetti dell'arte. Tal cosa però non mi ha dovuto ritirare dallo scrivere in primo luogo per esporre tutte le cose, che ho intese esser giovevoli, secondariamente perche dovevasi dal volgo avere la cognizione della cura di quelle parti, che ciascuno fa all'altro palese contro ogni sua voglia.

2. *De' mali, e delle cure del membro Virile.*

Se dunque per l'infiammazione s'è tumefatto il membro, e la sommità della pelle non può mandarsi in su e in giù, si fomenti la parte con molta acqua calda. Quando poi è ricoperta la ghianda deveasi ancora schizzare l'acqua calda co' lo schizzetto fra quella, e la pelie. Se questa così mollificata, ed estenuata vien dietro alla mano, il resto della cura è facile. Se persiste il tumore vi si ponga sopra o lenticchia, o marrubio, o foglie d'olivo cotte in vino, e aggiungasi ad alcuna di quelle cose, nel pestarle, un poco di miele, e bisogna legare il membro dalla parte di sopra

sopra accosto al ventre, il che è necessario, che si faccia in ogni cura di esso. E devesi quella persona contenere, ed astenersi dal mangiare, e cavarli solamente la sete co l'acqua, il giorno dopo di nuovo dee usarsi per la stessa ragione il fomento co l'acqua calda, ed ancor con violenza provisi, se la pelle venga, e se quella non sarà ubbidiente doverà leggiermente inciderli nella sommità co la lancetta, stanteche quando sarà uscita la marcia si sminuirà la parte, e con piu facilità si moverà la pelle. Ma o in questa maniera farà guarita l'infiammazione, oppure se persisterà si ritroveranno le ulcere o nella ghianda, o nella pelle che le sopravanza, o fuori di quella nel membro stesso; Le quali necessariamente o faranno pure, e secche, ovver umide, e marciose; se sono secche primieramente si devono fomentare con acqua calda, indi convien ponervi sopra licio in vino, o morca cotta co lo stesso, ovvero butirro con rosa. Se faranno umide debbon lavarli col vino, poi vi si aggiunga butirro, olio rosato, un poco di miele, e la quarta parte di trementina, e questo si adopri. Che se esce da quelle marcia, prima d'ogni cosa devono lavarli col mulso caldo, indi applicarvisi pepe \* j. mirra \* ij. croco, misi cotto ana \* ij. le quali cose si cuocono in vino austero finattantoche vengano alla consistenza del miele. E la

mede.

medesima composizione si adatta a Gottac-  
cioli, all'umidità dell'ugola, all'ulceri del-  
la bocca, e del naso. Altro medicamento  
allo stesso male pepe \* j. mirra \* j. croco  
\* ij. mifi cotto \* j. rame abbruciato \* ij. le  
quali cose prima si pestano in vino austero  
dappoi seccate che siano di nuovo si pestano  
in tre ciati di vin passo, e vi si cuocono  
finche rassodino come visco. Cura eziandio  
il verderame con miel cotto, e quelle cose  
che si sono portate di sopra per l'ulceri  
della bocca. Ovvero si puo metter sopra le  
parti vergognose che anno marcia la com-  
posizione d'Erasistrato, o di Cratone. Si cuo-  
cono ancora foglie d'Olivo in nove ciati di  
vino, ed a queste s'aggiugne alume scissile  
\* iiii. olio \* viii. miele un ciato, e mez-  
zo. Ma s'è piu copiosa la marcia, questo  
medicamento disfalli in miele, se in minor  
copia si discioglie in vino. Quello sempre  
si offervi dopo la cura, se persiste l'infiam-  
mazione, di ponervi sopra il cataplasma  
descritto di sopra, e ogni giorno custodi-  
re le ulceri nello stesso modo. Che se la  
marcia averà cominciato a fluire in quan-  
tità, e con cattivo odore dee lavarsi col  
cremor di lenticchia in modo che si aggiun-  
ga a quella un poco di miele, oppure bi-  
fogna cuocere foglie d'olivo, o lentisco,  
o marrubio, e di quel liquore servirsene con  
miele nello stesso modo, e porvi sopra le  
me-



medesime cose, o ancor agresta con miele, o quel medicamento, che componesi per l'orecchie di verderame, e miele, o la composizione d'Androne, over un Antera, talmente che le si aggiunga un poco di miele. Alcuni curano tutte queste ulcere, che ho dette col licio in vino. Se poi l'ulcere serpeggia piu in larghezza, e profondità, deve lavarsi nella stessa maniera, e ponervisi sopra o verderame, o agresta con miele, o la composizione d'Androne, oppure marrubio, mirra, croco, alume scissile cotto, foglie di rosa secche, galla ana \* j. minio sinopico \* ij. Le quali cose ad una ad una prima si pestano, poi mescolate insieme di nuovo aggiuntovi miele, finche venga alla sodezza del cerotto liquido, si cuocono in vaso di rame leggermente acciò non trabocchino. Quando gia le gocce si rassodano, si leva il vaso dal fuoco, e questo medicamento dappoi secondo il bisogno liquefassi o in miele, o in vino. Questo stesso ancora da se è buono alle fistole. Suole talvolta ancor scender l'ulcera fino a' nervi, e esce molta pittura, marcia sottile, e di cattivo odore, non viscosa, ma simile alla lavatura della carne, e sono in quella parte dolori, e punture. Questa specie benchè sia fra le marciose nondimeno si deve curare con medicamenti lenitivi, qual'è l'empiaastro

Te.

Tetrafarmaco liquefatto in olio rosato, e vi si aggiunga un poco d'incenso, ovver quello che si compone di butirro, rosa, trementina, e miele posto da me di sopra. E bisogna principalmente fomentar quell'ulcera con molta acqua calda, e tenerla coperta, ne s'esponga al freddo. Allevolate poi per le stesse ulceri sotto la pelle è corrosa il membro in guisa che la ghianda si stacca, nel qual caso la pelle stessa deve si circoncidera. Ed è legge perpetua che ogni volta che si stacca, o si taglia la ghianda, o qualche altra parte del membro non si deve lasciar quella intatta, ma deve tagliarsi, acciò non cada giù, e si attacchi all'ulcere, e non possa poi ritirarsi in su, e forse chiuda altresì il canal dell'orina. Nascono ancora intorno la ghianda quei tumoretti, che i Greci chiamano Fimi, i quali si abbruciano o col medicamento, o col ferro, e quando sono staccate le croste, vi si getta sopra squama di ranie acciò più non vi ricresca.

### 3. *Della cura del Cancro che nasce*

*sul membro.*

Questi mali sono senza cancro, il quale si nell'altre parti come in queste per lo più suol molestar l'ulcere. Da principio dalla nerezza, la qual se ritrovasi sopra la pelle di subito vi si dee metter sotto lo specillo, ed inciderla, dappoi si stringhino

con

CAPO DECIMO OTTAVO. 191

con le mollette gli orli di essa, e si tagli  
tuttociò che v'è di guasto talmente che si  
levi ancor un poco del sano, e vi si dia  
il fuoco. Ogni volta che s'è dato il fuo-  
co a qualche parte, ne segue che vi si  
debba poner sopra lenticchia, e dopo ca-  
dute le croste si curin l'ulceri come le al-  
tre. Ma se il cancro è nella sostanza dell'  
istesso membro vi si getti sopra qualche  
adurente, ed in particolare quello che fassi  
di calcina, calciti, orpimento. Se restano  
superati i medicamenti piu ancora si dee  
tagliar co la lancetta tutto ciò, che v'è di  
putrefatto in modo, che si tagli altresì qual-  
che poco del sano. Devesi anche in ogni  
tempo osservare, che tagliato il cancro si  
dia il fuoco alla ferita. Ma se si faranno  
indurite le croste, o per opra de' medica-  
menti, o per mezzo del fuoco, v'è gran  
pericolo, che cadendo queste dal membro  
ne segua la profusione del sangue. Dunque  
abbisogna lungo riposo, e convien star qua-  
si immobile del corpo finattantoche leggi-  
ermente si stacchino le croste pure. Ma se  
alcuno o apposta, over a caso nel cammi-  
nar avanti tempo averà staccate le croste,  
ed uscirà il sangue, devesi usar l'acqua fre-  
sca. Se questo poco giova si dee ricorre-  
re a' medicamenti che stagnano il sangue.  
Se nemmen questi giovano gli si deve con  
diligenza, e timore dar il fuoco, e per l'  
avve-

avvenire con non moverfi tolgaſi ogni occaſione a ſimil pericolo.

4. *Della cura della Fagedena, che naſce nel membro.*

Suol anche naſcere in detta parte, quella ſorta di cancro, che chiamafi da Greci *Fagedena*, nel quale non deveſi poner dilazione di tempo, ma prontamente ſi dee rimediare co' gli ſteſſi medicamenti, e ſe poco giovano le ſi dee dar il fuoco. V'è ancora una certa nerezza, la qual non ſi ſente, e ſerpeggia, e ſe ſi laſcia ſtare arriva fino alla veſcica, ne da poi vi ſi puo rimediare. Se ritrovafi nella ſommità della ghianda intorno il canal dell'orina, prima biſogna metter dentro di quello una tenta ſottile, accio non ſi ferri, indi le ſi dia il fuoco, ſe poi s'è profundato, tutto ciò che è infetto dee tagliarſi, del reſto ſi faccino le ſteſſe coſe degli altri cancheri.

5. *Del Carboncello, che naſce nel membro virile.*

Naſcè eziandio allevolte nel membro un callo, qual è quaſi ſenza ſentimento alcuno, e queſto pure dee tagliarſi. Subito che ſi vede eſſer nato in quella parte il carboncello, deveſi prima ſchizzettare, dipoi anch'eſſo abbruciare con medicamenti, e principalmente con calcite con miele, o verderame con miel cotto, o ſterco di pecora abbruciato peſtato co lo ſteſſo miele  
quan-

quando quello è staccato bisogna servirsi di  
medicamenti liquidi, quali si fanno per gli  
orli delle ulceri.

6. *De Mali de testicoli, e loro cura.*

Ne' testicoli poi, se s'è fatta qualche in-  
fiammazione senza percossa, convien cavar  
sangue dal piede, astenersi dal cibo, ed ap-  
plicarvi cataplasmi di farina di fave cotta in  
mulso, con cumino pesto, e impastato in  
miele, overò cumino pesto con cerotto fatto  
di rosa. O seme di lino adusto pestato, e  
cotto in mulso, o farina di grano cotta in  
mulso con cipresso, o radice di giglio pesta-  
ta. Che se quei sono induriti vi si deve po-  
ner sopra seme di lino, o di fien greco cotto  
in mulso, o cerotto ciprino, over fior di  
farina mescolata con vino, alla quale sia ag-  
giunto un poco di croco. Se la durezza è  
già invecchiata molto giova la radice di co-  
comero selvatico cotta in mulso, e poi pe-  
stata. Se il tumore dipende da percossa è  
necessario che si cavi sangue, e tanto piu se  
v'è ancor il livido, e vi si deve applicare  
uno de' due medicamenti che si compongono  
col cumino, e sono posti di sopra. O quella  
composizione, che contiene nitro cotto \* j.  
ragia dipino, cumino ana \* ij. uva taminia  
senza semi \* iiij. miele quanto basta ad unir-  
si dette cose. Che se per un colpo ne rima-  
se qualcosa dentro al testicolo per ordinario vi  
si raccoglie ancora la marcia, ne v'è altro

rimedio che se col tagliare lo scroto farà cavata la marcia, e lo stesso testicolo levato via.

7. *De' mali dell' Ano, e prima de' Pagadij.*

L'Ano altresì patisce molti mali, e quei pieni di fastidio, e ha parimente cure molto abominevoli. E primieramente in quello spessissimo, ed in più parti si rompe la pelle, i Greci lo chiamano *Ragadia payédia*. Se questo è mal fresco, dove quella persona star a riposo, e sedere nell'acqua calda. Convienet altresì cuocere uova di colombi, e quando sono rassodate mondarle, indi uno se ne tenga nell'acqua ben calda, e co l'altro ben caldo si fomenti la parte, in modo che a vicenda s'adopri l'uno, e l'altro. Dappoi si disfacci il tetrafarmaco, o il ripodes con olio rosato, ovvero l'elipo fresco si mescoli con cerotto liquido fatto di rosa, ovvero s'aggiunga piombo lavato allo stesso cerotto liquido, ovvero con trementina si mescoli mirra, o olio vecchio con schiuma d'argento, e con uno di questi medicamenti si unga la parte; se l'offesa si è esterna, non nascosta vi si ponga sopra una pezzetta empiastrata co' lo stesso medicamento, e quello che vi s'è prima posto deve si coprire col cerotto. In questo caso poi non convien servirsi ne di cibi agri, ne d'aspri, ne che fermino il ventre, neppur è buona cosa alcuna asciutta, se non in poca quantità. Sono migliori le cose liquide, piacevoli, grasse,

e glutinose. Che s'usi vino non agro non vien proibito.

8. *De Condilomi, o Cresce.*

Il Condiloma poi è un tumoretto, il qual suol nascere da una certa infiammazione quando questo è nato in quanto appartiene: al riposo, al mangiare, e al bere si debbono osservare le cose dette di sopra, e si puo ancora fomentar quel tumoretto co' le stesse uova, ma deve prima quell'uomo star a sedere nell'acqua, nella quale siano cotte verbenache reprimenti. Dappoi vi si mette sopra lenticchia con una picciola porzione di miele, e fertula campana cotta in vino, e foglie di rovo pestate con cerotto fatto di rosa, e collo stesso cerotto, o melacotogna pesta, o la parte interna cioe della scorza della melagrana cotta in vino, e calcite adusta, e pesta, e dappoi mescolata con Esipo, e olio rosato. E con quella composizione che contiene Incenso \* j. alume scissile \* ij. cerussa \* iij. schiuma d'argento \*. v. Alle quali cose mentre si pestano a vicenda si aggiugne olio rosato, e vino. Per fasciatura poi a quella parte si ponga una pezzetta di lino, o un panno quadrato, qual da due teste abbia due stasse, dall'altra parte altrettante fasce, e posto che è sotto, gettate le stasse dalla parte del ventre, e le fasce dalla parte di dietro s'infilano queste nelle stasse, e strette

che sono, la sinistra va dalla parte destra, la destra dalla parte sinistra, e circondate attorno il ventre finalmente si legano insieme con un nodo. Che se poi il Condiloma invecchiato già è divenuto duro, ne cede a questi medicamenti, può abbruciarfi col medicamento che si compone di queste cose. Verderame \* ij. mirra \* iiii. gomma \* viij. incenso \* xij. stibio, opio, acazia ana \* xvj. col qual medicamento alcuni rinuovano l'ulceri delle quali poco fa ho detto. Se questo poco giova al Condiloma, possono ancora adoprarfi adurenti più gagliardi. Consumato che s'è il tumore devesi far passaggio a' medicamenti lenitivi.

9. *Dell' Emorroidi.*

Il terzo male di quella parte si è quando le bocche delle vene venendo fuori quasi con certi capetti spesso mandano sangue, chiamansi da' Greci *Emorroidi*. E questo suol accadere ancora nell' orifizio della natura delle donne. Ma in alcuni non sicuramente stagnasi detto sangue, se quei non sono indeboliti dal getto del medesimo, poichè anno quello per purga, non per malattia. Onde curatifi alcuni non avendo tale sfogo di sangue, rivolta la materia verso le viscere, ed intestini, sono stati assaliti da subitanei, e gravissimi mali. Se poi ad alcuno rende ciò nocumento, costui deve



deve sedere nell'acqua, in cui sia cotta vera benaca, e ponervi sopra principalmente scorza di melagrana pesta con foglie di rosa secca, o qualche cosa di quelle che stagnano il sangue. Ma suole in tal luogo farsi la infiammazione particolarmente quando la stitichezza del ventre ha offesa quella parte. Dappoi bisogna star a sedere nell'acqua dolce, e fomentare la parte co' gli uovi e porvisi sopra rossi d'uovo con foglie di rosa impastate con vin passo, e se il male è dentro s'unga con un dito, se fuori pongasi sopra una pezzetta. Sono altresì qui convenienti que' medicamenti che si sono posti per le crepature fresche. De' cibi in questo caso convien servirsi degli stessi che ne' sopradetti mali. Se queste cose poco giovano, sogliono consumarsi que' capetti con ponervi sopra medicamenti adurenti. Che se già sono invecchiate, per autorità di Dionisio vi si dee sparger sopra, quel ch'è composto di queste cose. Squama di rame, orpimento, ana \* v. pietra di calcina \* viij. e il giorno seguente si dee punger coll'ago. Adusti che siano i capetti, si fa la cicatrice, la qual non lascia uscire il sangue. Ma ogni volta che esso s'è stagnato, accio non porti qualche pericolo convien digerire quella materia con molto esercizio. E in oltre si agli uomini come a quelle donne, aile quali non fluiscono i meli, conviene al-

le volte cavar il sangue dal braccio.

10. *Se l'intestino, o l'orifizio della natura cade in fuori, qual cura vi convenga.*

Ma se l'intestino, over l'orifizio della vulva esce fuori, ( poiche ancor talcosa segue alle volte ) devesi osservare se la parte ch'è uscita fuori sia pura, o circondata di umore mucoso, se è pura convien che quell'uomo stia a sedere o nell'acqua salata, o pur cotta con verbenache, o scorza di melagrana. Se è umida bisogna lavarla col vino austero, e empiastrarla co la feccia di vino bruciata. Curata che s'è con un de' detti modi deve riporsi dentro, e ponervi sopra piantaggine ammaccata, o foglie di salcio cotte in aceto, indi una pezzetta di lino, o pur lana, vi si può legar sopra stringendo insieme le coscie.

11. *Dell'ulcere simile al fungo.*

Suol nascere nella stessa parte anche un ulcere, simile al fungo. Questo se è d'Inverno deve fomentarsi co l'acqua tiepida, e s'è d'altro tempo colla fresca, dappoi vi si getti sopra squama di rame, e sopra vi si ponga il cerotto fatto di mirteo, al quale sia aggiunto un poco di squama di rame, fuligine d'incenso, e calcina. Se questo non si toglie in questa guisa, bisogna abbruciarlo o con medicamenti più gagliardi, o col fuoco.

*Delle Ulceri delle dita.*

**L'**Ulceri poi delle dita invecchiate si curano comodamente o col licio, o co la morca cotta; se ad una di queste cose sarà aggiunto il vino. Nelle stesse suol con gran dolore star pendente dall'unghia un pezzetto di carne detta da Greci *Pterigion* *πτερίγιον*. Bisogna disfare in acqua alume, melino rotondo finche sia consistente come miele, indi ponervi altrettanto miele; quanto farà la porzione di quello asciutto, e mescolarvi radietta finche si facci un color simile al zafferano, e con detto si empiastri. Alcuni vogliono piu tosto per lo stesso effetto cuocere insieme alume asciutto, e miele in porzioni uguali. Se così non si farà staccata, convien tagliarla, e dappoi fomentar i diti con acqua di verbenache, e vi si ponga sopra questo medicamento. Calciti, scorza di melagrana, squama di rame, si mescolan con fico grasso lentamente cotto in miele. Overo carta bruciata, orpimento, solfo crudo ana parti uguali, si mescolan con cerotto fatto di mirteo. Overo erugine rafa \* j. squama di rame \* ij. miele un ciato. Oppure parti uguali di pietra di calcina, calciti, orpimento mescolate insieme. Qualunque di queste cose vi s'è posta sopra, coprasì con

una pezzetta bagnata in acqua; il terzo giorno si sciogla il dito, e se v'è parte veruna di secca, di nuovo si tagli, e si curi nello stesso modo; se non si toglie via bisogna purgarla co' la lancetta, e scottarla co' ferri piu sottili, poi curarla come le altre scottature. Quando poi le unghie sono scabrose devono aprirsi attorno dove coprono il dito, ed allora parimente vi si ponga sopra di questa composizione. Sandaraca, solfo ana \* ij. nitro, orpimento ana \* iv. trementina liquida \* viij. e il terzo giorno si distacchi. Col qual medicamento cadono l'unghie cattive e ne rinascono in luogo di quelle le sane.

*Fine del Libro Sesto.*

## LIBRO SETTIMO

## PREFAZIONE.

*Della Chirurgia, e chi sia stato illustre in essa: qual debba essere il Cerusico, e che cosa si tratti in questo libro.*

**L**A terza parte della Medicina esser quella che cura co la mano, già volgarmente è noto, e da me altrove si è detto. Non perche veramente quella trascuri del tutto i medicamenti e la regola del vivere, ma perche opera il piu co la mano, ed è l'operazione di quella la piu evidente fra tutte le parti della medicina. Imperocche nelle malattie avendovi una gran parte la \* fortuna, e le stesse cose essendo allevolte giovevoli, allevolte contrarie si puo venir in dubbio se la sanità sia ritornata per opera della medicina, o dello stesso corpo. Ancor in que' mali, ne quali principalmente adoperiamo i medicamenti benché il profitto si è piu apparente, contutto cio si vede chiaramente, che in vano per mezzo di quelli si va ricercando allevolte la sanità, e che spesso senza quelli ne vien restituita. Siccome si puo conoscere nel male degli occhi, che a lungo

\* Forse deve dire natura.

lungo da medici tormentati , risanano talvolta senza l'opera di essi . Ma in quella parte , che cura co la mano , si conosce chiaramente che sebbene qualche ajuto riceve ancora dall'altre , nondimeno di qui ogni avanzamento ne ritrae il piu . Ed essendo questa parte la piu antica , nondimeno maggior coltura ha ricevuta da quel gran Padre di tutta la medicina Ippocrate , che da' piu antichi . Indi dopo che diffusa in altre persone cominciò ad avere i suoi Professori , ancor nell'Egitto andò crescendo , essendone principalmente il capo Filosseno , il qual in piu volumi con somma diligenza ha compresa questa parte di medicina . Parimente Gorgia , e Softrato , Gierone , e i due Apollonij , Ammonio Alessandrino , e molte altre persone illustri anno ciascuno inventata qualche cosa . Ed in Roma parimente furono Professori , e principalmente poco fa Trifone il vecchio , ed Evelpisto , il figliuolo di Flegete , e ( per quanto si può conoscere da i di lui scritti ) il piu erudito di questi Mege-  
te , col mutar alcune cose in meglio , aggiunsero alquanto a quella professione . Deve esser poi il Cerusico Giovine , o vicino alla gioventù , di braccio gagliardo , e stabile , non tremante , e non meno pronto co la sinistra , che co la destra , di vista acuta , e chiara , intrepido d'animo , senza  
mise .

misericordia, in modo che voglia la salute di colui, che resta curato, non che mosso dalle grida di esso, o s'affretti piu di ciò che conviene, o tagli meno del bisognevole, ma doverà operare ogni cosa non altrimenti che se niente potessero muovere i lamenti degli altri. Può però esser domandato che cosa propriamente si debba attribuire a questa parte, perche le cure ancora delle ferite, e molte ulceri, delle quali altrove ho trattato, se l'attribuiscono i Cerusici. Io capisco che un solo uomo può fare tutte queste cose, e giacche ora si sono divisi, lodo colui che opera di piu. Ma io ho attribuite a questa parte quelle operazioni, nelle quali fa la ferita lo stesso medico non la riceve fatta, e quelle ferite e ulceri, nelle quali piu credo che si giovi co la mano, che co' medicamenti; di piu tutto cio che appartiene alle ossa, delle quali in avvenire dirò, e differiti nel seguente ultimo libro gli ossi, dirò in questo del rimanente, e mandate avanti le cose, che accadono a qualsisia parte del corpo, farò poi passaggio a quelle che occupano siti determinati.

## C A P O I.

*Delle parti Contuse. (a)*

**L**E Contusioni dunque in qualsivoglia parte del corpo siano così devonfi quanto prima curare, che dalla parte, che è il dolore, s'incida spesso la cute co la lancetta, e co la costola di quella s'asciughi il sangue che n'esce. Che se un poco tardi si vien alla cura, e già v'è il rossore, dalla parte che rosseggia se s'è aggiunto anche il tumore, da qualunque banda questo ne sia, è questo il miglior medicamento. Dappoi vi si devono poner sopra reprimenti, e in particolare lana succida intinta in aceto, e olio. Che se il male è piu leggiero, lo possono guarire le stesse cose applicatevi senza l'opera del ferro. E se non si ha altro vi si ponga cenere principalmente di vite, se questa non vi è, qualsivoglia altra cenere impastata con aceto, over anche con acqua.

## C A P O II.

*De' tumori, che di per se vengono, come si tagliano, e si curano.*

**M**A la cura suddetta veramente n'è facile. Piu danno da fare quei mali, che

(a) Usa Celso il nome di lussazione impropriamente per contusione.



che diperse per vizio interno gonfiano, e s'incamminano alla suppurazione. Esser queste tutte sorte di accessi gli ho detti altrove, e hò proposti li medicamenti adoprati ad essi. Resta ora, che io dica di quelle cose, che si debbono operare co' le mani. Prima dunque che indurischino bisogna incidere la pelle, e applicarvi una coppetta, la qual tira fuori la materia viziata che verso quella parte si raduna, e questo è ben farlo ancor due, o tre volte, finche non più apparisca segno veruno d'infiammazione. Con tutto ciò si può alle volte colla coppetta non operar così alcuna, stanteche talvolta, ma di rado, l'ascesso è racchiuso dal suo tegumento, il qual chiamavano gli Antichi tunica. Megete, perche ogni tunica è nervosa, dice che non nasce sotto tal male il nervo, dal quale si consumerebbe la carne, ma che stando di sotto la marcia piu antica vi si circonda un callo. La qual cosa niente appartiene al modo di curare, perche ciocchè ho detto tanto dee farsi se è tunica, quanto s'è callo, ne cos' alcuna impedisce, che quantunque sia callo; contuttociò perche cinge si chiami tunica. Di piu è solito ritrovarvisi questa alle volte ancora essendo la marcia piu matura; pertanto ciò che sotto quella racchiudesi non può tirarsi fuori co la coppetta. Ma questo facilmente si conosce, se applicata quella non cagionerà mutazione. Dunque o accada questo,

sto, o pur già vi sia la durezza in questa non v'è giovamento veruno. Ma e come altrove ho scritto, o devesi divertire la materia che a quella parte fluisce, o digerire, o suppurarsi. Se s'è ottenuta una delle due prime cose niente altro abbisogna. Se la marcia s'è maturata sotto l'asfille, e nell'inguini di rado dee venirsi al taglio, come anco se sarà un picciol ascesso, parimente se il male è nella sommità della cute, o ancor nella carne, se la debolezza di chi si cura non costringe ad affrettarsi, ed è abbastanza procurare con medicamenti che di per se s'apra. Poichè può esser quasi senza cicatrice quella parte che non ha provato il ferro. Se poi il male è più profondo si consideri se sia quella parte nervosa, o no, perchè s'è senza nervi deve aprirsi col ferro infuocato, qual ne dà questo servizio, che essendo l'apertura picciola più lungo tempo sta aperta per tirar fuori la marcia, e che ne sia dipoi piccola la cicatrice, ma se vi sono nervi accanto v'è pericolo che questi o patiscino distensione, o indeboliscano la parte, pertanto è necessario servirsi della lancetta. Gli altri però possono aprirsi anche un poco crudi; fra nervi poi convien aspettare l'ultima maturanza, qual assottigli la cute, ed a quella accosti la marcia, acciò più presto si trovi. Parimente altri richiedono solamente nella cute il taglio retto, altri perchè per ordina-

rio

rio grandemente affotigliano la cute convien che si taglinq tutti sopra la marcia. Ma ogni volta che s'adopra la lancetta devefi procurare che i tagli siano piu piccioli, ed in minor numero, che sia possibile, con questo però che sovveniamo alla necessità sì nella grandezza come nel numero. Essendoche le cavità maggiori devonfi tagliare piu larghe, e allevolte con due, e piu linee, e devefi procurare, che il fondo della cavità abbia l'uscita, acciò non vi si fermi dentro qualche umore, qual rodendo le parti piu vicine, e sane cagioni altre cavità. Richiede altresì la natura del male, che si debba divantaggio tagliar la pelle, poichè quando dopo lunghe malattie tutto l'abito del corpo è viziato, e s'è dilatata la cavità, ed in quella è pallida una parte della pelle, deve saperfi che quella è già morta, e che non è per esser d'alcuno uso, per tanto è meglio tagliarla del tutto, principalmente se accade questo attorno gli articoli piu grandi, ed il flusso del ventre ayrà emaciato l'infermo, ne il corpo si nutrisce con alimento veruno. Devefi però tagliare in guisa, che si faccia il taglio a simiglianza della foglia di mortella, acciò piu facilmente risani. E questa è legge perpetua, ogni volta che il medico per qualsivoglia causa taglia la cute: nell'assille, & inguini cavata la marcia non v'abbisogna tasta, ma convien ponervi una sponga bagnata

gnata in vino. Nell'altre parti se parimente le taffe sono superflue per purgare vi si deve infondere un poco di miele, e dipoi aggiugnervisi agglutinati. Se sono quelle necessarie, sopra esse parimente vi si deve poner la sponga nell'istesso modo intinta in vino. Quando poi convengano, o no le taffe s'è detto altrove. Tagliata la suppurazione si devon far tutte l'altre cose che ho dette doverfi fare quando s'è rotta per mezzo di medicamenti.

## C A P O III.

*De' buoni, o cattivi segni dell' esulcerati.*

**Q**Uanto poi s'avanzì la cura, e quanto possa o sperarsi, o temersi comprendesi da certi segni, e quasi da quegli'istessi, che si sono detti nelle ferite. Poiche segni buoni sono il prender sonno, respirar facilmente, non aver sete, non aver in fastidio il cibo, se v'era la febbre, esser senza quella; parimente avere la marcia bianca, liscia, d'odor non cattivo. Segni mali sono il non dormire, la difficoltà del respiro, la sete, la nausea del cibo, la febbre, la marcia negra, sporca, o di cattivo odore, parimente nel processo della cura getto di sangue, ovvero se prima che la cavità si riempia di carne sieno i labbri callo-

callosi, & essendovi ancor quella stessa carne debole, e non salda. Lo svenirsi poi o nel curarsi, o dopo è il peggior segno di tutti. Anzi che lo stesso male se all'improvviso sarà guarito, e dopo nascerà la suppurazione, ovvero gettata fuori la marcia, persisterà, con ragione dà da temere. E' altresì causa di timore se nella piaga non si sentono i corrosivi. Ma siccome a questi segni dà vario esito la fortuna, così tocca al medico sforzarsi di ricuperar la salute. Dunque ogni volta che rinuoverassi la piaga, dovrà lavarsi questa, se li parrà da reprimere l'umore col vino mescolato con acqua piovana, over coll'acqua, nella quale sia cotta lenticchia. Se doverà purgarsi si lavi col mulso, e di nuovo vi s'applichino le stesse cose. Quando parerà represso l'umore, e l'ulcere sarà puro, converrà tirar fuori la carne, e fomentar la piaga con porzioni uguali di vino, e di miele, e ponervi sopra una sponga bagnata di vino, ed olio rosato, per mezzo delle quali cose producendosi la carne, più però ( come altrove ho detto ) giova la regola del vivere, cioè terminate già le febbri, e ritornato l'appetito, il bagno raro, l'esser agitato ogni giorno leggermente, cibi, e bevande da ristorar il corpo. E tutte queste cose seguono benissimo ancor rotta la suppurazione per mezzo de' Medicamenti, ma perchè appena si può medicare un gran male senza fer-

ro si sono riservate in questo luogo .

## C A P O IV.

*Delle Fistole .*

**C**Ontro le fistole ancora , se si profonda-  
no in modo che non si possa spinger  
il collirio nell'estremità di quella , se sono  
torte , se di piu canali , piu sta il remedio  
nella mano che ne' medicamenti , e minor fa-  
tica si richiede se serpeggiano sotto la pelle ,  
che se si approfondano a dritto . Se va dunque  
per il traverso la fistola sotto la pelle , con-  
vien introdurvi la tenta , sopra la tenta ta-  
gliar la pelle , se si ritrovano le tortuosità ,  
quelle parimente colla tenta , o col ferro si  
vadin tagliando . E lo stesso convien fare se  
appariscono quasi piu ramoscelli . Giunto che  
s'è al fine della fistola , bisogna tagliar del  
tutto il callo , e ponervi sopra le \* fibbie ,  
ed un medicamento che l'unisca . Ma se va  
in giu adritto , indagato che si è colla ten-  
ta fin dove si porti , convien tagliar quella  
cavità , e dipoi poner la fibbia a' labbri della  
pelle , e parimente ponervi sopra medicamen-  
ti agglutinanti . Over se l'ulcere è piu , cor-  
rotto , il che segue alle volte per vizio , cu-  
rato che è ancor questo s'applichino sup-  
puranti .

2. Del-

\* Dette volgarmente le ciappette .

2. *Delle Fistole alle coste.*

Sogliono poi le fistole fra le coste passar di sotto, il che quando avviene in quella parte, la costa dall'uno, e l'altro lato deve tagliarsi, e cavar fuori, per non lasciarvi dentro cosa veruna di guasto. Sogliono eziandio passato che hanno le coste offendere il setto trasverso, che divide gl'intestini dalle parti superiori. Il che può conoscersi, e dal luogo, e dalla grandezza del dolore, perche talvolta esce da quella parte fiato con umore spumoso, e massime se quello l'ha prima rattenuto cola bocca. In questo caso non v'è rimedio veruno, nell'altre poi, che attorno le coste sono sanabili i medicamenti grassi sono contrarj, ed è lecito servirsi delle cose che s'adattano alle ferite. Con ottimo effetto però vi s'impongono asciutte taffe, o pure intinte nel miele, se parrà che vi sia da ripurgare.

3. *Delle Fistole del ventre.*

Nel ventre non v'è posto sotto osso veruno, e pure ivi si fanno fistole molto dannose, talmente che Softrato credette esser quelle incurabili. Non esser questo del tutto così lo fa palese la sperienza. Ed in verità (cosa che può parer molto maravigliosa) è più sicura la fistola di contro il fegato, milza, e ventricolo, che di contro gl'intestini, non perche in quel luogo sia più dannosa, ma perche ne cagiona un altro pericolo. Dalla qual

esperienza mossi alcuni Autori ne scrissero, ma poco però hanno inteso il modo di tal cosa. Avvegnache il ventre spesso ancora vien forato da qualche asme, e le budella uscite fuori si ripongono dentro, ed i labbri della ferita si cuciono, il che come si faccia, da me qui sotto dirassi. Pertanto ancor quando una picciola fistola ha perforato l'addomine si può del tutto tagliare, e cucir gli orli della ferita. Se poi quella fistola è penetrata dentro, essendo tagliata, necessariamente vi deve lasciar un gran forame, qual non può esser cucito se non con gran violenza dalla parte di dentro, per dove una certa membrana, qual chiamano i Greci *Peritoneo* circonda l'addomine. Perciò subito che taluno comincia a camminare, e muoversi, si rompe quella cucitura, e ricadono gl'intestini, dal che ne segue che bisogna, che muoja quell'uomo, ma non però è del tutto tal caso desperato. Pertanto si devono curare le fistole quando sono minori.

#### 4. Delle Fistole dell'Ano.

Quelle ancora che si fanno nell'Ano ricercano una particolar osservazione. In tal fistola si ponga la tenta, e si tagli la cute fin'all'estremità di quella tenta, dappoi con un nuovo foro si cavi fuori essa, qual tiri seco un filo, che sia infilato in una parte di quella a tal effetto forata. Da

quel-



quella parte si pigli colle mani il filo, e si legghi coll'altra testa, in modo che largamente tenga la cute ch'è sopra la fistola. E tal refe deve esser crudo di due, o tre fila torte assieme. In questo mentre poi può fare le sue faccende, camminare, lavarsi, mangiare come se fosse sano. Solamente quel refe senza toccare il nodo due volte il giorno si muova talmente che la parte, ch'era di sopra venga di sotto la fistola, ne debbesi permettere che quel refe marcisca, ma ogni terzo giorno si sciolga il nodo, ed alla testa di quello si legghi un altro filo nuovo, e tirato fuori il vecchio, si lasci nella fistola quello stesso nodo. E così esso appoco appoco risega la pelle, ch'è sopra la fistola, ed insieme risana ciò che s'è lasciato addietro dal refe, e si risega ciò che vien strinto da quello. Questo modo di curare è lungo ma senza dolore, chi vuol far presto deve stringer la pelle col refe, accio più presto tagli, e di notte porvi dentro con un pennello alcune cose liquide, accio s'affottigli la cute da quella stessa cosa, dalla quale vien lesa. Queste cose però cagionano dolore, s'accresce altresì prestezza, e tormento assieme se il refe, e ciò che vi s'è posto dentro s'empiastra con qualche medicamento di quelli che ho detto rodere il callo. Potrà però essere, che anco in quella parte convenga venir al ferro, se la fistola s'interna, e se è di più

canali. In queste sorte di fistole dunque messa la tenta convien tagliare la cute in due linee in modo che si levi via quella striscetta, che fra esse molto sottile ritrovasi, accio non di subito si riunischino i labbri, e vi rimanga luogo per le tastre, le quali vi si debbon poner sopra in pochissima quantità, e si faccia ogni cosa nella stessa maniera, che si è posto negl' ascessi. Se poi da una sola bocca si partiranno piu cavità, la fistola retta doverà tagliarsi colà lancetta, l' altre, che imboccano in quella s' infilino col refe, se qualcuna si profonderà in modo che non vi si possa sicuramente far penetrar il ferro, vi si spinga il collirio. Il cibo poi in ogni simil caso, nel quale, o s' operi colà mano, o co' medicamenti dee darli umido, il bever sia abbondante, e per lungo tempo acqua, quando già cresce la carne, allora poi converrà servirsi di bagni rari, e cibi che riempino il corpo.

## C A P O V.

*Del trar fuori del Corpo i dardi.*

**A**Nche i Dardi che tirati ne' corpi vi sono rimasti dentro, talvolta con grandifficoltà si cavano. Ed alcune difficoltà dependono dalle sorte di essi, alcune da' siti ne' quali sono penetrati. Ma ogni dardo o si cava dalla parte d' onde venne, o dalla parte,

parte, nella quale è andato, per di là e gl'istesso si fece la strada per ritornare, di qua la riceve fatta dalla lancetta essendo che si fa il taglio di contra la punta del dardo. Che se non si è questo profundato, ed è nella sommità della carne, oppure non trapassò grosse vene, e luoghi nervosi, non v'è meglio che trarlo fuori d'onde venne. Se poi è più lo spazio per cui deve ritornare il dardo, di quello che debba trapassare, e ha già trascorse le vene, e i nervi, rimane più comodo aprir il rimanente, e trarlo fuori da quella parte. Atteso che più dappresso si piglia, e più sicuramente tirasi fuori, e in un membro de' più grandi più facilmente risana, se il dardo ha trapassato 'l mezzo, perchè essendo perforato, dall'una e dall'altra parte riceve il medicamento. Se devesi poi ritirare per lo dietro il dardo, convien allargar la ferita colà lancetta, accio più facilmente venga fuori, e accio si produca minor infiammazione, la quale farsi maggiore se nel ritorno dallo stesso dardo è lacerato il corpo. Parimente se si apre la ferita dall'altra parte deve esser più larga di quel che si dilati poi dal passar del dardo. Ma in amendue le parte devesi usar somma diligenza di non tagliar un nervo, una vena grossa, o un arteria, delle quali cose se alcuna se n'è scoperta si prenda col amo

ottuso, e si tiri da parte, e tegliato che si è abbastanza si cavi il dardo, allora parimente nello stesso modo, cola stessa diligenza osservando, che nel tirar fuori quello, non si offenda veruna di quelle cose, che ho detto dover si schivare. Cio è comune ad ogni dardo, convien fuggiugnere alcune cose proprie in ciascuna sorte di dardi, quali ora dirò. Nessuna cosa così facilmente s'inoltra dentro il corpo quanto la freccia, e la stessa assaiissimo si profonda. Ma cio accade perche si porta quella con grand'impeto, e perche è stretta, per lo piu dunque si deve cavare dall'altra parte, non d'onde è venuta, e particolarmente perche per lo piu è cinta di denti, i quali piu sbranano se si tirano indietro, che per l'innanzi. Onde fatta da quella banda la strada deve allargarsi la carne con quel ferro, ch'è fatto a similitudine della lettera Greca. Dipoi quando s'è vista, se alla punta di ferro sta attaccata la sua asta si deve spinger avanti, finche dall'altra parte possa prender si, e trar fuori; se già quella si è distaccata, e v'è dentro il solo ferro, deve prender si cole dita, o cole tanaglie la punta, e così cavar si. Ne v'è altro modo di trarla fuori quando piu è piaciuto cavarla dalla parte d'onde è venuta. Stante che allargando la ferita bisogna trar fuori l'asta se v'è; o se quella non

non v'è, il solo ferro. Che se si vedono i denti, e quei sono corti, e sottili convien dentro tagliarli cole forbici, e cavar il dardo senza quelli, se essi sono piu grandi, e piu gagliardi si ricoprino col ponervi delle penne da scrivere intorno, e accio non faccino lacerazione veruna in tal guisa debbon cavarli. E questo è quanto conviene osservare nelle frecce. Un dardo poi largo se v'è rimasto dentro non è proficuo che si tiri fuora dall'altra parte, accio ad una gran ferita non aggiugniamo altra gran ferita. Convien dunque trarlo fuora con una sorte d'istromento, il qual chiamano i Greci *Grasisco Diocleo* perche ne fu l'inventore Diocle, che io ho posto esser stato fra gli antichi, e valenti medici. E una lamina, o di ferro, o di rame, che da una testa di qua, e di là ha due oncini volti all'ingiù, dall'raddoppiata co'lati, e nell'estremità leggermente piegata in quella banda, che riman concava, e di piu anche chinata quella parte, che è forata. Si cala questa attraverso accanto il dardo, dapoi giunto che si è all'estremità, si torge un poco, accio il dardo entri nel foro di quella. Quando la punta del dardo è dentro la cavità subito le due dita poste sotto a gli oncini dall'altra parte tiran fuora quel ferro, & il dardo insieme. Il terzo genere di dardi che conviene talvolta trar fuora è una palla di piombo,

un

un fasso, o cosa simile, la quale penetrata la pelle intiera vi si è fermata dentro. In tutte queste cose convien allargar la ferita, e cio che è dentro devesi trar fuori cole mollette. Si aggiugne poi qualche difficoltà in ogni colpo, se il dardo, o è piantato nell'osso, o s'è profundato nell'artico-  
 lo fra due ossa, se è nell'osso si mova finattantoche si allarghi la cavità nella quale è piantata la punta, e dappoi, o cola mano, o cole tanaglie si tiri fuori il dardo, la quale maniera si tiene anche in cavar i denti, & appena mai segue che così non venga fuori il dardo, che se starà forte, potrà scuoterli percotendolo con qualche ferro. In ultimo se non si svelge, foris-  
 si col trivello accanto, e da quel forro in figura della lettera si tagli l'osso contro il dardo in modo che le linee che si fanno vadino verso il dardo, cio fatto necessariamente crollerà quello, e facilmente si le-  
 varà. Se poi fra gl'articoli è penetrato fra due ossa, intorno la ferita si leghino quelle due membra con fasce, o cinghie, e con esse si tirino in diverse parti, accio stirino i nervi, i quali stessi si fa piu lar-  
 ga la distanza fra gli ossi, e facilmente si tira fuori il dardo. Quello però devesi procurare, come altrove ho posto, che nel cavar quello non si tagli qualche ner-  
 vo, o vena, o arteria, cioè nello stesso  
 modo,

modo, ch'ho detto di sopra. Ma se alcuno è percosso da dardo avvelenato, operate le stesse cose, e anche con maggior fretta se sia possibile, vi si deve aggiugner quella cura qual s'usa al veleno bevuto, o ai morsicati da serpenti. Cávato poi il Dardo all'istessa ferita non si ricerca altra cura, che quella che s'userebbe ad una ferita, che non vi fosse rimasta cosa veruna. Della quale abbastanza s'è detto altrove.

## C A P O VI.

*De Gangli, Meliceride, Ateroma, Steatoma tumoretti del Capo.*

**Q**ueste cose possono venire in qualsivoglia parte del corpo, dando principio dal capo. In questo si generano molti, e varj tumoretti; li chiamano in Greco *Gangli, Meliceride, & Ateromi*, e altri li distinguono anche con altri nomi, a' quali io aggiugnerò lo *Steatoma*. I quali benché sogliono venire nel collo, sotto le spalle, e ne' fianchi, contuttocio non gli ho posti segretamente, essendo fra questi poca differenza, ne dian troppo da temere, ne si curino in differente maniera. Ma tutti questi incomincian piccioli, e crescono in lungo tempo, & appoco appoco, e sono racchiusi dalla sua tunica. Alcuni di questi sono,

sono duri, e renitenti; alcuni morvidi, e cedenti, altri rimangon nudi, altri ricoperti dal suo capello, e per ordinario sono senza dolore. Cio che contengano dentro siccome si puo congiettare, così del tutto non puo conoscersi se non dopo, che si sono tagliati. Per ordinario però in quelli, che sono duri, o si ritrovano certe quasi pietruccole, o fodi, e intrigati peli. In que' che cedono, o vi si ritrova roba simile al miele, o ad una liquida farinata, over da una cartilagine rafa, o ad una carne floscia, e sanguinosa, i quali sogliono aver anche altro colore, e i *Gangli* ordinariamente sono fodi, l'*Ateroma* contiene quasi una liquida farinata, la *Meleceride* un umor piu liquido, e percio se si preme ondeggia in qua, & in là. Il *Steatoma* contiene materia soda, e questo molto si dilata, e stacca tutta la pelle posta sopra talmente che va in qua, e là, e ne gl'altri è piu serrata. Tutti questi tumori, se sono coperti di capelli, si radino prima, e poi si tagliano per il mezzo, ma del *Steatoma* si dee tagliar anche la tunica, affine si cavi fuori tuttocio che dentro si raduna, perche non facilmente si staccerebbe quella dalla pelle, e sotto alla carne ne gl'altri si lasci intatta la stessa tunica, la qual subito si fa vedere bianca, e tirante, allora col manico della lancetta si divida dalla pelle, e dalla carne, e insieme  
con



con quella gettisi fuora cio che contiene. Se talvolta però dalla parte di sotto della tunica fosse attaccato un muscolo, per non offendere quello convien tagliare la parte di sopra di quella, e il resto lasciarvela. Quando s'è cavata tutta si debbono accostare i labbri della ferita, e affibbiare, e ponervi sopra un medicamento agglutinante. Quando si è lasciata o tutta, o parte della tunica vi si debbon adoperare suppuranti.

## C A P O VII.

*De' difetti degli occhi, che si curano col ferro, e co la mano.*

**M**A siccome questi mali non sono molto fra se differenti ne in genere di vizio, ne nel modo del curarsi, così negl'occhi, quei mali che richiedono la mano, e sono fra di loro differenti, e si curano in piu, e diversi modi.

Sogliono dunque nascere nelle palpebre di sopra vesciche gonfie, e gravi, le quali appena lasciano alzar gli occhi, e cagionano in essi leggieri, ma continue flussioni di pituita, per lo piu però nascono ne' fanciulli. Bisogna dunque premendo con due dita l'occhio, e così stesa la pelle, co la lancetta tagliare [una linea a traverso, tenendo

tenendo leggermente la mano sospesa, accio non si fori l'istessa vescica, ed accio per dove aperta le s'è la strada essa venga fuori, dappoi bisogna prenderla co' le dita, e strapparla essendoche facilmente vien via. Indi convien ugnarla con un collirio di quelli che s'ungono, gli occhi che lagrimano, e in pochissimi giorni si salda la cicatrice. Piu fastidiosa cosa è quando s'è tagliata la vescica, essendoche getta l'umore, che conteneva ne poi piu può prenderfi per esser quella molto sottile. Se questo accafo avviene vifi deve applicar qualche cosa che suppurì.

2. *Del Crite, ovvero Orzaiolo tumoretto delle palpebre.*

Nella stessa palpebra, su' l' luogo de' peli nasce un picciol tumoretto, che dalla somiglianza dell'orzo da Greci chiamasi Crite. Da una tunichetta è racchiusa una certa materia, che difficilmente matura; questa deve esser fomentata o col pane caldo, o cola cera di quando in quando riscaldata talmente che non sia troppo quel caldo, ma che facilmente da quella parte si comporti. Stanteche così spesso volte, si manda via, e alle volte si concuoe. Se si vede la marcia s'apra cola lancetta, e si sprema tutto l'umore che vi è dentro. Indi co lo stesso vapore si fomenti, e si unga finche risani.

3. *De*

3. *De' Calazi delle Palpebre.*

Nascono ancora nelle palpebre alcuni altri tumoretti simili a questi, non però dell' istessa figura, e mobili se col dito si spingono in qua e in là. I quali perche sono simili alle grandine da' Greci *χαμαζια* chalazia e i latini grandine la chiamano. Convien tagliare questi se sono sotto la pelle dalla parte di fuori, se sono sotto la cartilagine, dalla parte di dentro, indi col manico della lancetta bisogna staccarli dalle parti sane. E se vi è la piaga dentro convien ugnerla prima con lenitivi, poi con medicamenti piu gagliardi. Se è fuori vi s'applichi l'empiaastro, che saldi.

4. *Dell' Unghia dell'occhio detta da Greci Pterigion, πτερυγιον.*

L'unghia poi, che dicesi da Greci *Pterigion* è una membranetta nervosa, che ha principio dall'angolo, qual giugne talvolta alla pupilla, ed impedisce quella. Il piu delle volte nasce dalla parte del naso, talor anche dalle tempie, questo male quando è fresco facilmente si caccia via con i medicamenti, che assottigliano le cicatrici negli occhi. Se s' è invecchiato, e si è già anche ingrossato deve tagliarsi. Dopo l'astinenza poi d'un giorno devesi collocare quell'uomo o a sedere dirimpetto al medico, o voltato in la in modo che posi il capo nel di lui grembo co la faccia volta  
al

al cielo. Alcuni se il male è nell'occhio sinistro vogliono che si ponga dirimpetto, se nel destro voltato in su. Una palpebra poi deve esser allargata dal Medico, l'altra dal ministro. Se quell'uomo siede dirimpetto sia da quello alzata quella di sotto, e sia voltato verso il cielo, s'allarghi quella di sopra. Dappoi lo stesso medico deve poner sotto all'estremità dell'unghia un oncinetto appuntato colla punta un poco ripiegata indentro, e attaccarnelo, e dare nelle mani del ministro la palpebra, ed esso alzare con l'oncinetto l'unghia, e trapassarla con un ago che sia infilato d'un filo di refe, e poscia posar l'ago, prender co le mani il refe da tutte e due le parti, ed alzata con quello l'unghia, se in qualche parte sta attoccata all'occhio, staccarla col manico della lancetta, finche si giunga all'angolo, e dappoi or allentarla, or tirarla accio in questo modo si trovi il di lei principio, e il fine dell'angolo, stanteche v'è piccolo doppio, o che non vi rimanga qualche particella dell'unghia, la quale ulcerata appena è curabile, o che si tagli dall'Angolo un pezzetto di carne, la quale se tirasi con troppa violenza l'unghia, vien via, e percio c'inganna, e se si farà tagliata vi rimane aperto un foro, dal quale sempre poi gocciola umore, male chiamato da Greci *Riada pvas*. Devesi dun-

dunque conoscer bene la fine dell'angolo, il quale quando abbastanza si è ritrovato, senza tirar a se troppo l'unghia si usi la lancetta, e si tagli quella membranetta, accio non s'offenda in parte veruna l'angolo. Indi vi si deve poner sopra una tasta intinta in miele, e sopra quella una pezzetta, o una sponga, o lana succida, e ne' giorni seguenti ogni dì bisogna aprir l'occhio, affine le palpebre non si attacchino insieme; Imperciocche questo è ancora il terzo pericolo, e nello stesso modo vi si ponga sopra la tasta, e finalmente s'unga con quel Collirio, con cui si cicatrizzano le ulceri. Ma tal cura convien farsi di Primavera, o almeno prima dell'Inverno. Intorno la qual, (cosa che appartiene a piu luoghi) basta averne parlato una sola volta. Poiche sono due sorti di cure. Una di quelle cose, nelle quali non puo farsi elezione di tempo, ma convien servirsi di quello nel quale ci abbattiamo come nelle ferite, e nelle fistole; l'altra quando nessun giorno c'incalza, e con sicurezza, e facilmente si puo aspettare, come accade in que'mali, che lentamente crescono, e non danno dolore, in questi convien attendere la Primavera, ovvero se qualcosa ci costringe miglior è l'Autunno, o estate dell'Inverno, e di questi il tempo di mezzo, quando gia sono calmati i caldi, e non per anco incominciati i freddi. Quanto piu poi sarà necessaria la parte che avremo alle mani,

a tanto maggior pericolo è quella sottoposta; e per ordinario quanto più grande si deve far la piaga, tanto più deve si aver riguardo al tempo.

5. *Dell' Encante tumoretto.*

Ma dalla cura dell' unghia, come dissi, nascono alcuni mali, che pure sogliono generarsi per altre cause. Imperciocchè nell' Angolo, se s'è poco tagliata l' unghia, o per altre cagioni, generasi un tumoretto, il quale lascia poco allargar le palpebre; chiamasi in Greco *Encante* *εγκανθις*. Deve si turar fuora col oncinetto, e tagliarsi intorno, trattenuta ancor qui con diligenza la mano, accio non si tagli qualche particella di quello; dippoi si spruzzi una picciola tasta o cola cadmia, o col vetriolo; e aperte le palpebre si metta in quell' angolo, e nello stesso modo si leghi sopra, e ne' giorni seguenti parimenti si alimenti, in maniera che ne' primi giorni si fomenti col acqua tiepida, o ancora co la fresca.

6. *Dell' Anciloblefaro difetto degl'occhi.*

S'attaccano alle volte fra loro le palpebre, e non si puo aprir l'occhio. Al qual male suol ancora aggiugersi che le palpebre si attaccano col bianco de gl'occhi, cioè quando si in uno, come nell'altro difetto vi fu un'ulcere curato con negligenza. Stante che nel risanare quel che si poteva, e doveva tener largo, si attaccò insieme, l'uno, e l'al-

e l'altro difetto lo chiamano i Greci *Anciloblefaro* ἀγκιλobleφάρων. Le Palpebre che solo fra loro sieno attaccate facilmente s' allargano, ma talvolta in vano, essendo che di nuovo si riuniscono. Contuttocio bisogna tentare, essendo che spesso, il fatto succede felicemente. Per tanto conviene ponervi il manico dello specillo, e staccar con esso le palpebre e frapparvi piumaccioli sottili, fin tanto abbia fine l'esculcerazione di quella parte. Ma quando la palpebra s'è attaccata al bianco de gl'occhi, per autorità d'Eraclide Tarentino devesi tagliare cola lancetta con gran cautela, accio non si tagli ne dell'occhio, ne della palpebra, e se la necessità ci costringe si tagli piuttosto della palpebra. Dopo queste cose s'unga l'occhio con que' medicamenti, co' quali si cura l'asprezza degl'occhi, e ancora ogni giorno si volti sopra la palpebra non solo affine che s'introduca il medicamento nella piaga, ma perche di nuovo non si riattacchi, e si comandi altresì al paziente, che spesso se l'alzi con due dita. Io non mi ricordo che così sia guarito alcuno. Megete ancora lasciò scritto di aver esso parimente provate molte cose, ne mai aver quelle giovato, stante che sempre di nuovo la palpebra erasi attaccata co l'occhio.

7. *Dell'Egilope fistola dell'occhio.*

Ancora nell'angolo che sta presso al naso, per qualche imperfezione apresi come una pic-

cola fistola, da cui la pituita continuamente ne cola: i Greci chiamano questo male *Egriope*. E questo benespesso travaglia l'occhio: talor altresì, corroso l'osso, penetra sino alle narici di dentro: male che alle volte si veste della qualità del Carcinoma, quando le vene sono tiranti, e incurvate comparisce il color pallido, la cute si è dura, e se leggermente vien taccato da dolore, e comunica la infiammazione alle parti prossime. Di costoro quei che anno l'Egriope co le qualità del Carcinoma, riesce pericoloso che sian curati; attesoche la cura n'accelera piuttosto la morte. Coloro poi, a' quali s'incamina verso le narici, si rende cosa superflua medicarli, stante che non guariscono. Ma a quei poi, a' quali il male fermasi nell'angolo, può mettersi in operazione la cura; con questo che si sappia, esser ella difficile, e che quanto più vicino all'angolo ne sta il buco tanto più difficilmente risana; attesoche resta molto ristretto il sito, in cui possa operare la mano; contuttocio essendo fresco il male la medicatura si rende più facile. Convien adunque col'oncinetto trapassare la sommità di quel foro, dappoi tagliare fin'all'osso tutta quella cavità conforme ho detto delle fistole; e coperto diligentemente l'occhio, e le altre parti vicine, scottare col ferro l'osso tanto più quanto se già egl'è già fatto carioso, acciò a cotesto si distacchi la squama più grossa, al-

cuni



tuni vi apolicano adurenti come vetriolo, calciti, erugine rafa; ma tal applicazione opera piu tardi, e non produce l'effetto medesimo. Scottato che si è l'osso si usa la cura stessa delle altre parti scottate.

8. *De' peli delle palpebre, che molestano l'occhio.*

I peli poi, che stanno nelle palpebre, per due motivi sogliono molestare l'occhio: attesoche talvolta la sommità della cute della palpebra si rilassa, e cala ingiu; dalla qual cosa segue, che i suoi peli, si rivoltino verso dell'occhio medesimo, perche la cartilagine non è tornata a suo luogo: alle volte sotto l'ordine naturale de' peli ne nasce un'altr'ordine, il quale tosto si piega dentro verso l'occhio. Le cure poi sono le seguenti. Se vi sono nati quei peli che non dovevano, si ponga nel fuoco un ago sottile di ferro fatto a similitudine di una lancia: dappoi quando si è rovente, sollevata la palpebra a fine, che i peli nocivi di essa possino esser veduti da chi opera, sotto le stesse radici de' peli dell'angolo si dee introdur l'ago inguifa che cotesto scorra la terza parte della palpebra: dappoi la seconda, e terza volta fino all'altro angolo; dal che avviene, che tutte le radici de' peli abbruciate ne muojano. Fatto questo vi si applichi un medicamento che impedisca l'infiammazione: e cadute che siano le croste si procuri di cicatrizzare. Que-

sta sorta d'incomodo poi con poco stento in tal guisa risana. Alcuni dicono (a) convenire trapassare co l'ago presso i peli la parte di fuori della palpebra e per quella far passare l'ago infilato con un capelo di donna a doppio, e passato che quello sia, nel seno forma quel capelo co la sua riduplicazione, doverfi far entrare il pelo, e mezzo di quel seno attrarsi, e ivi agglutini alla pelle, e vi si ponga un medicamento, che chiuda il foro fatto dall'ago stanteche in tal guisa ne seguirà che indi a poi quel pelo non starà voltato verso la parte esterea. Questa cosa non puo farsi eccettuato in un pelo lungo; merche in tal sito i peli nascono corti per lo piu. In secondo luogo se molti sono i peli per necessità il tormento dev'esser lungo, e l'ago col passar tante volte produrrà una infiammazione grande. Alla fine trovandosi in quel luogo qualche umore essendo stato l'occhio travagliato e prima per mezzo de' peli, e dappoi per i fori della palpebra, appena si rende possibile, che quel glutine con cui sta attaccato il pelo, non si distacchi e se cio avviene, non vi torni colla donde ne fu ritirato per forza. La cura poi che comunemente fassi da ognuno, non ammette dubbio veruno quando si usa nella palpebra rilassata. Essendoche bisogna, coperto l'occhio prendere co' diti la parte

(a) *P. Egineta VI. 13.*

parte di mezzo della pelle della palpebra, o quella sia la superiore, o la inferiore, e alzarla, indi considerare quanta poca porzione se ne possa tagliare in guisa che resti nella sua naturalezza stante che ancor qui due pericoli ci sovrastano; se troppo ne sia refuso, che l'occhio non piu possa coprirsi, se poco che sia vana l'operazione, e quell'uomo abbia patito il taglio senza frutto. Quello che poi dee tagliarsi bisogna segnarlo co l'inchiostro inguisa che fra l'orlo che contiene i peli e la linea piu vicina ad esso, vi resti qualche cosa, che dappoi l'ago possa prendere. Poste a segno tali cose conviene accostare la lancetta, e se n'è la palpebra di sopra si dee recidere d'avanti, se si è la palpebra di sotto, dopo piu accosto agli stessi peli; e nell'occhio sinistro convien da principio da quell'angolo, che sta piu vicino alla tempia, nel destro, in quello che si è piu vicino al naso: e convien tirar via cio che trovasi fra le due linee: indi gli orli del taglio con una cucitura semplice debbon unirsi fra di loro, e dee coprirsi l'occhio; e se la palpebra cala scarsamente, dee allentarsi: se calerà troppo, o bisogna stringerla, oppure ancora di nuovo dalla estremità dell'orlo tagliarne una piccola striscetta. La quale recisa che sia vi si facciano altre cuciture, le quali non debbon essere piu di tre. Oltre tali cose nel-

te sola a fine che cali un pochetto nell'orlo di sotto dell'occhio, val a dire restandovi aperta di sopra la ferita, in cui dee mettersi una tasta, la quale non lasci unire la cute tagliata, e nel mezzo fasci crescere la carne, la quale riempito che averà quel luogo, l'occhio resterà ottimamente coperto.

#### 10. *Dell' Esropio.*

Conforme il vizio della palpebra superiore poi si è quello, in cui ella non scende abbastanza, e pertanto non copre l'occhio; così il difetto di quella di sotto si è quando poco si tira insù, ma pende, e lascia un'apertura, e non può combaciare co la superiore. E ciò accade talora parimente da difetto della dovuta cura, talvolta ancora per la vecchiaja. Imperfezione detta da' Greci *Esropio*. Se viene da cattiva cura bisogna servirsi della stessa maniera di medicare della stessa medicatura, che si è posta di sopra: solo i corni del taglio debbon rivoltarsi verso le mascelle, non verso l'occhio. Se il male dipende dalla vecchiaja, convien dalla parte di fuori scottarlo tutto con un ferretto sottile, indi ungerli col miele, dopo il quarto giorno fomentarsi col vapore dell'acqua calda, e ungerli con medicamenti cicatrizzanti.

#### 11. *Dello Stafiloma.*

Queste cose avvengono secondo il solito intor-

intorno all'occhio negli angoli, e nelle palpebre. Dentro dell'occhio stesso poi talvolta la sommità della tunica si alza, o perche sono rotte dentro alcune membrane, oppur rilassate (a) e si fa di figura simile ad un seme di uva, donde i Greci gli danno il nome di *Stafiloma*. In due maniere si cura. Una con far passare presso le radici di esso un ago che si tiri dietro due fili; dappoi i due capi di un filo dalla parte di sopra, dell'altro dalla parte di sotto stringerli fra di loro, accio poco a poco risegandolo lo taglino del tutto. La seconda maniera si è nella sua parte di sopra tagliarne alla grandezza di una lenticchia, dappoi fregarlo co lo spodio, o co la cadmia. Fatta una delle due cose, s'inzuppi del bianco di uovo un poco di lana, e vi si applichi; e dappoi si fomenti col vapore dell'acqua calda, e ungasi con medicamenti lenitivi.

#### 12. De' Chiodi degl'occhi.

Chiodi poi vengono chiamati certi tumoretti callosi nel bianco dell'occhio, così detti dalla similitudine della figura che ne anno. La cosa piu opportuna si è trapassare col'ago quel callo presso la radice, e dargli un taglio per di sotto, ed applicarvi medicamenti lenitivi.

#### 13. Del-

(a) Not. Ved. l' *Acqua pendente Op. Chir. Par. I. c. 17.*

13. *Della natura degli occhi.*

Della suffusione ne feci menzione a sufficienza in altro luogo; perche quando viene di fresco spesse volte ci caccia co' medicamenti; ma qualora si è resa vecchia richiede la operazione della mano la quale dee riponerli fra le piu ardue. Di cui primache io intraprenda a trattare, mi convien brevemente additare la natura del medesimo occhio. La cui cognizione appartenendo a piu cose, principalmente a questo luogo appartiene. Questo adunque per di sopra ha due tuniche, la prima delle quali da' Greci vien detta *ceratoiche* ( *cornea* in latino ) e cote sta in quella parte, in cui è bianca essendo molto grossa, nel sito della pupilla va assottigliandosi. A questa ne sta attaccata quella di dentro nella parte di mezzo, dove si trova la pupilla, con un poco di foro incavata, all'intorno sottile, nelle altre parti ella pure piu piena, e dicesi da' Greci *carioide*. Queste due tuniche cingendo le parti interne dell'occhio, di nuovo sotto di queste si uniscono insieme, e fattesi piu sottili, e rese una cosa sola nel passare dal foro degli ossi, giungono alla membrana del cervello, e a quella si attaccano. Sotto le suddette poi nel sito della pupilla vi è luogo vacuo: dappoi di nuovo sta una tunica sottilissima che.

Ero

Erofilo nominò *araenaide* (retinna) Questa tiene il posto di mezzo, e in quella cavità contiene un non so che detto da Greci *ialoide* dalla similitudine che ha col vetro. Ciò non è né liquido, né secco; ma quasi un umore accagliato. Dal colore del quale, il colore della pupilla comparisce o nero, o turchino, mentre la tunica di sopra si è tutta bianca. Cotesto poi resta racchiuso dalla parte di dentro da una piccola membrana che gli vien sopra. Sotto tali cose ne sta una goccia di umore simile al bianco dell' uovo, da cui deriva la facoltà visiva, i Greci, la chiamano *cristalloide*.

#### 14. Della Suffusione.

O da malattia dunque, o da qualche percossa ne scende l'umore sotto le due tuniche, colà dove disse dover essere il luogo vuoto (a) e poco a poco si fa duro, e si oppone alla facoltà interna. Di tal infermità ne sono più sorte, alcune sanabili, altre che non ammettono medicatura. Essendo che se la suffusione è piccola, se immobile, ed ha un colore di acqua marina o di un ferro risplendente, e da banda lascia qualche apparenza di splendore, vi rimane speranza. Che se la suffusione si è grande, se la parte nera dell' occhio

per-

(a) L' *Acqua pendente* non crede ciò esser troppo vero nelle *Op. Chir. Part. I. c. 16.*

perduta la figura naturale si è cangiata in un'altra; se la suffusione ha il color turchino, o simile all'oro, se vacilla, o movefi di qua, e di là, appena mai si guarisce. Per ordinario poi ella si è tanto peggiore quanto n'ha stratta l'origine da malattia piu grave, e da maggiori dolori di capo, onde percossa piu gagliarda. Ne per risanare si è a proposito la vecchiaja; stanteche questa oltre altro male n'ha la vista debole: e neppure la puerizia; ma fra queste due l'età di mezzo. L'occhio parimente non è abbastanza proporzionato alla cura se egl'è piccolo, ovver incavato. E della medesima suffusione vi si desidera certo tempo determinato. Convien dunque aspettare finattantoche non si veda fluttuante, ma ridotta ad una certa durezza.

Avanti che s'intraprenda la cura poi dee il paziente usar astinenza dal cibo, e bere acqua per tre giorni; nel di avanti la cura ritenersi da tutto. Fatto cio si collochi l'infermo a sedere dirimpetto al medico in luogo lucido, col chiaro che gli dia nel volto, in forma che il curante sieda a lui di contro piu alto, dalla parte di dietro poi un ministro tenga ferma la testa dell'infermo, e ben salda, essendoche con un leggier movimento gli si puo togliere la vista per sempre. Anziche l'occhio stesso che curerassi dee renderfi im-

mo-



mobile con poner e legar della lana su l' l'altro occhio. La cura poi dell'occhio sinistro va fatta con la mano destra, quella del destro con la sinistra. Indi si dee adoperare un' ago o acuto, o almeno non troppo sottile, e quello bisogna introdurre, ma per linea retta per mezzo della sommità delle due tuniche nel sito posto fra il nero del occhio, e l'angolo piu vicino alla tempia dirimpetto alla suffusione nel mezzo con attenzione che non resti offesa vena di sorte alcuna. Non però dev'intro-mettersi con paura, perche vien ammessa in un luogo vuoto. Al quale giunto che siasi neppure uno che sia mediocrementemente pratico puo restar ingannato; stanteche se si preme non fa resistenza. Quando siamo giunti colà, bisogna piegar l' ago verso la medesima suffusione, e leggermente ivi girarlo a poco a poco, condurlo sotto al luogo della pupilla; quando poi n'ha trascorso quel sito, con maggior forza convien calcarlo, accio fermisi nella parte di sotto. Se vi si è fermato resta terminata la cura. Se sovente ritorna, bisogna tagliarla, co lo stesso ago, e farla in piu pezzi, li quali separati fra loro con maggiore facilità si ascondono, e con la larghezza meno nucono. Dopo tali cose cavisi l' ago per linea retta, e vi si ponga la chiara di uovo imbevuta da morvida la-

na,

na, e sopra di questa un medicamento che raffreni la infiammazione, e così si faccia la fasciatura.

Fatto ciò vi si ricerca la quiete, l'astinenza, l'unzione di medicamenti lenitivi, di cibo ( il quale nel giorno seguente dee darsi assai per tempo ) prima liquido accio non istanchino le mascelle; poi finita l'infiammazione, tale quale si è assegnato per le ferite. Alle quali cose bisogna per necessità soggiugnere, che bevasi acqua per tempo lungo.

15. *Della pituita degli occhi,*

Della flussione della pituita sottile che tormenta gli occhi, per quanto bisogna operare co' medicamenti, già l'ho spiegato. Farò passaggio qui a quelle cose, che vogliono la cura della mano. Riflettiamo poi, come a taluni mai si rendono asciutti gli occhi, ma sempre essere bagnati di un umor sottile, la qual cosa ne produce una continua asprezza, e ad ogni picciolo motivo produce infiammazioni e lippitudini, e alla fine molesta tutta la vita dell' uomo. E in certuni una tale imperfezione non può sanarsi da rimedio veruno: in altri si rende sanabile. Circa la qual differenza convien sapere che altri si debbono soccorrere, ad altri non vi si dee poner mano.

E prima resta superflua la medicatura in quei che portano cotesta imperfezione dal-

la

la infanzia, perchè durerà infallibilmente fino al punto della morte. In secondo luogo non è necessaria in coloro, a' quali non in copia, ma mordace fluisce la pituita: stanteche l'opera della mano non gli soccorre in conto alcuno. Con medicamenti, e dieta conveniente giungono alla sanazione, attesoche tali cose rendono la pituita piu crassa. Le teste larghe altresì rare volte ammettono la cura. Di piu fa caso se la pituita ne venga dalle vene che si trovano fra la calvaria e la cute, oppur da quelle che sono fra le membrana del cervello, e la calvaria; essendo che le vene di sopra passando per le tempie bagnano gli occhi; quelle di sotto, per mezzo di quelle membrane, che degli occhi vanno al cervello. E può rimediarsi a quelle vene che fluiscono sopra l'osso; non a quelle di sotto l'osso. Come neppure si guariscono coloro, a' quali la pituita gocciola da ambedue le bande, stanteche sollevatane una parte, nondimeno ne molesta l'altra.

Dove poi si stia il male in questa guisa conoscesi. Rasa la testa si dee ungere con quei medicamenti, co' quali nella lippitudine si trattiene la pituita, dalle ciglia fino alla sommità della testa: se gli occhi cominciano ad asciugarsi, è segno che venivano resi umidi per mezzo di quelle vene, che stanno sotto la cute; se persistono ad esser umidi si fa chiaro, che discende sotto l'osso, se

vi è tumore, ma piccolo, vi sono due vizj. Il più però di quei che patiscono tal male sono coloro, che restano molestati dalle vene di sopra, e per tanto a più può porgerli soccorso. E questo non si è solamente frequente nella Grecia ma nelle altre nazioni ancora, di modo che niuna parte della Medicina è più posta in uso fra tutte le genti.

Sono stati nella Grecia taluni che tagliavano in nove linee la catena della testa: due rette nella collottola, una traversa sopra di esse, dappoi due sopra le orecchie, una a traverso parimente fra le medesime: tre rette fra il vertice e la fronte. Si son ritrovati altri che anno tirate quelle linee per dritto dal vertice sino alla fronte, e conosciuti dal moto delle mascelle i principj de' muscoli, leggermente su quelle tagliavano la cute, e separatela con anni orecchie le estremità, vi frapponevano del tale di modo che nei confini antichi della cute si potessero unir insieme, e vi creosceffe frammezzo la carne, la quale strinse le vene, da cui l'umore faceva passaggio agli occhi. Certi ancora tirarono due linee co l'inchiostro dal mezzo di un orecchio alla metà dell'altro; dappoi dal naso al vertice: indi dove le linee si segavano insieme tagliarono con la lancetta e lasciato escire il sangue scottarono l'osso in quella parte. Non ostante poi questo applica-

rono il medesimo ferro rovente alle tempie, e alle vene eminenti fra la fronte, e il vertice.

La cura piu usata si è di scottare le vene nelle tempie, che per ordinario in tal male infatti si tumefanno; ma nondimeno accio si gonfino, e piu si rendano palesi convien blandamente legare il collo. Le vene poi debbono scottarsi con ferri sottili, ed ottusi, finattantoche la flussione della pituita agli occhi ne cessi. Attesoche questo si è il segno, che si sono serrate le strade, per le quali l'acqua fluiya.

Cura però piu possente si è quando le vene sono piccole e ascosse, e per tanto non possono vederli bene, che stretto il collo nella guisa suddetta, (a) e rattenuto il fiato dal paziente, accio tanto piu le vene vengano fuori, segnarle con l'inchiostro in faccia le tempie, e fra il vertice e la fronte indi sciolto il collo, dove sono i segni incidere le vene, e cavare il sangue: quando n'è uscito a sufficienza, scottarle con ferri sottili: di contro alle tempie con timore, accio non ne patiscono i muscoli che ne son sotto, e restono le mascelle, fra la fronte ed il vertice poi con piu forza di guisa che si squami l'osso.

Con tutto questo piu efficace ancora si rende

(a) *Not. Vid. l' Aqua pendente Op. Chir. Part. I. c. 3. e 4.*

rende la cura degli Afri, che scottano il vertice sì all'osso, di guisa che si stacchi la squama. Ma non vi è meglio di quello, che fassi nella Gallia comata eziandio, quando scottano le vene temporali, e nella parte di sopra del capo. Le scottature poi in qual maniera debbano curarsi l'ho già spiegato. Ora soggiugnerò, che scottate le vene conviene aver fretta ne di far cadere le croste, ne che la piaga si riempia; a fine che o non scappi fuori il sangue, o troppo presto si sopprimano le marcie, stanteche da tale ripurgo quelle parti debbono riseccarsi, e per l'uscita del sangue non bisognando, che si evacuino. Se talora poi verrà fuori il sangue vi si debbono sparger sopra medicamenti, che stagnino il sangue talmente perchè non siano adurenti. In qual guisa poi debbono scottarsi le vene, e ciò che si dee fare dopo di aver quelle scottate, lo dirò quando verrò alle cicatrici delle gambe.

## C A P O V I I I.

*Delle infermità degli orecchi, le quali curansi co' la mano, e col ferro.*

**I**N fatti siccome gli occhi richiedono di venir curati in varie maniere ancor co la mano, così circa gli orecchi poche sono le cose, che siano trattate in questa parte

di medicina. Suole però accadere, che o dalla nascita tosto, o dopo di quella per essersi fatta qualche esulcerazione, e dappoi riempitosi l'orecchio per mezzo della cicatrice, non vi sia verun buco, e perciò resti privo dell'udito. La qual cosa qualor avviene co la tenta bisogna provare, se sia riempito in profondità, oppure se sia attaccato nella sommità solamente. Attesoche l'agglutinazione è profonda se si preme non cede; se sia in alto solo ammette prontamente la tenta. Nel primo caso non conviene poner mano alla cura, accioche senza speranza di profitto non ne segua la convulsione de' nervi, e da quella il pericolo di morte, il secondo caso senza difficoltà si cura. Imperocche nella parte dove dev'esser il foro, vi si puo ponere qualche medicamento adurente e aprirsi col ferro infocato, oppur aprirsi con la lancetta. Fatta che sia l'apertura, e la piaga è già resa pura, vi si dev' intromettere una penna ingiostrata di medicamento cicatrizzante, e intorno a quello bisogna imponervi del medicamento che risani la cute intorno la penna, onde ne segue, che quella levata, si recupera l'udito.

Quando poi le orecchie sono traforate, e danno noja, è sufficiente trapassare con prestezza con l'ago infocato quella cavità, a fine che gli orli di essa leggiermente restino esul-

cera-

cerati e cio. faccisi con medicamento adurent-  
te: indi ponervi sopra medicamento che pur-  
ghi, dappoi che riempia quel luogo, e ne  
produca la cicatrice. Che se cotesta aper-  
tura si è molto grande conforme suol essere in  
coloro, che portarouo de' pesi gravi all'  
orecchio, convien tagliare quello che n' è  
di più fin al fondo, ed esulcerarne con la  
lancetta gli orli, e dappoi farne la cuciu-  
tura, e applicarvi medicamento che agglu-  
tini. La terza operazione si è di risarcire  
se vi è del corto, cosa che potendo farsi  
altresì ne labbri, e nel naso, e curandosi  
nella guisa medesima, deve da noi spie-  
garfi insieme con quelle parti.

## C A P O IX.

*Le parti corte negli orecchi, nelle  
labbra, e nelle narici come pos-  
sono risarcirsi e curarsi.*

**L**E parti corte adunque in questi tre luo-  
ghi o se riescano piccole possono rime-  
diarsi, se sono poi maggiori del dovere  
o non ammettono la cura, o con essa tal-  
mente si deformano, che innanzi si erano  
di minor brutezza. E difatto nell'orecchio,  
e nelle narici, puo temersi la sola deformi-  
tà, ma ne' labbri, se troppo son contratti,  
per necessità se ne perde l'uso; perche con



maggior difficoltà si prende il cibo, e si esprimono le parole. E in tal parte non si crea la carne ma vi si tira da luogo vicino, cosa che sebbene in una mutilazione piccola non può recare impedimento veruno, e può ingannar l'occhio, non così poi nella grande. Neppure il corpo di un vecchio, o che sia di abito cattivo, ne a chi con istento risanano le piaghe si rendono abili a questa operazione, perchè non è parte alcuna o che più facilmente vi venga il canchero, o con maggiore difficoltà vi si guarisca.

Il modo di far la cura si è questo, ridurre in quadro la parte scorciata; tirar tagliando delle linee trasverse dagli angoli di dentro della medesima, le quali del tutto vengano a separare la parte di qua dalla parte di là indi le parti che in guisa abbiamo sciolte, accostarle insieme. Se non si congiungono abbastanza, oltre le linee, che fecemo innanzi, tirarne altre due semi circolari, e rivolte verso de' tagli, co le quali linee la sommità della cute sola resti separata, stante che così avviene che con facilità maggiore ciò che tirasi può venirne dietro, cosa che non dee farsi con violenza, ma dee tirarsi a se in forma, che ne venga con facilità, e lasciato andare non molto si allontani.

Talora però da una parte la cute non  
tirata

tirata insieme del tutto rende deforme quel luogo, che abbandonato ne ha. Di cotesso luogo una parte dee tagliarsi, l'altra lasciarsi intatta. Pertanto ne dalla parte inferiore degli orecchi, ne dal mezzo del naso, o dalle parte di sotto delle narici, ne dagli angoli delle labbra tenteremo di attrarre cosa veruna. Ma caveremo dall'una, e dall'altra parte, se vi sarà qualche mancanza nell'alto degli orecchi, nel basso o alla metà delle narici, o nel mezzo de'labbri. Le quali cose talvolta furono solite di essere corte in due luoghi, ma si medicano nella stessa maniera. Se nella incisione avanza fuori cartilagine, dee quella reciderfi; attesoche ne quella piu si agglutina, o con sicurezza si trafora co l'ago. Ne però convien tagliarla in lontananza, accio fra'due orli della cute posta in libertà possa farsi da'lati radunanza di marcia. Dappoi accostando gli orli debbono cucirsi fra loro, presa la cute dall'una e dall'altra parte, e dove si trovano le prime linee di colà parimente si comincino a farsi le cuciture. Ne'luoghi asciutti, come nelle narici n'è abbastanza giovevole la schiuma di argento. Nelle piaghe poi di dentro, e femicircolari, bisogna ponervi la tasta, accio crescendo la carne riempia quella ferita. E che quanto così fu cucito, debba con diligenza somma custodirsi, può

farsi manifesto da quanto di sopra disse del canchero. Adunque ogni terzo giorno, doverà fomentarsi col vapore dell' acqua calda, e di nuovo applicarvisi lo stesso medicamento, con cui per ordinario in sette giorni resta saldato; allora si levino i punti, e la piaga si conduca al suo giusto risanamento.

### C A P O L X.

#### *Del Polipo.*

**C**He il Polipo, poi, il quale nasce dentro al naso, si curi in in primo luogo con ferro altrove l' ho detto. Ancor questo adunque con un ferro acuto fatto in figura di lancia bisogna separarlo dall'osso, usando diligenza che non resti offesa la cartilagine che ne sta di sotto, perche si rende difficile da guarirsi. Tagliato che sia il polipo, convien trarlo fuori con un ferro fatto in uncino. Dappoi s'intrometta una tasta, o qualche altra cosa bagnata di medicamento che stagni'l sangue, e di tal cosa con destrezza si riempiano le narici. Soppresso il sangue, convien purgar l'ulcere con tasta. Reso che sia puro s'introdica colà una penna empiestrata di medicamento cicatrizzante nel modo stesso che fu detto di sopra nella cura dell'orecchio, facen-

facendo questo fin tanto che del tutto risani.

## CAP. O. XL

*Della Ozena.*

**Q**uel male poi del naso che *Ozena* chiamasi, se non cedesse a' medicamenti, come debba curarsi co la mano presso di Chirurghi celebri non l'ho trovato. Credo perche l'operazione di rado giova per giugnere alla sanità; essendo nell'atto stesso di curare, porta in se qualche tormento. Presso alcuni però sta esposto doverli metter dentro del naso un canellino (a) o un pezzo di penna da scrivere tanto lungo che giunga insu fin all'osso, dappoi per entro di esso si facci penetrar fin' allo stesso un ferro sottile infocato, indi il luogo scottato doverli purgare con erugine e miele, purgato che sia col licio tirisi alla guarigione. Oppure convenir tagliar la narice dal basso fino all'osso accio piu facilmente la parte affetta possa vederli, e il ferro infocato applicarvisi. Indi bisogna cucire la narice; e l'ulcere scottata curarsi nella stessa maniera: la cucitura poi dicotto dover ungerli o co la schiuma d'argento, ovvero con altro agglutinante.

CA-

- (a) *Nota: i Chirurghi del nostro tempo lo anno d'argento.*

*De' mali della bocca, che curansi con la mano, e col ferro.*

*1. De' Denti.*

**D**Entro la bocca eziandio alcune cose si rimediano col la mano. Dove in primo luogo i denti bene spesso vacillano talora perche anno corte le radici, talvolta per difetto delle gengive che marciscano. Convien tanto nell'uno che nell'altro caso accostare alle gengive un ferro infocato tantoche leggermente le tocchi passando, non vi si fermi. Le gengive scottate si unghino col miele, e col mulso si ciacchino. Pure che furono le ulceri debbon fregarfi con medicamenti asciutti di que' che reprimono.

Se poi il dente cagiona dolori, e piace cavarlo, stanteche i medicamenti a nulla giovano deve scarnarsi a fine che la gengiva rimanga separata da quello; indi deve quello crollare. E bisogna fare le medesime cose finattantoche con facilità si muova, stanteche il dente che sta saldo con gran pericolo si svelge, e talora si leva di luogo la mascella. E una tal cosa si è ancora piu pericolosa ne' denti di sopra, essendoche puo cagionare scuotimento alle tempie, e agl'occhi. Fatto questo si prenda il dente co le dita,

*CAPO DECIMO SECONDO. 251*

dita, se si può, altro che no, co la tanaglia, e si estragga.

Che se il dente si trova corroso, quel buco dee prima riempierli o con una straccia di lino, o con piombo ben'assettatovi, a fine che sotto la tanaglia non si franga. La tanaglia poi dee tirarsi per dritto, acciocche piegatesi le radici, l'osso spongioso in cui sta piantato il dente in qualche parte non rompa. Ne pertanto di simil cosa il pericolo è leggiero principalmente ne' denti corti, i quali ordinariamente anno le radici piu brevi degli altri: stantèche bene spesso la tanaglia, non potendo afferrare il dente, o prendendolo senza effetto, rinserra l'osso della gengiva, e lo spezza.

Cavato poi il dente, se n' esce troppo sangue si dee sapere essere spezzata qualche parte dell'osso. Percio bisogna portarsi in traccia co lo specillo di quella schieggia, che si è distaccata, e co la molletta devesi trar a se: che se non viene, fa d'uopo incidere la gengiva tanto che si prenda quella schieggia, che sopra l'osso vacilla. Se poi non si è subito rotto, ma si gonfia per di fuori la mascella talmente che l'osso non può essere scoperto, esteriormente conviene applicarvisi un cataplasma di farina e fico fino a che si formi in quella parte la marcia, e allora dee tagliarsi la gengiva. La marcia ancora, se copiosa  
flui-

fluisce dà segno dell'osso rotto. Percio in tal caso ancora bisogna estrarlo. Ancora talvolta per la lesione dell'osso ne vien fatta una rimo, o fessura, e cotesta bisogna rasparla.

Il dente poi se è reso scabro bisogna rasparlo in quella parte che si vede nera, ed ungerlo con fior di rosa pestato, a cui siasi aggiunta la quarta parte di galla, e l'altra di mirra, e in bocca si tenga ad ogni tratto del vino puro. Ed in tal caso n'è proprio tener la testa coperta, passeggiar molto, far freghe al capo, e non servirsi di cibi agri.

Ma se poi per qualche percossa, o per altro motivo alcuni denti crollano bisogna con filo di oro legarli con quei, che stanno saldi: e tener in bocca de'reprimenti, per esempio vino in cui abbia bollito della scorza di pomo granato, o che vi sia stata messa galla rovente. Se ne'fanciulli ancora talvolta nasce un dente innanzi, che cada il primo, quello che ne dovèva cadere, dee scarnarsi all'intorno, e svelgersi, e quello nato in luogo del primo, ogni dì dee spingerfi un poco col dito finache sia giunto alla sua intera grandezza. Quando poi tratto fuora un dente vi è restata dentro la radice, senza perder tempo dee cavarfi con una tanaglietta fatta a questo effetto detta da' Greci *rizagra*.

2. *Delle scrofole indurite.*

Le scrofole poi ( o conifile ) che dopo le infiammazioni si fecero dure, dette da Greci, *Antiadi*, quando sono coperte da una tunica sottile bisogna scorticarle intorno co le dita, e disradicarle se ne pur così possono distaccarsi, conviene infilarle con un oncinetto, e co la lancetta reciderle dappoi lavare la piaga co l'aceto, e applicare alla ferita un medicamento, che stagni il sangue. (a).

3. *Dell' Ugola.*

La Ugola se cala abbasso con infiammazione, e porta dolore, ed è rosseggiante, non può recidersi senza pericolo, atteso che suole mandare molto sangue; perciò si è meglio poner in opera le cose da me altrove apportate. Che se poi non vi si trova infiammazione, e che nulladimeno la saliva l'ha distaccata più della giusta misura, e comparisce sottile, impuntita, bianca, bisogna tagliarla. Parimente se nel fondo è livida e grossa; in alto sottile. E non vi è meglio, che afferrarla co la molletta, e per di sotto reciderne quanto vogliamo. Stante che non si corre verun pericolo di reciderne più o meno, potendosene lasciar tanto sotto la molletta quanta si ve-

(a) Not. Sono dette Scrofole perche di tal male ne patisce la razza porcina. Si dicono anche gavine.



si vede riuscire superflua , e recidere quello che viene essere piu della giustezza naturale dell'uva. Dopo il taglio convien fare le cose medesime, che delle tonsille ho detto di sopra.

#### 4. *Della Lingua.*

La lingua poi a taluni dalla nascita sta attaccata co la parte di sotto, e cotesti appena possono parlare. La punta della lingua di costoro prendesi con la molletta, e recidesi sotto la membrana, usando somma diligenza di non offendere le vene, che le stanno intorno, e co la profusione del sangue ne rechino nocumento. Il resto della cura del taglio si è posto di sopra e i piu avanzati nell' età parlano. Io poi ho conosciuto persona, che fattole il taglio sotto la lingua, e premendole a sufficienza su i denti non perciò ricuperò la loquela. Talmenteche nell' arte della Medicina quatanque sappiasi certo quello che debba farsi, non però è sicuro ciocche possa ottenerfi.

#### 5. *Dell' ascesso sotto la lingua.*

Sotto la lingua si fa parimente qualche ascesso, che per lo piu sta nella tunica, e porta dolori grandi. Se tale ascesso si è piccolo basta solamente tagliarlo, se grande convien recidere la sommità della cute fino alla tunica, indi infilare con oncinetti da amendue le parti gli orli, e la  
tunica

## CAPO DECIMO SECONDO. 255

tunica da ogni banda circondata dee liberarsi, usando in questa operazione diligenza grande, di non tagliare qualche vena grossa.

### 6. De' Labbri.

Le labbra poi bene spesso si fendono, e tal cosa oltre il dolore reca l'incomodo di non poter parlare. Essendo che nel pronunziar le parole venendo ad allargarsi le fisure con dolore si fa venir fuori il sangue.

Ma a coteste, se sono nella sommità può rimediarsi con quei medicamenti che si compongono per le ulceri della bocca; che se sono profonde, è necessario scottarle con un ferro sottile, il quale fatto a similitudine di una piccola lancia vi dee passar sopra e non premervi. Dopo questo convengono le cose medesime, che si sono dette nelle scottature del naso.

## C A P O XIII.

### *Del male del collo.*

**N**El collo frammezzo la cute, e l'asperarteria cresce un tumore ( i Greci lo chiamano *Broncotele* ) in cui si rinchiude talvolta una carne floscia, talvolta qualche umore simile al miele, o all'acqua; alle volte ancora si trovano de' peli mescolati con minuti officelli. Cheche siasi delle

le accennate cose può curarsi con adurenti. Co' quali la sommità della cute con la tunica che ad essa sta sotto, si abbrucia. (a) Fatta quell'apertura, se n'è un liquore colla fuora; se roba densa si trae fuora co le dita; dappoi l'apertura co le tastre risanasi. Ma la cura che si fa co la lancetta si è piu spedita. S'incide quel tumore con una linea nel mezzo fin' alla tunica, indi si separa quel seno viziato dal corpo sano co le dita, e tutto cavasi col suo follicolo: poi lavasi con aceto a cui siasi aggiunto del sale, o del nitro; e con una cucitura si uniscono l'estremità, e vi si pongono sopra le cose medesime delle altre cuciture, indi si fascia leggiermente in modo che non ferri troppo le fauci. Se talvolta poi non si è potuto cavare la tunica, bisogna spruzzarvi dentro degli adurenti e medicarle con tastre, e altre cose suppuranti.

## C A P O XIV.

*De' mali dell'Ombelico.*

**A**Ncora circa l'Ombelico vengono molti mali, de' quali essendo vari, gli autori non sono concordati fra loro. Ed è

(a) *Note.* Altri leggono *exurit*, altri *exoditur*, cioè si consuma; altri *exeritur*, val'a dire si cava fuora.

CAPO DECIMO QUARTO. 257

verisimile che ciascuno abbia tralasciato di parlare di quel male, che esso non aveva veduto: e niuno volle inventare cosa, di cui si trovava all'oscuro. Presso tutti è comune che l'ombelico con deformità n'avanza fuori. Se ne domandano forse le cagioni? Megete ha poste queste tre, che talora cala in quella parte l'intestino, talor l'omento, talvolta l'umore. Softrato non fece pala dell'omento. Agli altri due vi aggiunse che talora ivi cresce della carne, e quella alle volte esser sana, alle volte simile al carcinoma. Gorgia egli ancora non fece menzione dell'omento: ma poste le medesime tre cause disse penetrare colà il fiato. Altresì Erone, addotte queste quattro cose, fece menzione tanto dell'omento, quanto di quel caso, in cui l'omento, e l'intestino insieme discende.

Qual siasi delle cose suddette conoscesi da questi contrasegni. La caduta dell'intestino il tumore si sente ne duro del tutto, ne morvido: ad ogni freddo divien minore, non solamente ad ogni caldo, ma ancora ritenendo il fiato ne cresce; talvolta rende suono, e se l'infermo è collocato supino essendo ricaduto a suo luogo l'intestino, si diminuisce il tumore. Qualora poi si è l'omento, sono simili le altre cose il tumore, si sente più morvido, e da una parte affoggiato verso la cima; se pren-

*Celso Volg. Tom. II.*

R.

desi

desi colla mano ne fugge. Quando vi è l'uno e l'altro i segni eltresì sono misti, e fra amendue si sente morvidezza. Ma se vi si trova carne, la tumefazione è più dura, e collocato supino il corpo n'è sempre gonfia, e non cede alla mano, quando le cose suddette con facilità ne cedono. Se tal carnosità è viziosa porta seco i segni medesimi del carcinoma da me accennati. Se poi si è umore co la pressione sentesi ondeggiare. Che se si è flato cede alla pressione, ma tosto ritorna, e posto che siasi supino il corpo conserva la tumefazione nella figura medesima.

Fra questi malori, quello che procede da flato non ammette la cura. Parimente alla carne simile al carcinoma, con pericolo si pone mano. La carne sana dee tagliarsi; e la ferita curarsi con tastre. L'umore alcuni fatto il taglio nella sommità del tumore lo fanno venir fuori, e medicano l'apertura co le medesime tastre. Negli altri vizj sono i pareri diversi. E che debba collocarsi supino il corpo, la cosa stessa lo fa palese, a fine che ricada nella sua cavità o l'omento, o l'intestino che sia. Il seno poi dell'ombelico allora vuoto si rinferri fra due regoli, e legate strette le teste di quelli, ivi si mortifica: da certuni si passa con un ago che si tira dietro due fili: dappoi si stringono le parti oppo-

## CAPO DECIMO QUARTO. 259

opposte de'due fili ( cosa che fassi ancora rara dell'occhio ) attesoche quel che si trova sopra la legatura si secca . Alcuni vi aggiunsero che prima di legare si dovesse tagliare per dritta linea la sommità della cute, accio con maggiore facilità introdotti un dito si potesse da loro spinger fuora quello che vi si fosse introdotto, e poi venire alla legatura . Ma è sufficiente farne ritenere il respiro, a fine che la tumefazione si manifesti grande quanta puo essere : allora segnare con l'inchiostro la base di essa, e posto supino quell'uomo, premere co le dita quel tumore acciocche se qualche cosa vi è restata , co la pressione resti spinta . Fatto questo tirar a se l'ombelico , e dove sta il segno dell' inchiostro stringere gagliardamente col filo : indi la parte che resta di sopra, o con medicamenti, o con ferro caldo scottarla tanto che resti morta, e curare la piaga come le altre scottature . E. tal cosa giova ottimamente non solo quando vi sta l'intestino, o l' omento , o l' uno e l' altro, ma ancora quando vi sta l'umore .

Ma prima bisogna ponderare alcune cose perche non provenga pericolo alcuno da tal legatura . Stanteche per tale operazione non è atto ne un bambino, ne uno di età consistente, ne un vecchio; ma dagli anni sette fino a'quattordici; dappoi a tal cura è

a proposito il corpo sano: non già quello di abito cattivo, o che ha papule, impetigini e cose simili. I tumori ancora leggieri con facilità si guariscono; ne' grandi molto si corre pericolo a curarli. Delle stagioni bisogna schivare l'autunno, e l'inverno. La Primavera è migliore di tutte. E il principio della state non è improprio. Osservate queste cose, nel dì avanti la operazione deve astenersi dal cibo. Nemmeno questo basta, ma bisogna movergli ancora il ventre, accio più facilmente si stia dentro l'adome quello che venne fuori.

## C A P O XV.

*Come si cavi l'acqua agl' Idropici.*

**B** Enche altrove ho detto doverfi cavar l'acqua dal corpo degl'idropici, ora dee dirsi in qual guisa questo si eseguisca. Taluni furono soliti di far cio sotto l'ombelico in distanza di quattro dita per ordinario, dalla parte sinistra, altri fecero questo forando lo stesso ombelico: alcuni mortifica la cute col fuoco con incidere l'adome interiore perche la divisione fatta dal fuoco più tardi si unisce. S'intromette poi il ferro con avvertenza grande, di non tagliar qualche vena. Questo ferro dev'esser fatto in guisa, che nella punta sia largo quasi

## CAPO DECIMO QUINTO. 261

quasi un terzo di dito: e devesi far penetrare tanto che passi ancor la membrana che evi dalla parte interna si pone fine alla carne. indi vi si dee cacciare un cannellino di piombo, o di metallo, oppure ripiegate all'insuori le labbra, o cingendolo di un ritegno tale, che non possa cader tutto dentro. Di questo cannello la parte, che sta dentro de'essere un poco più lunga di quella di fuori, accio si avanzi oltre la membrana. Per mezzo di questa fistola si dee cavar l'acqua, e tratta che ne sia la parte maggiore, la fistola si chiuda con uno straccio, e si lasci dentro quel taglio, se cotesto non è stato scottato. Dappoi ne'giorni seguenti si cavi circa un emina per giorno di acqua finattantoche se ne vegga vestigio alcuno. Certuni però ancora senza dar il fuoco alla cute immantinente cavano la fistola, e legano su la ferita una spongia insuppata in acqua fresca, e in aceto; poi nel dì seguente di nuovo v'intromettono quel cannellino ( il quale, se un pochetto si allarghi quella ferita fatta di fresco, lo ammette ) a fine di estrarre, se parte di acqua vi fosse restata. E si contentano di aver fatto questo due volte.



*Del ventre forato da qualche percossa,  
e degl'intestini feriti.*

**T**Alora poi da qualche percossa resta forato il ventre inferiore, e ne segue che le budelle vengono fuori. Avvenuta che sia una tal cosa, conviene senza perdimento di tempo considerare se quelle siano sane; e se mantengano il suo color naturale. Se trovasi ferito qualche intestino tenue, che non vi è rimedio, già l'ho detto altrove. Il crasso si può cucire, non perche vi sia fiducia sicura; ma perche una speranza dubbiosa è migliore di una certa disperazione, stanteche talvolta si salda. Di più se uno de' due intestini apparisce livido, o pallido, o nero, al che necessariamente si aggiugne il non aver senso, riesce vana ogni cura. Se poi quegli intestini ritengono ancora il suo buon colore, bisogna rimediarvi con fretta grande, stanteche in un momento si cangiano di colore circondati dall'aria esterna, ed insolita. Si ponga quell'uomo supino, con le coscie alzate, e se la ferita si è più stretta di quello che possa ricevere gl'intestini si allarghi tanto che basti. E se gl'intestini si sono alquanto rasciutti si lavino con acqua, a cui sia aggiunto un poco di olio,  
Fatto

Fatto cio il ministro con destrezza n'allarghi l'estremità della ferita co le sue mani, oppure attaccati due uncinetti alla membrana interna: il medico dee riponere innanzi gl'intestini primi, che sono caduti gli ultimi, in forma che mantengano il sito de'suoi ravvolgimenti. Riposta ogni cosa si scuoti quell'uomo leggermente, dal che avviene che gl'intestini si riduchino ciascheduni a suo luogo, ed ivi si posino. Riposti questi conviene considerare ancora l'omento: di cui se ve n'è di già del nero morto, bisogna reciderlo co' la forbice, se ve n'è del sano, con destrezza si distenda sopra gl'intestini la cucitura poi ne della cute esteriore, ne della membrana interiore di per se non è sufficiente ma di amendue insieme. E in fatti convien farla di due fili, e di due punti piu spessi di altrove, attesoche piu facilmente puo rompersi col moto del ventre, e una tal parte non è esposta ad infiammazioni così grandi. Adunque si mettano due fili in due aghi, e si tengano questi nelle due mani, e prima dee cucirsi la membrana di dentro talmenteche la mano sinistra nell'orlo destro, la destra nel sinistro, dato principio dalla prima banda della ferita e spinga l'ago dalla parte interiore verso l'esteriore; onde ne segue, che sempre ne sta piu lontana la parte pungente; e vicina l'

ottusa. Cucita una volta l'una e l'altra parte debbono scambiarsi dalle mani gli aghi a fine che quella passi nella destra, che stava nella sinistra, e sia nella sinistra quello che n'era nella destra, e di nuovo similmente si passino per gli orli, e così tre o quattro volte e più scambiate fra le mani gli aghi si dee rinsarrare la piaga. Dopo ciò i medesimi fili, e i medesimi aghi debbon portarsi alla cute, e nel modo stesso ancora a quella parte de' farsi l'una, e l'altra cucitura, passando sempre gli aghi dalla parte di sotto all'insuori, e sempre tramandati da una nell'altra mano. Indi vi si applichino agglutinantî; A' quali dobbiam poner sopra o una spongia, o lana succida inzuppata d'aceto cosa tanto manifesta che non fa d'uopo di averla a replicare ad ogni tratto. Postevi le cose sudette il ventre dee lasciarsi con delicatezza.

## C A P O XVII.

*Della rottura della membrana interiore dell'addome.*

**T** Allora poi o per qualche percossa, o per essersi troppo ritenuto il fiato, oppure per una troppo stretta fasciatura, si rompe la membrana interna dell'addome, intera restando la cute di sopra. Co-  
fa

## CAPO DECIMO SETTIMO. 265

fa che avviene altresì alle donne sovente dal peso dell'utero, e si fa principalmente intorno a' fianchi. Accade poi questo perche la carne che ne sta sopra essendo fiacca non puo a sufficienza tener a segno gl'intestini, e da questi distirata la pelle con deformità della si gonfia. E questa imperfezione di fatto in diverse maniere sicura. Essendoche alcuni trapassando con l'ago infilato di due fili la base di sotto, la stringono dell'una e l'altra parte dall'altra banda, nella guisa che fu detto nell'ombelico, e nell'ugola, a fine che quanto trovasi di sopra la legatura si mortifichi. Alcuni tagliano il tumore nel mezzo in figura di una foglia di mirto (cosa che doverfi fare ogni volta lo dissi altre volte) e poi cuciono gli orli del taglio. Ma la cura piu comoda si è, posto l'infermo supino tastar co la mano in qual parte quel tumore piu ceda, essendoche per necessità in quella parte si trova la rottura della membrana, e dove resta intera dee farne resistenza maggiore, dappoi dove si trova rotta debbono tagliarsi con la lancetta le due tuniche, accioche tagliato via quel di mezzo, la membrana per di dentro da amendue le parti abbia il taglio nuovo, perche il taglio ch'è vecchio non si unisce con la cucitura. Reso visibile il luogo, se la membrana in qualche parte non ha

ha rottura nuova ma vecchia bisogna tagliarne una piccola strisciotta tanto che solamente esulceri gli orli di essa. Le altre cose che appartengono alla cucitura, e al resto della sanazione, l'ho esposte di sopra.

2. *Delle varici del Ventre.*

Oltre le dette cose, accade che ne' ventri di alcuni si trovino le varici, delle quali non essendo la cura diversa da quella che si suol fare nelle gambe la riferisco a quando doverò dire di quelle.

C A P O XVIII.

*Della natura e de' mali de' testicoli.*

**O**Ra vengo alle cose che sogliono accadere alle parti naturali circa i testicoli, le quali a fine di spiegarle con facilità maggiore, convien prima dee poner si brevemente quale ne sia la natura della la parte medesima. I testicoli dunque anno una certa somiglianza con le glandole, attesoche non mandono sangue, e non anno senso veruno, dolgono poi nelle percosse e nelle infiammazioni delle tuniche, nelle quali essi racchiudonfi. Sta pendente poi ciascun di loro dagl'inguini con un nervo, i quali son chiamati da' Greci cremasteri, e con essi vanno accompagnate due vene, e due arterie per ciascheduno. Co-  
teste

teste cose poi restano coperte da una tunica sottile, nervosa, senza sangue, bianca detta da Greci Elitroide. Sopradi quella si è una tunica piu robusta, la quale gagliardamente sta affissa all'altra interna col suo fondo, questa è detta da' Greci Darton. Indi molte membrannucchie racchiudono vene, arterie, e i suddetti nervi, e fra le due tuniche ancora dalle parti di sopra sono tenui, e apparenti. Le cose detti fin' ora sono i propri e integumenti, e sostegni dell'uno, e dell'altro testicolo. Comune poi ad amendue e a tutte le parti interne si è una cavità esposta ancora agli occhi nostri da' Latini detta Scrato, da' Greci Ocheon. E questo dalla parte inferiore sta leggermente attaccato col mezzo delle tuniche, dalla parte di sopra n'è solamente circondato.

Sotto questo Scrato adunque furono solite farsi infermità diverse, e queste talora con rottura delle tuniche, talor senza, le quali dissi avere la sua origine dagl'inguini; imperocchè alle volte o per infermità prima s'infiamma, indi dal peso strapassi, o da qualche percossa resta rotta quella tunica, che doveva separare gli intestini dalle parti inferiori. Allora a moto del peso cala colà o l'omento, o l'intestino ancora, ed ivi trovata la strada, poco a poco dagl'inguini premendo nelle parte di sotto  
altresì,

altresì, sovente separa le parti nervose, e per quello che diffi, aperte, *Encerocele*, ed *Epiplocele* chiamano i Greci questa imperfezione; presso di noi con nome brutto, ma comune a tali mali, si chiama *Ernia*.

Se poi vi è disceso l'omento, il tumor dello Scroto mai leva, o sia co l'astinenza, o col rivoltare il corpo in qua, e là, oppur se siasi collocato in qualsivoglia diversa positura, parimente se sarassi rettenuto il fiato non molto cresce, toccato è inuguale, morvido, e lubrico.

Ma se vi è disceso altresì l'intestino quel tumore senza infiammazione ora cala, ora cresce; e per ordinario è senza dolore; e se taluno sta in riposo, o giace, talora del tutto cala, e alle volte si diminuisce a segno, che nello Scroto vi restano pochi avanzi: ma col gridare, o col mangiare assai, e se quell'uomo ha fatto sforzo sotto di qualche peso, il tumor cresce: ad ogni freddo si concentra, al caldo si dilata; e lo Scroto allora si rende rotondo, e leggiero al tatto, e quello che si è di sotto sentesi lubrico; se si preme fa ritorno dentro l'inguine; se si leva la mano, di nuovo con un certo mormorio ne ritorna, e questo infatti avviene ne' mali leggieri. Bene spesso poi introdottovisi lo sterco gonfia di più, e non può respingerli indietro, in tal caso reca dolore allo Scroto, agl'inguini,  
e al

e' al basso ventre. Alcune volta se ne risente lo stomaco ancora rendendo dapprima per bocca bile di color di ruggine, dapoi verde, e a taluni altresì nero.

Restando poi le membrane intere alle volte quella parte vien distesa da umore. E di tal affezione parimente due sono le specie. Attesoche o si raduna l'umor fra le tuniche, e fra le membrane, che ivi si trovano intorno le vene, e le arterie dove queste premute sonosi indurite. E tal umore in fatti non ha un sito solo quando si trova fra le tuniche mercecche allevolte fermasi fra la prima, e la mezzana, allevolte fra la mezzana e l'ultima. I Greci con un vocabolo comune, qualunque siasi l'affezione la chiamano *Idrocele*, i latini poi, non essendo note abbastanza le differenze, l'esprimono tutte col medesimo nome.

I segni poi alcuni sono comuni, altri propri. Comuni quei, da' quali si conosce esservi umore, propri quei che ne scoprono il luogo. Che vi sia sotto l'umore l'apprendiamo, se il tumore mai del tutto sparisce, ma talora è piu leggiero, o a motivo dell'astinenza dal cibo, o per una febbriciottola, principalmente ne' fanciulli, e quel tumor è floscio, se quell'umore per altro non è troppo se questo molto è cresciuto fa resistenza come se fosse un utre pieno, e bene stretto: le vene altresì del-  
lo



lo Scroto si gonfiano; e se premiamo col dito, l'umor cede, e fluendo intorno s'inalza quello che non premesi, e traspare dallo Scroto come se fosse in vetro, o un talco, e tal umore per quanto è in se non apporta dolore. La situazione poi sua così discuoopresi. Se sta fra la tunica prima, e la mezzana se lo premiamo con due dita, l'umor poco a poco ritornando viene sotto di quelle lo Scroto resta piu ristretto, e piu bianco; se si tira a se niente, o molto poco si distira: il testicolo, da quella parte ne si vide, ne si sente col tatto. Che se si trova sotto la tunica di mezzo, lo Scroto distirato si solleva maggiormente, talmenteche il membro genitale che gli è di sopra, sotto quel tumor si nasconde.

Oltre le cose suddette restando parimente intere le tuniche vi nasce il ramice. I Greci nominano questo male visocele qualora gonfiansi le vene. Queste alle volte attortigliate, o conglomenate alla parte di sopra o riempiono lo stesso Scroto o la tunica di mezzo, o l'ultima; talor ancora crescono sotto l'ultima tunica intorno al medesimo testicolo, e sup nervo. Di queste quelle che si trovano nello Scroto sono esposte alla vista, quelle poi che occupano la ultima, o la mezzana tunica, essendo piu ascose non tanto si veggono, ma pure in qualche forma stanno soggette alla vista,  
oltre

oltre che vi è qualche tumefazione secondo la grandezza e qualità delle vene ; e costesto tumore se premisi fa maggior resistenza, e giù per i canali delle vene si rende ineguale ; e dalla parte dove esso ritrovasi il testicolo pende più del dovere. Qualora poi costesto male si è venuto sopra lo stesso testicolo, e suo nervo, il medesimo testicolo cala alquanto più abbasso, e comechè resta privo del suo alimento si rende minore dell'altro.

Rare volte, ma pur talora fra le tuniche vi cresce ancora la carne, cosa detta da' Greci *Sarcocoele* ( *Ernia caruosa* da noi ).

Bene spesso ancora da infiammazione divien maggiore il testicolo, e ne dà delle febbri ; e tale infiammazione presto non calma, il dolore si distende fino agl'inguini, e a' fianchi ; e fassi gonfiamento in tali parti ; e il nervo, da cui pende il testicolo diviene più grosso, e più duro.

Oltre le cose suddette talvolta i ramici riempiono l'inguinaja, male detto da Greci *Bubonocoele*.

## C A P O XIX.

*Delle cure comuni de' testicoli, o prima del taglio dell'inguine, e dello Scroto.*

**S** Apute queste cose convien dire della cura. Nella quale alcune cose sono comuni  
ni

ni a tutte coteste affezioni , alcune proprie delle particolari . Farò prima menzione delle comuni . E dirò prima di quelle che ricercano il ferro ; essendoche di quelle o che sono incurabili , o che debbono medicarsi altramente doverà trattarsi quando sarò giunto a parlare delle specie particolari . S'incide poi sovente l'inguine , talora lo Scroto . Tanto in una che nell'altra cura l'infermo per tre giorni dee ber acqua ; nel giorno innanzi dee astenersi ancora dal cibo , nel di della operazione si collochi supino , indi se si ha da incidere l'inguine , e che già sia ricoperto di peli , prima si rada , poi tirato lo Scroto , a fine che la pelle dell'inguine venga distesa , dee quello incidersi nel fondo del ventre , quella parte , che le tuniche di sotto si uniscono con l'addome . Si dee far poi l'incisione con franchezza fino colà dove l'ultima tunica dello Scroto stesso si trova , la quale venga tagliata , e si giunga a quella di mezzo . Fatto il taglio , l'apertura guarda all'ingiu . Dentro di quello convien mettere il dito indice della mano sinistra , a fine che separate le membranette , che vi si frappongono , si renda piu ampio il seno . Il ministro poi afferrato lo Scroto co la mano sinistra , lo dee tirare all'insu e piuche puo , allontanarlo dagl'inguini , prima con lo stesso testicolo , mentre il Chirurgo , se col dito  
non

non può dividere tutte le membranette, che si trovano sopra la tunica di mezzo, le tagli col ferro, dappoi senza il testicolo, accio questo caduto abbasso si approssimi al taglio, e col dito da quella banda si cavi fuori, e si posi sopra del ventre con le sue due tuniche. Fatto questo, se vi sono cose difettose conviene di ognintorno reciderle. Nelle quali scorrendovi molte vene, le più piccole possono di fatto tagliarsi tosto, ma le più grandi debbono allacciarsi prima con un lungo filo, accio non facciano profusione di sangue con pericolo del paziente.

Che se sarà offesa la tunica di mezzo, o sotto di essa sarà cresciuto il male, converrà recidersi talmente, che co la profondità del taglio si arrivi fino allo stesso inguine. Di sotto però non si dee toglier via tutta, essendochè quello che presso la base del testicolo sta fortemente attaccato co la tunica di sotto, senza un pericolo sommo non può recidersi; pertanto vi si dee lasciare.

La cosa medesima convien farsi ancora nella tunica inferiore, qualor ell'è offesa; non però bisogna tagliarla dalla sommità del taglio dell'inguine, ma un pochetto al di sotto; a fine che la membrana dell'addome offesa non produca infiammazione. Contuttocio neppure di essa convien lasciarvene troppo; accio che dappoi non for-

mi un seno, e dia luogo al medesimo male.

Ripurgato in tal maniera il testicolo, si dee calare belbello con le sue vene, sue arterie, e suo nervo per il medesimo taglio con avvertire, che nello scroto non cada sangue, ovvero in qualche luogo accagliato ne resti. Le quali cose accaderanno se il Chirurgo con l'accappiatura delle vene vi averà provveduto. I fili, da' quali saranno strette le teste delle suddette vene, doveranno star pendenti fuori del taglio, e quali dappoi, fatte che siano le marcie, ne caderanno senza verun dolore. Al taglio poi bisogna ponervi due affibbiature; e di piu un medicamento agglutinante.

E' solito talora esser di necessità, che da una banda dell'apertura si tagli alquanto, accio si formi la cicatrice piu grande, e piu larga. Quando avviene una tal cosa, le teste non vi debbon esser legate sopra, ma solo esservi poste leggermente; e su coteste medicamenti che ribattano l'infiammazione, cioe lana succida, o spugna bagnata in aceto, le altre cose vi convengano che si adoprano quando debbono promoversi le marcie. Ma se fa d'uopo che si tagli di sotto, collocato il paziente supino, si metta la mano sinistra sotto lo scroto, dappoi fortemente si prenda, e si recida, se il difettoso è poco, in piccola quantità, a fine che ne rimanga sotto una terza parte intera per sostenta-

stentamento del testicolo, se il viziato è assai, se ne tagli ancora di più, in guisa che al fondo solamente un pochetto ve ne resti d'intero a cui possa star sopra il testicolo. In primo luogo però dee tenersi il ferro dritto con la mano leggiera quanto si può, finattantoche ne allarghi lo scroto il Chirurgo, dappoi si abbassi la punta per recidere le membrane che sono attraverso fra la tunica di sopra, e quella di mezzo. Ma se il difetto sta in vicinanza non bisogna toccare la tunica mezzana, se poi anco sotto di essa sta il viziato, ella parimente dee rescinderfi; come la terza ancora, se questa nasconde il viziato. In qualunque parte poi siasi trovato il male, bisogna che il ministro dalla parte di sotto prenda moderatamente lo scroto, il Chirurgo, col dito, o col manico del ferro allargata la parte inferiore, collochi fuori la tunica; indi la tagli con quello stromento, che dalla sua figura dicesi corvo, talmente che vi possino entrare due diti, l'indice, e quel di mezzo, terminate poi tali cose, convien recidere il rimanente della tunica, e fra le dita metter dentro il ferro, e tirar, o gettar fuori tutto quanto di nocivo ritrovasi.

Qualunque poi delle tuniche taluno avrà offesa dee rescinderla; e la mezzana come ho detto di sopra, in alto più che si

pùo fin all'inguine; quella inferiore un poco più di sotto. Per altro innanzi che si venga al taglio di esse debbono legarsi diligentissimamente col filo; e i capi di quello debbon lasciarsi fuori della ferita, conforme nelle altre vene altresì che una tal cosa ricercheranno.

Fatto ciò dee rimettersi dentro il testicolo, e gli orli dello scroto debbon unirsi insieme con le cuciture, ne queste siano poche a fine che le labra della ferita non lascino di ben agglutinarsi, e la cura ne vada in lungo; ne troppe, accio non rendano maggiore l'infiammazione. Ed in questo luogo ancora dee avvertirsi che nello scroto non rimanga del sangue, dappoi debbono ponervisi sopra agglutinati.

Se talvolta poi n'è scorso nello scroto il sangue, o alquanto di esso congelato vi è caduto si dee far un taglio sotto di quello. E nettato quel sangue circondarsi con una spugna bagnata d'aceto. Legato poi che si è qualunque taglio fatto per i motivi suddetti, se non vi si sente dolor alcuno, su'cinque primi giorni non conviene dislegarlo, ma solamente due volte al giorno spruzzarlo con aceto, sopra posta vi lana, o spugna, se vi si sente dolore, nel terzo giorno bisogna disfasciarlo; e dove sono le affibbiature bisogna reciderle; dove sta la tasta convien quella mutare;  
e quan-

è quanto vi si applica sopra bagnare con olio rosato e vino . Se la infiammazione va crescendo, alle cose suddette fa di bisogno aggiugnere un cataplasma di lenticola e miele; ovvero di malicorio, che sia stato cotto in vino austero: o di una mistura di cose tali . Se con i detti rimedj la infiammazione non si sarà acquietata, dopo il quinto giorno si fomenti la ferita con abbondante acqua calda finattantoche lo scroto stesso diventi piu piccolo, e faccisi piu crespo: indi vi si applichi un cataplasma di farina di fromento; alla quale sia mescolata ragia di pino, le quali cose si curasi una persona robusta, debbono cuocerfi in aceto; se la persona è debole, nel miele . Ne si pone in dubbio, qualunque ne sia stato il male, se la infiammazione si èagliarda, che non vi si debbano applicar sopra de'suppuranti .

Che se poi la marcia si è fatta dentro dello stesso scroto, vi si dee fare un poco di taglio, per darle l'uscita, e bisogna applicarvi sopra tanta tasta, che cuopra l'apertura . Terminata l'infiammazione, per i nervi bisogna usare un cataplasma piu congruo, e mettervi di sopra il cerotto . Queste son o le cose appropriate alle ferite di tal sorta . Le altre cose che appartengono alla medicatura, e al vitto, debbon esser simili a quelle



che n'abbiamo prescritte altresì in altro genere di ferite.

## C A P O XX.

*Della Cura dell'Intestino caduto nello Scroto.*

**D**Ette queste cose dobbiamo venir alle specie particolari, e se a qualche piccol fanciullo cala abbasso l'intestino, prima di venire al taglio deve provarsi la fasciatura. Si fa a tal effetto una fascia, a cui nel fondo sia cucita una palla fatta di stracci, che gli si pone sotto per reprimere l'intestino, dappoi il rimanente della fascia si cinge strettamente, sotto la quale spesso volte se ne va indentro l'intestino, e fra di loro le tuniche si attaccano. Se poi l'età è avanzata, e si conosce esservi caduta gran parte dell'Intestino per il tumor grande, e vi si aggiugne il dolore, e il vomito, le quali cose avvengono dallo sterco caduto a quella parte; è cosa chiara che senza pericolo non vi si può adoperare il ferro. Bisogna solamente alleggerire il male, e togliersi per mezzo di altre cure. Convien trar sangue dal braccio, poi se le forze lo comportano si comandi dieta per tre giorni, se no, certo più a lungo che sia possibile conforme comporteranno le forze del corpo. Nello stesso

tem-

tempo poi vi si dee applicar sopra un cataplasma di seme di lino cotto prima in mulso, indi vi si metta ancora farina d'orzo con trementina, e l'infermo dee mettersi in bagno d'acqua calda, alla quale sia aggiunto dell'olio, e gli si dia qualche mediocre cibo caldo. Alcuni altresì muovono il ventre; questo può portare qualche cosa nello scroto, non cavarla. Per mezzo delle sopradette cose poi alleggerito il male, se talor ritornerà il dolore, converrà farsi lo stesso. Senza dolor parimente se saranno caduti molti intestini, è superfluo venir al taglio, non perchè con esso non possino cavarli dallo scroto, se non vieta però ciò l'infiammazione, ma perchè rigettati non si trattengano nell'inguine, e ivi facciano tumore, e così non si dia fine, ma mutazione al male. In quello poi che si converrà curare col taglio, subito che il taglio fatto nell'inguine sarà giunto alla tunica mezzana, doverà con due oncinetti prenderla accanto gli orli, mentre tirate fuori tutte le membrane il medico libera quella. Poichè s'offende con pericolo la parte, che dee tagliarsi, non potendo ritrovarsi l'intestino se non sotto di essa. Allargata che sarà doverà tagliarsi dall'inguine fin' al testicolo in modo che esso non ne venga offeso, dappoi staccarsi affatto. Ordinariamente però questa cura vien ammessa nell'età puerile, e nel

mal leggiere. Se la persona sarà robusta, e il male maggiore non convien cavar fuori il testicolo; ma lasciarlo nel suo posto. Cio si fa in tal guisa. Apresi l'inguine nello stesso modo co la lancetta fin alla tunica di mezzo, e la detta tunica similmente si alza con due oncinetti in modo che dal ministro il testicolo si tenga, affine non esca per la ferita, allora quella tunica si taglia per l'inguine co la lancetta. Poi due diti della man destra il pollice, e l'indice dividono l'arteria, e il nervo, e la loro tunica dalla tunica superiore. Che se alcune membranette lo vietano si tagliano co la lancetta, finche si renda del tutto visibile la tunica. Tagliato ciocche dee tagliarsi, e riposto il testicolo, ancora dall'orlo di quella ferita, che si ritrova nell'inguine se ne dee tagliare una striscia alquanto piu larga accio sia fatta maggiore la ferita, e possa generare piu carne.

## C A P O XXI.

*Della cura dell'Omento caduto nello scroto.*

**S**E' disceso l'omento, devesi infatti aprir l'inguine nello stesso modo che si è scritto di sopra, e allargarsi le tuniche, ma convien considerare se sia in quantità

CAPO VENTESIMO PRIMO. 281

tà grande, o in poca. Perche se si è poco dee respingerfi sopra l'inguine dentro il ventre col dito, o col manico dello specillo. Se è in qualche quantità bisogna lasciarlo star pendente quanto n'è caduto giù dal ventre, e quello impiastare con medicamenti adurenti finattantoche si mortifichi, e cada. Alcuni anche in questa cura vi trapassano co l'ago due fili, e co le due teste di ciascuno di essi legano strette diverse parti. Co la quale operazione ugualmente ma piu tardi si mortifica. Si aggiugne però anche a questo prestezza, se l'omento sopra la legatura si unge con medicamenti, che consumano, e non rodono, chiamati da Greci Settici. Sono stati altresì alcuni, che anno tagliato l'omento co le forfici, cosa che nel piccolo non è di necessità, nel grande puo cagionare profusione di sangue. Attesoche l'omento sta collegato con alcune vene ancor alquanto grosse. Ne però ancorche tagliato il ventre ciochè è caduto si toglie co le forfici, essendo questo mortificato, e non potendo in altra guisa sicuramente levarsi via, da cio in questo caso dee prendersi l'esempio. Se poi l'omento vi si è riposto dentro, il taglio dee cucirsi. Se esso getta molto umore, e per di fuori è morto convien quello curare tagliando gli orli come sopra si è detto.

2. Del-

2. *Della cura dell'Ernia acquosa.*

Se poi dentro vi si ritrova l'umore, deve incidere ne' fanciulli l'inguine, se però ancor in questi non lo vietasse la quantità grande di quel liquore, ne gli uomini poi e ogni volta che v'è sotto molto umore, si tagli lo scroto. Onde se s'è inciso l'inguine tirate a quella parte le tuniche deve gettarsi fuori l'umore. Se si è tagliato lo scroto, e subito sotto questo ne sia il vizio non deve farsi altro che gettar fuori l'umore, e tagliar le membrane, se alcune cingevano quello, dappoi convien lavarlo con acqua, alla quale sia aggiunto o sale, o nitro: se si ritrova sotto la tunica di mezzo, o sotto l'infima, tutte queste convien ponere fuori dello scroto, e tagliarle.

## C A P O XXII.

*Della Cura del Ramice.*

**I**L Ramice poi se si ritrova sopra di esso scroto bisogna scottarlo con sottili, e acuti ferri, i quali si ficchino nelle stesse vene con questo che non scottino fuor di coteste, e principalmente il ferro si accosti colà, dove fra di loro s'intrigano, dappoi vi s'applichi farina disfatta in acqua fresca, e s'usi quella sorta di legatura, che

ho

ho detto esser conveniente alla cura dell' Ano. Il terzo giorno vi si deve applicar lenticchia con miele, gettate le croste si purghino le ulceri con miele, con rosa si riempino, e con tiste asciutte si cicatrizzino. A quei poi che le vene gonfiano sopra la tunica di mezzo, conviene tagliar l'inguine, e tirarsi in fuora la tunica, e da quella separare col dito, o col manico della lancetta le vene. Da quella parte poi che staranno attaccate si leghino con un filo si dalla parte di sopra come di sotto, indi si taglino sotto la legatura, e si riponga a suo luogo il testicolo. Ma quando il ramice è sopra la terza tunica è necessario che si tagli quella di mezzo. Dipoi se gonfiano solo due, o tre vene, ed il male è in qualche sito in modo che la maggior parte sia senza l'imperfezione convenien far lo stesso, che si è scritto di sopra, e legate le vene dalla banda dell'inguine, e dal testicolo si taglino, e quello si rimette dentro. Se poi il ramice occuperà tutta questa parte, s'intrometta dentro al taglio il dito indice, e si ponga sotto alle vene talmente che appoco appoco le tiri fuora tirandole del pari finche questo testicolo si renda eguale all'altro. Poi sopra gli orli vi si ponghino le fibbie in modo che parimente afferrino ancora le vene. Cio fassi in tal guisa. Si trafora con un ago dalla

parte

parte di fuori l' orlo della ferita, indi si tramanda non per la medesima vena, ma per la membrana di quella, e per mezzo di essa si spinge all'orlo opposto: le vene non debbono forarsi accio non mandin fuora sangue. Sempre si ritrova fra queste vene una membrana, e non è pericolosa, e abbastanza tien forte quelle se saranno legate con un filo. Pertanto è sufficiente ancora esser due le fibbie, indi le vene tutte che si saranno tirate fuora nell'inguine stesso, si debbono unite insieme col manico della tenta; il tempo di sciogliere le fibbie è finita che sia l'infiammazione e purgato che farà l'ulcere, accio insieme si cicatrizzino così gli orli, che le vene. Quando poi è nato il ramice fra l'infima tunica, e il testicolo, e il nervo di esso vi è una sola cura ed è di tagliare tutto il testicolo. Imperocchè ne quello è utile alla generazione, e a tutti pende con deformità, ad alcuni anche con dolore. Ma allora pure bisogna aprir l'inguine, tirar fuora la tunica di mezzo, e tagliarla; lo stesso si operi nella tunica di sotto, e si tagli il nervo da cui sta pendente il testicolo. Fatto cio le vene, e le arterie si leghino con filo accanto l'inguine, e sotto la legatura si taglino.

## C A P O XXIII.

*Dalla carne cresciuta fra le tuniche de' testicoli, e del nervo indurito.*

**P** Arimente se talvolta farà cresciuta fra le tuniche la carne, non vi è dubbio, che si deve tirar fuora, ma torna meglio, che cio si eseguisca con tagliar lo screto. Che se il nervo è indurito non vi si può rimediare ne co la mano, ne co medicamenti, essendoche ne vengono febbri ardenti, e vomiti, o verdi, o negri, oltre cio gran sete, e asprezza di lingua, e per ordinario dopo il terzo giorno si getta per secesso bile spumosa con mordacità. Ne facilmente può prenderfi cibo, ne rattener quello, e indi a poco si raffreddano l'estremità, ne vien tremore, vengono distese le mani senz' occasione; dappoi ne segue sudor freddo alla fronte, e finalmente la morte.

## C A P O XXIV.

*Del Ramice dell' Inguine.*

**Q** Uando poi si ritrova nello stesso inguine il ramice, se il tumore è piccolo, convien fargli un solo taglio, e s'è grande si tagli con due linee, accio si apra nel mezzo, poi senza cavar fuori il testicolo in quel modo



modo che ho insegnato farsi alle volte agl'intestini caduti, si raccolgano insieme le vene e si leghino se in qualche luogo sono attaccate (a) alle tuniche, e sotto le legature si taglino, ne la cura di simil ferita ricerca altro di nuovo.

## C A P O XXV.

*Del ricoprir la ghianda del membro  
se è scoperta.*

**D**A queste cose convien far passaggio a quelle che avvengono nello stesso membro, nel quale se la ghianda è scoperta, e la vuol taluno ricoprire per bellezza si può far ciò, ma si fa meglio in un fanciullo, che in un adulto, meglio in quello in cui questo è naturale, che in quello in cui secondo il costume d'alcune nazioni il membro è circonciso, meglio in colui che ha la ghianda piccola, ed accanto ad essa n'è la cute larga, ed il membro è piccolo, di quello ch'ha tutto il contrario di queste cose. La cura poi di quelli che anno questo per naturale, si è questa. Si prende la cute ch'è intorno la ghianda, e si tira finche nasconda quella, e vi si lega; dappoi s'incide in giro accanto la pube tanto che resti

(a) Not. Si offervi di non tagliare neppur il Peritoneo perche tagliato recherebbe danno grande.

fi nudo il membro, e si attenda diligentemente di non tagliar o il canal dell'orina, o le vene che ivi si trovano. Fatto questo spingesi la cute verso la legatura, e si rende nudo il membro intorno la pube come in cerchio, e vi si pongono taste, accio vi cresca la carne, e riempia quel luogo, e la larghezza della piaga vi genera sufficiente coperta. Ma finche non sia saldato vi si dee tener la legatura, lasciatovi solamente in mezzo un picciolo forame per l'orina. In colui poi, ch'è circonciso deve staccarsi la pelle dalla parte interna del membro co la lancetta sotto il cerchio della ghianda, ne molto duole, perche staccata la sommità, puo staccarsi co la mano per l'ingiu fin'al pube, ne percio n' esce sangue. Staccata poi la cute di nuovo si stende fin fuor della ghianda, poi si bagna con molta acqua fresca, e vi si pone intorno un empiastro, che reprima gagliardamente l'infiammazione. E ne' giorni seguenti dee astenersi da mangiare finche sarà quasi del tutto abbattuto dalla fame, accio forse la sazieta non risvegliasse quella parte, e terminata l'infiammazione deve legarsi dalla pube fino al cerchio, ed indurfi sopra la ghianda con ponervi un empiastro; stantechè così seguirà che la parte di sotto si agglutini, e quella di sopra risani in modo che non si attacchi.

2. *Come la ghianda coperta si possa discoprire.*

Pel contrario se la ghianda è coperta in modo che non si possa discoprire, il qual difetto i Greci chiamano (*Fimosi*) deve si aprire; il che si fa in tal guisa. Si taglia per di sotto la cute dalla sommità in linea retta fin al freno, e così la schiena di sopra allentata puo cedere addietro. Che se così si è acquistato poco, o per la strettezza, o per la durezza della schiena, si tagli subito la cute dalla parte di sotto in figura triangolare in modo che la cima del triangolo sia accanto il freno, e la base nell'estremità della schiena. Dappoi vi si applichino taffe, e altri medicamenti che risanino. E' bensì necessità lo star a riposo finattantoche sia formata la cicatrice, essendoche il camminare, col fregare rende l'ulcere sordido.

3. *Modo per infibbiare. (a)*

Furono soliti ancora taluni di infibbiare i giovanetti per accio conservino la sua fanità. E questa si è l'operazione. Si stende la cute che è sopra la ghianda, e si segna da amendue le parti per fianco co l' inchiostro da quella parte che dee forarsi, e si lascia andare; se i segni ritornano sopra la ghianda se n'è preso troppo, e convien far i segni piu ingiu. Se la ghianda ne vien libera quel sito è proporzionato per la fibbia. Allora dove sono i segni, si trapassa la cute  
con

(a) *Dicesi da noi metter il lucchetto.*

con un ago infilato di refe, e le teste di quel filo si legano insieme, ed ogni giorno quello movasi finche si cicatrizzino i fori. Saldati che questi sono, cavato fuori il filo vi si metta la fibbia, la quale tanto farà migliore, quanto piu leggiera. Tal cosa però deve piuttosto riponerfi nel numero delle cose superflue, che delle necessarie.

## C A P O XXVI.

*Della difficoltà d'orinare, e sua cura.*

**P**Orta il caso talvolta che sia necessario di facilitar l'orina co la mano, se quella non si manda fuori, o perche il canale di quella a motivo di vecchiezza n'è ricaduto, o perche il calcolo, oppur qualche altra cosa dal sangue fissatovi gli s'opponne. E talor anche un'ordinaria infiammazione vieta che quella naturalmente si getti. E cio non è solamente necessario negli uomini, ma talvolta anche nelle Donne. A tal fine dunque si fabbricano cannelli di rame, i quali accio siano proporzionati ad ogni corpo sì piu grande come piu piccolo, deve il medico averne tre per gli uomini, e due per le donne. Di quelli per gli uomini il maggior è di quindici dita, il mezzano di dodici, il piu piccolo di nove. Di quelli per le donne il maggior sia di nove, il minor di sei. Bi-

*Celso Volg. Tom. II.*

**T**

sogna

fogna poi che fiano quelli un poco curvi, ma piu quelli da uomini, e molto ben li. fci ne troppo groffi, ne troppo sottili. Si ponga poi l'infermo fupino come nella cura dell'ano, e fi facci federe o fopra una fcranna, o fopra del letto. Il medico poi deve dal fianco dextro co la finiftra mano tener il membro, e co la dextra intrometter la fifiola nel canal dell'orina, e giunto che fi è al collo della vefciça abbaffando la fifiola, e il membro infieme deve fpingerla dentro le vefciça, e dopo orinato ritirarla fuori. La femina fimilmente ha il canal dell'orina piu corto, e piu dritto, il qual fatto a fimilitudine d'una mammelletta pofto fopra la natura fra gl' infimi orli non meno bene fpeffo ricerca fimile ajuto, ma contiene in fe minor difficoltà.

Ta volta anche caduto nella fifiola orinaria il calcolo, la qual fempre piu in quella vien affottigliato, non molto lontano dall'ufcita fi ferma. Quello fe è poffibile bifogna tirar fuora o co la firinga, o collo fpecillo auricolare o con quel ferro che fi tira fuora il calcolo quando fi fa il taglio. Se cio non fi puo fare fi tiri a fe molto l'eftremità della cure, e ripofta dentro la ghianda fi legghi con un filo. Indi per fianco convien tagliar per dritto il membro, e cavar fuora il calcolo, dipoi fi lafcia andare la pelle. Stanteche così fegue che la  
parte

parte sana della cute copra il membro tagliato, e la orina venga fuora naturalmente.

2. *Cura de' travagliati da Calcoli.*

Ma essendosi fatta menzione della vescica, e de' calcoli, pare che 'l luogo stesso richieda, ch'io soggiunga, qual sia l'operazione, che si usa a' molestati da calcoli, quando in altra guisa non vi si puo rimediare. Alla quale non conviene in alcun modo affrettarsi essendo cosa precipitosa, ne cio deve tentarsi in ogni età, ne in ogni tempo, ne in ogni male, ma solo nella Primavera in quel corpo che abbia gia nove anni, e non per anco abbia trapassati li quattordici, e se il male è così grande, che non possa esser guarito con medicamenti, ne si possa sfuggire che dentro qualche spazio di tempo uccida. Non perche non giovi talvolta anche il rimedio temerario, ma perche per lo piu principalmente in questo, sia fallace, nel quale si ritrovano e piu sorte, e piu tempi del pericolo, de'quali dirò insieme co la cura medesima.

Stabilito dunque che si è di far ogni tentativo, convien prima per alquanti giorni preparare il corpo colla maniera di vivere facendo che si cibi poco, mangi vivande sane non viscose, e beva acqua. Frattanto si serva dell'esercizio del camminare, accio tanto piu il calcolo vada scendendo al collo della vescica. Il che se sia seguito sentesi an-

che con mettervi le dita, come dirò nella cura. Conosciuta per vera tal cosa, nel giorno avanti si facci quel fanciullo digiunare, e poi in luogo caldo si facci l'operazione, la quale si fa con quest'ordine: Una persona gagliarda, e pratica si pone a sedere sopra un'alta sedia, 'e tiene quello uomo supino, e contro di se, poste le di lui cosce sopra le sue ginocchia, e allargate le gambe di esso gli comandi che postesi le mani alle sue ginocchia, le tiri piu che puo., e nel tempo stesso ancor esso in tal guisa le tenga. Che se il corpo del paziente è piu robusto congiunte insieme due sedie vi stiano sopra due gagliardi, dal che tanto le sedie, come le gambe interne vengano così legate insieme, che non possino allargarsi. Allora si colloca il paziente nel modo stesso sopra le ginocchia di due, e un di questi secondo che s'è posto a sedere tiene la di lui sinistra gamba, l'altro la destra, ed esso parimente tira le sue ginocchia. E sieno uno, o due coloro che lo tengono, si appoggiano con i suoi petti sopra le di lui spalle. Dalle quali cose ne risulta, che fra gl'Ilii quel seno ch'è sopra il pube venga bene steso senza crespe, e ridottasi in poco luogo la vescica piu facilmente si possa prendere il calcolo. Oltre cio davvantaggio si pongono per fianco due altri uomini gagliardi, i quali stando,

do intorno non lasciano che uno, o tutti e due coloro che tengono il fanciullo venghino alzati.

Indi il medico tagliatesi con diligenza l'unghie si ponga a sedere, e della mano sinistra due suoi diti l'indice ed il medio untì di olio prima leggiermente uno, e poi l'altro mette dentro l'ano di quello, e pone leggiermente le dita della mano destra sul fondo dell'Addomine, accio che se da amandue le parti le dita spingeranno con forza il calcolo, non vengano ad offendere la vescica. Non però in tal cura convien oprar in fretta, come nella maggior parte dell'altre, ma in tal modo che segua co la maggior sicurezza possibile. Essendoche la vescica offesa ne cagiona convulsioni di nervi con pericolo di morte. Ed in primo luogo si cerca il calcolo intorno il collo della vescica; ritrovato che s'è in quella parte piu facilmente si tira fuori. E perciò dissi, non doverfi intraprendere nemmen la cura, se non si è questo ben conosciuto da'suoi contrasegni. Se poi in quella parte non si ritrova, ovvero s'è ritirato indietro, si spinghino le dita verso il fondo della vescica, e parimente la mano destra di chi opera trasportata avanti lo vada seguendo.

E ritrovatosi il calcolo, che per necessità dee venir fra le mani, con tanto maggior diligenza tirasi fuori quanto è minore,



re, e piu liscio; accio non esca dalle mani, val a dire affine non s'abbia da travagliare tante volte la vescica.

Sotto il calcolo dunque gli s'opponne sempre la man destra, e le dita della sinistra lo spingono all'ingiu fintantoche s'è giunto al collo, nel quale se la pietra è lunga, vi si spinga in modo che esca cola punta avanti, se è piana in guisa che n'esca per traverso, se quadra, talmenteche con due angoli posi, se da una parte è piu grossa, in modo che scampi fuora prima la parte piu sottile; In quella ch'è rotonda non vi puo esser differenza nella figura, se non è piu liscia da una parte, e allor da quella vada avanti.

Giunto che si è a tal segno devesi far il taglio sopra il collo della vescica accanto l'ano con taglio semicircolare fin al collo della vescica, con i lati rivolti un poco verso le cosce, dappoi da quella parte, che il fondo del taglio è piu stretto, ancor sotto la cute si deve far un altro taglio attraverso, dal quale venga aperto il collo della vescica, finche si scopra il canal dell'orina, talmenteche il taglio sia alquanto maggiore della pietra. Stanteche coloro che per tema di non offender quel canale ( che in detto luogo i Greci chiamano *Uriade spuada* ) poco allargani, con maggior pericolo bisogna che ritornino a far lo stesso, attesoche la pietra si fa la strada, quando si tira fuora per forza, se  
non

non la riceve fatta. E questo ancor è più dannoso se v'ha qualche parte la figura della pietra, o la ruvidezza. Dal che ne può seguire profusione di sangue, e distenzione de' nervi, i quali mali se alcuno scamperà averà però molto più largo il canal dell' orina, se sarà strappato il collo della vescica, di quello che avrebbe avuto se si fosse tagliata.

Quando poi si è aperta fassi vedere la pietra, nel corpo della quale non è differenza veruna. Se quella è piccola da una parte si spinga co le dita, dall'altra si può tirar a se. S'è grande vi s'attacchi dalla parte superiore di quella l' oncinio fatto a quell'effetto. Questo è nell'estremità sottile in figura semicircolare di larghezza retusa, dalla parte di fuori. (Altri leggono anteriore, o posteriore) dove tocca il corpo sia liscio, dalla parte di dentro ruvido per dove deve attaccare alla pietra, e questo deve piuttosto esser lungo, che corto; perchè il corto non ha forza d' attrarre. Quando poi s'è messo dentro si deve piegare nell'uno; e l'altro lato, accio si prenda la pietra, e ne venga tenuta, perchè se quella s'è presa s'inchina parimente ancor esso con molta cautela, accio essendosi cominciato a trar a se l' oncinio, la pietra non fugga dentro, l' oncinio batta ne gli orli del ta-

glio, e lo laceri, nel che qual pericolo vi sia si è detto di sopra.

Quando ben si è veduto che s'è afferrata la pietra, quasi nel tempo stesso si fanno tre sorte di moto, nell'un e l'altro lato, e per l'infuori, talmente però che si faccia questo lentamente, e prima si tiri a se un poco la pietra, e fatto cio si alzi l'estremità dell' oncinò, affine vi stia più indentro, e con più facilità la tiri fuori. Che se talvolta dalla parte di sopra la pietra con difficoltà si afferra, si doverà prendere per fianco: Questa è l'operazione più ordinaria.

Ma la varietà delle cose ricerca di vantaggio alcune considerazioni. Imperocchè ritrovansi alcune pietre non solo ruvide, ma ancora spinose, le quali cadute da se nel collo della vescica senza pericolo alcuno si tiran fuori; nella vescica poi o non si cercano queste con sicurezza, o non si attraggono, stante che come anno lacerata quella, dopo la convulsione de' nervi accelerano la morte, e molto più se qualche spina si è attaccata alla vescica, e nell'esser tirata, ha quella increspata. Comprende si poi esser il calcolo nel collo della vescica, quando con difficoltà s'orina, e che quello sia spinoso si comprende quando l'orina è sanguigna, e questo pure deve si provare co le dita, ne si deve venir all'operazione.

razione, se prima cio non siasi conosciuto per certo. Ed allora parimente si opponghino per di dentro due dita belbello, accio movendoli con impeto non cagionino lacerazione; indi si venga al taglio. Molti anche in questa parte si sono serviti della lancetta.

Megete perche questa ha poca forza, e puo in qualche prominenza tagliare, e tagliato sopra quella il corpo, per dove è la cavità non tagliare, ma lasciarvi quel che di nuovo convenga ritagliare, fece una orte di ferro dritto nella sommità con labbri, nel fondo in figura semicircolare, e tagliente, il qual preso fra le due dita indice, e medio col ponervi sopra il pollice l'abbassava, inguisa che insieme co la carne tagliasse anche cio che avanzasse dal calcolo. Dal che ne seguiva, che in una sola volta apriva quanto bisognava. In qualunque modo poi il collo della vescica in quella parte si è aperto leggiermente deve tirarsi fuori quel ch'è ruvido, senza usar violenza veruna per la fretta.

### 3. *Segni de' calcoli, o arenosi, o lisci.*

Il calcolo arenoso si prima conoscesi, attesoche anche l'orina che si rende, si è arenosa, come pure nello stesso atto di curare, avvegnache sotto le dita non tanto bene si fugga, ma piu lentamente e d'avvantaggio fa resistenza. Parimente il calcolo

lo

lo morvido vien stimato esser composto di piu d'uno, e minuti, ma fra loro poco uniti, e stacca da se come certe squamulette. Tutti questi mutando pian piano avicenda le dita bisogna tirar fuori in modo che non offendo la vescica, e che non vi rimanghino dentro avanzi alcuni sparsi, quali dappoi rendono la cura difficile. Qualunque poi di queste cose si giugne a vedere o col dito, o coll' oncinio devesi trar fuori.

Che se i calcoli sono piu ad uno ad uno si tirin fuori in modo però che se ne resta veruno de'piccoli piu tosto vi si lasci dentro. Poiche nella vescica con difficoltà si trova, e ritrovato presto si smarrisce, perciò da un lungo ricercamento vien offesa la vescica, e ne cagiona infiammazioni mortali, talmenteche alcuni non tagliati essendo stata a lungo, ed in vano travagliata la vescica cole dita, se ne sono morti. Al che s'aggiugne di piu che il calcolo piccolo gettalo dopo di per se l'orina verso 'l taglio, e se n'usce.

Se talora poi essendo quello grosso non parrà che possa venir fuori senza strappar il collo della vescica, si deve quello spezzare. Della qual cosa essendo l'inventore Ammonio per questo fu cognominato litotomo. Cio farsi in questa guisa. S'attacca l'uncino al calcolo in guisa, che lo tenga forte con facilità anche se venga scosso, ac-  
ciò

ciò non rigiri addietro . Allora pigliafi un ferro di mediocre grossezza dalla parte d'avanti sottile , ma ottuso, il qual accostato al calcolo, e percuotendolo da una parte lo spezza . Osservando con diligenza di non arrivare col ferro alla vescica , o che la schiegga del calcolo tagli parte alcuna .

4. *De' Calcoli delle Donne.*

Queste operazioni sono parimente simili nelle donne, nelle quali però conviene che dichiariamo alcune cose particolari. Essendo che in queste quando il calcolo è piccolo non vi abbisogna la lancetta, perchè l'orina lo spinge verso il collo della vescica, il quale ed è piu corto, che ne' maschi, e piu largo. Pertanto spesso di per se esce, e si ferma se è nel canal dell'orina che è piu stretto, si tira fuori però col medesimo oncinio senz'alcun nocumento. Ma ne' calcoli grossi è necessaria la stessa operazione. Devono però ad una fanciulla ponerfi di sotto le dita come ai maschi, ed alla Donna per la natura. Di piu alla fanciulla sotto il fondo del lato sinistro, alla donna devesi far il taglio fra'l canal dell'orina, e l'osso del pubè talmente che nell'un'e l'altro luogo sia un taglio attraverso, ne metta spavento se fluisce il sangue in copia maggiore da una donna.

5. *Qual cura debba usarsi cavata la pietra.*

Cavata la pietra se il corpo è robusto, ne molto travagliato bisogna lasciar uscir il  
 fan-

sangue, accio che si faccia minore l'inflam-  
mazione. E non è anche disconveniente che  
quello cammini un poco, accio esca se vi è  
rimasto dentro sangue accagliato. Che se  
quello di per se non cessa, accio di nuovo non  
si perdino affatto le forze devesi stagnare. E  
cio ne' piu deboli convien farsi subito dopo  
la operazione. Attesoche siccome si corre ri-  
ficio della distensione de' nervi mentre vien  
troppo maneggiata la vescica, così ne segue  
altro pericolo, se non si applicano medica-  
menti, che n'esca tanto sangue che uccida.  
Il che accio non segua dee colui sedere in  
aceto forte, al quale sia aggiunto un poco di  
sale. Co la qual cosa per ordinario si sta-  
gna il sangue, e si costringe la vescica, e  
perciò meno s'infiama. Il che se poco gio-  
va si attacchi una coppetta agl'inguini, e al-  
le cosce, e sopra il pube. Quando del san-  
gue se n'è lasciato uscire abbastanza, o si è  
stagnato, devesi poner supino in modo che  
il capo ne stia basso, le cosce alquanto al-  
te, e sopra il taglio devesi poner una pez-  
zetta di lino a due, o tre doppi bagnata  
d'aceto. Dappoi passate due ore si collochi  
supino in bagno d'acqua calda talmente che  
l'acqua le giunga dalle ginocchia all' om-  
belico, e l'altre parte siano ricoperte con  
panni, co le mani solo e piedi nudi, accio  
e meno si digerisca, e si trattenga ivi piu  
a lungo. Dalla qual cosa ne suole venire  
copio.

CAPO VENTESIMO SESTO. 291

copioso sudore, lo qual conviene di quando in quando asciugare nella di lui faccia con una spugna, e li dà fine a simil fomento, quando co l'indebolire n'offende. Indi si unga quell'uomo con molto olio, e vi si ponga un panno di morvida lana, il quale ricopra il pube, le cosce, e l'inguini, e l'istesso taglio, inzuppato di olio tiepido, essendovi però sotto la stessa pezzetta, e si rinfreschi quella di quando in quando con l'oglio tiepido, accio non lasci penetrar il freddo alla vescica, e mollichichi piacevolmente i nervi. Si servono alcuni di cataplasmi calefacienti. Questi apportano piu di nocumento col peso (perche premendo la vescica irritano la ferita) di quel che giovino col caldo. A questo effetto dunque non è necessaria neppur alcuna fasciatura.

Il giorno dopo se si respira con difficoltà, se non vien fuori l'orina, se la parte intorno il pube è presto gonfiata, convien sapere esser rimasto nella vescica sangue accagliato. Intromessi dunque nello stesso modo i diti leggiermente si deve maneggiar la vescica, e scuotere se vi s'è radunata cosa veruna, dal che segue che n'escano poi per la ferita. Non è anche fuor di ragione spingere nella vescica co lo schizzetto per il taglio aceto mescolato con nitro. Imperocche così sciogliesi, e togliesi via se s'è fatta radunanza di sangue. E ciò  
con-



convien farsi ancora nel primo giorno. Se temiamo, che non vi sia rimasta dentro qualcosa, e principalmente quando non s'è potuto per la debolezza gettar fuori col camminare, si facciano le stesse cose dette di sopra: che si metta nel bagno, che vi s'applichino nello stesso modo la pezzetta, e sopra lo stesso panno di lana.

Ma ne così spesso, ne così a lungo si tenga nell'acqua calda un fanciullo, che un giovine, un debole d'un gagliardo, colui che leggermente è infiammato di chi si è molto, colui il di cui corpo si consuma, di chi lo ha più saldo. Frattanto se n'è il sonno, il respiro uguale, la lingua umida, poca sete, il ventre non gonfio, e poco dolor con piccola febbre può comprendersi camminar bene la cura.

E in questi l'infiammazione ordinariamente nel quinto, o settimo giorno ha fine. La qual terminata non occorre più il bagno. Solamente stando egli supino gli si lavi la ferita co' l'acqua calda, accio se qualche poco d'orina la corrode, si venga quella a lavare. Vi s'applichino poi medicamenti che suppurino, e se parrà l'ulcere da purgarsi si unga con miele. Se questo rode si mescoli con rosa. A questo pare atto l'empiaastro enneafarmaco, essendo che contiene secco per suppurare, e miele per purgar l'ulcere, ed il midollo principalmente di vitel.

vitella molto giova accio in essa non rimanga la fistola.

Le taffe poi sopra l'ulcere non sono necessarie, si pongono bensì sopra'l medicamento per tener fermo quello. Ma purgata la piaga, co la pura talta si cicatrizzi.

Ne'quali tempi però se la cura non andò felicemente ne sorgono varj pericoli, i quali possono subito predirsi se non si dorme, se si respira con difficoltà, se la lingua è arsiccia, se v'è gran sete, se il fondo del ventre è gonfiato, se la ferita è aperta, se l'orina nel passare non cagiona prudere in quella, se similmente prima del terzo giorno esce roba livida, se quello o niente, o tardi risponde, se i dolori sono gagliardi, se dopo il quinto giorno vi sono gran febbri, e dura la nausea, e se si sente gusto maggiore nel posare sul ventre. Non vi è però peggior segno della convulsion de' nervi, e del vomito bilioso avanti li nove giorni. Ma essendovi timore d'inflammazione bisogna provedervi co l'astinenza, con cibo temperato, e dato a'suoi tempi, e frattanto co fomenti, de' quali si è detto di sopra.

*CAPO VENTESIMO SETTIMO. 305*

e più sano. Dappoi quando si è giunto alla cura si ponerà l'infermo nell'acqua, in cui sia cotto marrubio, o cipresso, o mortella, e l'istesso umore vi si schizzi dentro collo schizzetto, poi vi si ponerà sopra lenticchia con malicorio, le quali due cose siano cotte in vino, o pure foglie di rovo, o di olivo cotte nella stessa maniera, e altri medicamenti, che ad impedire, e purgar i cancheri ho proposti, fra quali se alcuni saranno secchi vi si soffieranno dentro per un cannello di penna da scrivere.

Fermato che sarà il cancro laverassi la ferita con mulso, e si fuggirà per allora il cerotto, che per questo male amollisce il corpo piuttosto si ungerà con piombo lavato, e vino insieme, e sopra vi s' applicherà una pezzetta empiastata co l'istesso. Co le quali cose puo risanare, con questo però, che sappiamo che fatto il cancro spesso ne patisce lo stomaco, il quale ha cola vescica una certa connessione, e che da quello ne segue che non si ritenga il cibo, ne se si ritiene, esso si concuoca, ne si nodrisca il corpo, e per tanto ne menò la ferita o si possa purgare, o nutrire, il che per necessità accelera la morte.

Ma siccome a tali cose non si puo in modo veruno rimediare così fino dal primo giorno si tenga la regola della cura. Nella quale è necessaria una certa osservazione apparten-

nente al cibo, e alla bevanda. Stante che'l cibo su principj non convien darli se non umido. Purgato l'ulcere sia di mezzana qualità: i legumi, e i salumi sono sempre contrarj. Convien bere ne poco, ne troppo, essendochè se poco bevesi si accende la ferita, e non si dorme, ed il vigore del corpo vien meno. Se si beve piu del dovere si riempie la vescica, e ne vien stimolata; che non si debba poi bever altro che acqua è tanto chiaro, che non occorre ad ogni poco replicarlo.

Suol però accadere con simil vitto, che non sia lubrico il corpo. Questo movasi con acqua nella quale sia cotto fien greco, o malva, lo stesso liquore mescolato con rosa deve spingersi nell'istessa ferita per mezzo dello schizzetto quando l'orina rode quella, ne la lascia purgare.

Ma per ordinario sul principio l'orina esce per il taglio poi risanando questo si divide, e parte incomincia a scendere, per la verga finche il taglio del tutto si riserri; il che talor segue in tre mesi, alle volte prima di sei, alle volte anche dopo compiuto un anno.

Ne deve disperarsi l'intera saldatura della ferita, se non quando o grandemente è strappato il collo della vescica, o dal Cancro molti, e grandi pezzetti di carne, e insieme particelle nervose vengono fuori.

Ma

Ma bisogna con gran diligenza prevedere, o che non vi rimanga veruna fistola, o molto piccola almeno. Dunque quando la ferita si avvicina a cicatrizzarsi convien posare colle cosce, e gambe distese, se però non saranno stati calcoli facili a rompersi e arenosi, poichè se vi son questi si purga la vescica più tardi, e perciò è necessario che la ferita resti aperta più a lungo, e allora finalmente dovrà serrarsi, quando già non vien più fuori alcuna cosa.

Che se si ferra il taglio prima che sia purgata la vescica, ed è ritornato il dolore, e l'infiammazione si allarghi, o co' le dita, o co' la tenta la piaga per dar l'uscita a chi dentro tormenta, e gettate fuori quelle cose, allora finalmente ne venga pura l'orina. In ultimo luogo si applichino cose che saldino, e si stendino, come dissi di sopra i piedi più che si può stretti.

Che se da queste cagioni, Che ho dette parrà che vi sia sospetto di fistola, accio più facilmente cotesta si ferri, o almen si restringa, convien poner nell' ano anche un cannello di piombo, e allungate le gambe si leghino le cosce, e i piedi insieme finche la cicatrice sia come una cucitura.

*Se le parti naturali delle Donne non ammettono il concubito come si curino.*

**E** Questo può esser comune a maschi, e alle femmine. Alcune cose però appartengono propriamente alle donne, come in specie che talvolta le parti naturali di quelle avendo i labbri attaccati insieme non ammettono il concubito. E ciò talor accade fin nel ventre della madre, talor per l'esculcerazione fatta in quella parte, ed essendosi per la mala cura attaccati insieme quegli orli nel risanare. Se è fin dalla nascita, sta opposta all'orifizio della natura una membrana, se dall'ulcere la carne ha riempito quella.

La membrana bisogna tagliarla in due linee trasverse a similitudine della lettera X usando gran diligenza di non offendere il canal dell'orina. Dipoi convien levar via del tutto quella membrana; che se vi è cresciuta la carne è necessità di aprirla per linea retta, poi afferratola dalle bande o co la molletta, o co l'amo tagliarla come in striscia, e dentro cacciarvi per lunghezza una tasta attortigliata detta da Greci lemniscon λιμνισκον, intinta in aceto, e sopra legarvi lana fucida bagnata di aceto, nel terzo giorno sciolgasi la piaga,

ga, e si curi come le altre ulceri. E quando già comincerà a risanare, bisogna ungere con medicamenti da cicatrizzare un canello di piombo, e ponervelo dentro. E sopra applicarvi lo stesso medicamento finchè si saldi la piaga.

## C A P O XXIX.

*Come si cavi il feto morto dall'utero.*

**Q**Uando alcuna ha concepito, se il feto quasi maturo è dentro morto, non di per se può venir fuori, convien usarvi la cura, che può riporsi nel numero delle più difficili. Essendo che ricerca somma prudenza, e pazienza, ed è molto pericolosa. Ma più d'ogni cosa la mirabile struttura dell'utero si in altre, come in questa cosa principalmente può con facilità conoscersi.

Bisogna pertanto fare star quella donna supina attraverso al letto in modo che le sue cosce premino i suoi fianchi. Onde ne segue che il fondo del ventre si faccia vedere al medico, e il feto ne venga spinto alla bocca dell'utero, che essendo il parto morto tien quella serrata, ogni tratto però suol aprirsi. Servitosi il medico di questa congiuntura untasi la mano prima deve metter dentro il dito indice e tenerlo

fermo finche di nuovo s'apra l'utero, e di nuovo vi dovrà intrametter l'altro dito, e l'altre volte gli altri finche vi sia dentro tutta la mano. Per poter far bene la qual cosa molto ajuta la grandezza dell'utero, e la robustezza de' nervi di quello, e il buon abito di tutto il corpo, ed anche la forza d'animo particolarmente dovendovisi talor metter amendue le mani.

Importa altresì che sia ben caldo il ventre inferiore, e l'estremità del corpo, e che non per anco abbia principiato l'infiammazione ma subito essendo la cosa ancor fresca bisogna rimediarvi, stante che se già il corpo è gonfiato ne vi si può intrametter la mano, ne tirar fuori il bambino se non con somma difficoltà, e ne segue bene spesso con vomito, e tremore una mortal distensione de' nervi. Ma toccando il corpo morto co la mano subito si sente la di lui positura. Atteso che o quello è rivolto col capo, o co' piedi, o sta traverso, ordinariamente però in guisa che si ritrova vicina, o una mano, od un piede.

L'intenzione però del medico deve essere d'indirizzarlo co la mano, o verso il capo, o pur verso i piedi. Se a caso è in altra positura, e se non si possa far altro, col pigliarli una mano, o un piede gli si renda piu dritto il corpo, perche la mano lo tirerà verso il capo, il piede verso i piedi.



## CAPO VENTESIMO SETTIMO. 311

di. Indi se si trova in vicinanza il capo de  
ve intrometterfi un oncinio da ogni banda li-  
scio di amo corto, il quale si attacca o ad un  
occhio, o ad un orecchio, talvolta anche al-  
la fronte, poi tirato quello a se tira fuori il  
bambino, ne perciò questo deve tirarsi in o-  
gni tempo, perche se si tenta far cio quando  
è serrata la bocca dell'utero senza che quel-  
lo venga fuori si strappa il feto, e la pun-  
ta dell'uncino scappa nell'orifizio dell'utero,  
e ne segue la distenzione de'nervi, e gran  
pericolo di morte. Dunque mentre l'utero  
è serrato bisogna star fermo, quando è a-  
perto, convien leggermente tirar a se, e appo-  
co appoco in queste congiunture di tempo  
cavar quello. Bisogna però co la mano destra  
attrarre l'uncino, co la sinistra posta dentro  
tirar il feto, e nello stesso tempo addirizzarlo.

Suol'altresi accadere, che quel bambino  
si disfaccia in umore, e da quello esca mar-  
cia di cattivo odore. Se cio avviene si fori  
quel corpo col dito indice, accio gettato fuo-  
ra l'umore si venga ad affottigliare. Dappoi  
bel bello si prenda quello nelle mani, stan-  
teche l'uncino attaccato a quel tenero cor-  
picciuolo facilmente si staccherà; nel che,  
qual pericolo sia, si è detto di sopra.

Il bambino poi anche rivolto co' piedi fa-  
cilmente si estrae, perche presi quelli como-  
damente co le mani cavali. Se poi è attra-  
verso, ne si puo addirizaare si attacchi l'on-

vino al fianco sotto le spalle, ed appoco appoco si attragga. Nel che per ordinario il collo si ripiega, e il capo e l' resto del corpo si rivolta addietro. Il rimedio è tagliare il collo, accio separatamente l'una e l'altra parte si cavi. Cio farsi con un oncinio, che simile al primo è tagliente solamente verso la parte di dentro lungo tutto il taglio. Indi si procuri di levar prima il capo, dappoi il resto, perche per ordinario cavata la parte maggiore, ne cade il capo nella parte dell' Utero vuota, e non si può estrarre senza gran pericolo.

Se però questo sarà seguito, sopra l' ventre della donna postovi un panno adoppio, un uomo gagliardo, e pratico deve assistere dal sinistro fianco di quella, e sopra l' infimo ventre ponervi amendue le mani, e con una calcar l'altra. Dal che segue, che quella resta venga spinta all' orifizio dell' utero, o questa nello stesso modo detto di sopra tirasi fuori co l' oncinio.

Ma se un piede si è ritrovato ivi accanto, l' altro è piu indietro col resto del corpo, cio che prima si è tirato, deve si appoco appoco tagliare, e se la schiena del feto preme la bocca dell' utero di nuovo si rigetti, e ricercata la gamba di quello si tiri a se. Ed altre difficoltà parimente fanno, che quello che non esce intiero, debba cavar si tagliato in pezzi.

Ogni

Ogni volta che poi s'è ritrovato il feto diasi nelle mani del ministro, e questo deve tenerlo co le mani all'insù, e il medico poi leggiermente co la mano sinistra tiri l'ombelico in guisa che non si strappi, e co la mano destra seguirarlo fino alle seconde, che sono l'invoglio del bambino quando vi è dentro, e prese in ultimo luogo quelle staccar nello stesso modo co la mano dall'utero tutte le venucole, e membrauette, e tirarlo fuori tutto; come ancora se v'è rimasto sangue accagliato dentro. Dipoi serrate insieme le cosce, si ponga la donna in una camera, che abbia caldo temperato senza vento. Sopra l'infimo ventre di quella si applichi lana lucida intinta in aceto rosato. Il rimanente della cura deve esser tale, quale s'è posta nell'inflammazioni ed in quelle ferite, che sono nelle parti nervose.

## C A P O XXX.

*De' mali Dell' Ano e loro cura.*

**I** Mali ancora dell' Ano quando non vengono sanati con li medicamenti ricercano l'operazione della mano. Pertanto se alcune fissure invecchiando diventano in quello dure, e già sono incallite, il meglio si è mover il ventre, poi applicarvi una spugna calda accio quelle venghino fuori, e si allentino. Quando si vedono convien ta-

gliar

gliar quelle ad una ad una co' la lancetta; e rinuovar l'ulcere, poi ponervi sopra una morvida tasta, e sopra una pezzetta empiastata di miele, e riempire quella parte di lana morvida, e in tal guisa fasciarla il giorno seguente, e indi a poi usare gli altri medicamenti lenitivi, che altrove ho detto esser necessarij a simili mali freschi, e bisogna su primi giorni mantener l'infermo con brodetti, e poi appoco appoco aggiugner qualcosa al vitto di quella sorte però che si è detto nello stesso luogo. Se talvolta poi per l'infiammazione si genera in queste marcia, subito che questa apparisce si venga al taglio, accio non marcisca lo stesso ano. Ne però si usi troppa fretta, perche se si taglia crudo si fa grand' infiammazione, e si cagiona alquanto piu di marcia. A queste ferite parimente bisognano cibi lenitivi, e medicamenti simili.

## 2. Della cura de' Condilomi.

Quei tumoretti poi che chiamano i Greci *Condilomi*, induriti che sono, in questa guisa si curano; prima d'ogni cosa si muove il ventre, poi preso il tumoretto co' le mollette tagliasi accanto le radici. Il che quando è fatto ne seguono le stesse cose, che ho proposte di sopra doverfi fare dopo la cura. Solamente se si fa qualche escrescenza si raffreni co' la squama di rame.

## 3. Dell' Entorroida.

E così ancora si toglie il sangue che esce dalle

dalle bocchette delle vene. Quando al sangue, che scaturisce si aggiugne la marcia, movefi piu gagliardamente il ventre, accio tanto piu vengano in fuora gli orli dell'intestino, e fatti a tal fine che si rendino visibili que' capetti. Indi se quel capetto è piccolo, e ha la base sottile si leghi con un filo un poco piu sopra di dove sta attaccato all'ano, e vi si ponga sopra con una sponga acqua calda, finche divenga livido, poi co' le unghie, o co' la lancetta sopra il nodo si esulceri, il che se non si fa, ne seguono gran dolori, e alle volte ancora difficoltà d'orinare. Se quello è alquanto piu grande, e la di lui base piu larga, piglisi con un o due piccoli ami, ed un poco sopra la base si tagli, ne vi si dee lasciar punto di quel capetto, ne togliersi via dell'Ano, il che otterrà chi non tirerà gli ami ne troppo, ne poco. Per dove è tagliato bisogna farvi passare un ago, e sotto questo stringer quel capetto con un filo, se sono due, o tre di man in mano quel ch'è piu basso deve esser il primo curato. Se sono piu non tutti insieme, accio che nello stesso tempo in piu luoghi siano tenere cicatrici. Se scaturisce sangue si riceva con una sponga, e poi vi si metta la tasta. Si unghino le cosce, e gl'inguini, e le parti accanto la piaga, e vi si applichi il cerotto. S'empia quella parte di  
farina

farina d'orzo calda, ed in tal guisa si fasci. Il giorno seguente deve quello star a sedere nell'acqua calda, e fomentarsi co lo stesso cataplasma. E due volte il giorno tanto avanti l'operazione come dopo di quella convien ungere con cerotto liquido; cossendoci, e le parti interne delle cosce, e quell'uomo si tenga in luogo tiepido. Dopo cinque, o sei giorni si debbono cavar le taffe co le mollette. Se non saranno caduti insieme con quelle i capetti si levino co le ditte. Fatto cio co medicamenti lenitivi e con quegli istessi, che ho posti altrove si risanino l'ulceri. Guarito il male, come convenga operare già altrove da me di sopra si è detto,

### C A P O XXXI.

#### *Della cura delle Varici.*

**D**A queste cose ne segue che facciamo passaggio alle gambe, nelle quali essendo nate le varici facilmente si levano. Ma in questo luogo ho differita la cura di quelle venucole, che travagliano il capo, e di quelle varici, che si ritrovano nel ventre, perche in qualsivoglia parte è la stessa. Pertanto ogni vena, che apporta nocumento, o si risicca con scottarla, o si leva co la mano. Se quella è dritta, se quantunque traversa nondimeno è semplice, se è piccola, meglio è scottarla. Se è curva,

va, ed è attortigliata quasi in certi giri, e più d'una si attortigliano insieme, è più spedito trarle via co' la mano.

Il modo di scottarle è questo. Si taglia per di sopra la cute, allora scoperta la vena con un ferro sottile, ed ottuso infocato leggermente si calca, e si guarda di non scottare gli orli dell'istesso taglio, i quali facilmente si possono tirare indietro con gli oncinetti. E ciò farsi per tutta la varice quasi ogni quattro dita, poi vi s'impone il medicamento che risana le scottature.

Si tagliano poi in questo modo. Tagliata la pelle nell'istessa guisa sopra la vena, si allargano i lati di quella con l'uncinetto, e con la lancetta si stacca da ogni banda dal corpo la vena, e si osserva che in questo mentre non ne venga essa forata, e le si pone sotto l'amo ottuso e frapposto quasi lo spazio che si è detto di sopra nella stessa vena farsi lo stesso, la quale dove si porti facilmente si conosce con stirar l'amo.

Fatto lo stesso per tutto dove sono le varici in un luogo tirata a se con l'uncinetto la vena si taglia, e poi dove si trova l'altro amo più vicino tirasi a se, e si svelge, e ivi di nuovo tagliasi. E così liberata la gamba dalle varici in ogni parte si uniscono le parti de' tagli, e vi si applica sopra empiaastro agglutinante.

*Cura delle Dita attaccate, e incurvate.*

**M**A se le dita, o subito nel ventre della madre, o dappoi per la loro comune esulcerazione si sono attaccate, si separano co la lancetta, indi separatamente l'un e l'altro cingesi con empiastro non grasso, e così l'un e l'altro di per se risana.

Se poi si esulcera il dito, e dopo la cicatrice mal formata lo rende curvo, in primo luogo si provi un malamma, indi se questo niente giova ( il che suole accadere nella cicatrice invecchiata, e quando i nervi sono offesi ) bisogna osservare se cio sia difetto del nervo, o della cute. Se è del nervo non deve toccarsi, perche non è sanabile. Se è difetto della cute si tagli tutta la cicatrice, che essendo per ordinario callosa, fa che non lascia stender il dito, poi si riconduca dritto a nuova cicatrice.

## C A P O XXXIII.

*Della cura della Gangrena.*

**G**ia altrove da me si è detto farsi la Gangrena fra l'unghie, sotto le spalle, o fra gl'inguini, e se ne vengono superati



**C APO TRENTESIMO TERZO. 319**

perati i medicamenti doverfi anco tagliar la parte.

Ma questo ancora fassi con grandissimo pericolo. Stante che spesso nella stessa operazione o per la profusione del sangue, o per la mancanza delle forze muojono. Ma in questo caso niente importa cercare, se sia sicuro quel rimedio, che unico ritrovasi. Convien dunque tagliar co la lancetta la carne fin all'osso tra la parte sana, e la parte viziata in modo che non si faccia questo di contra l'articolo, e piuttosto si tolga qualche poco della parte sana, che lasciarvi dell'infetta. Giunto che si è all'osso si separi da quello la carne sana, ed intorno l'osso si tagli, accio in quella parte ancora alquanto si scopra l'osso, poi quello co la seghetta si seghi piu vicino che sia possibile alla carne sana, anche a quella che vi è attaccata, e allora la faccia dell'osso che ha lasciata ruvida la sega, rendasi liscia, e sopra vi si ponga la cute, che in tal cura deve esser larga, accio ricuopra l'osso da ogni banda. Dove non si sarà stesa la pelle si opra con taffe, e vi si legghi sopra una sponga bagnata in aceto. Il resto si operi come si è comandato in quelle ferite, nelle quali forse non si deve promuover la marcia.

*Fine del libro Settima.*

**LI.**

# LIBRO OTTAVO

## C A P O P R I M O.

*Del Sito, e della figura delle ossa di tutto il corpo Umano.*

**N**E segue quella parte, che appartiene alle ossa; la quale accio possa piu facilmente intendersi, n' accennerò prima i siti, e le figure di esse. Darò adunque principio dalla Calvaria, che dalla parte di dentro è concava, per di fuori convessa, dall'una e l'altra parte liscia così dove contiene il cervello, come dalla parte, che vien ricoperta dalla catenna, che produce i capelli. Ed essa dalle tempie, e dalla collottola è di un solo pezzo; dalla fronte fin' al vertice di due. Le Ossa di quella per di fuori sono dure; per di dentro dove si uniscono insieme sono piu morvide; E fra quelle scorrono vene, dalle quali è credibile venire alle stesse somministrato l'alimento.

Di rado poi ritrovasi la calvaria d'un pezzo solo senza suture alcune. Ne i paesi però caldi (a) piu facilmente ritrovasi. E questa testa è la piu robusta, e piu sicura dal dolore (b)

fra

(a) come nella Enopia.

(b) cioè procedente da causa esterna, ma piu seposto a i dolori derivati da causa interna.

fra le altre quante minori di numero quelle future siano, tanto piu sana sarà simile testa, essendo che ne se ne puo assegnar determinato numero, ne sito. Ordinariamente però (a) due sopra gli orecchi dividono le tempie dalla parte di sopra del capo, la terza per mezzo il vertice camminando verso gli orecchi divide la collottola della sommità della testa. La quarta dal vertice per mezzo la testa s'incammina verso la fronte, e quella talvolta finisce su la fine de' capelli, talvolta attraversando la stessa fronte ha il suo fine tra le ciglia. Fra queste l'altre future si uniscono insieme come unghie, ma quelle che sono attraverso agli orecchi si vanno assottigliando appoco appoco in tutte l'estremità, e così \* l'ossa di sotto leggermente appoggiano a quelle di sopra. Il piu grosso, e piu sodo osso nella testa è quello dietro l'orecchio, e perciò come è verisimile non vi nascon capelli in simil luogo. Sotto quei muscoli ancora, che ricoprono le tempie è posto l'osso delle mascelle verso la parte interna.

La faccia poi ha una futura grandissima che avendo il suo principio da una tempia traversando per mezzo agli occhi, e al na-

*Celso Volg. Tom. II. lib. XI. c. 11. fo.*

(a) Tre proprie. *Lambdoide sagittale e coronale*, e cinque spurie.  
 \* *devesi forse leggere l'ossa di sopra leggermente appoggiano a quelle di sotto.*

fo se ne giugne all' altra tempia . Dalla qual futura ne sono due corte rivolte in giù sotto gli angoli interni . Delle mascelle parimente ciascuna ha nella sommità una futura traversa ; Ed una da mezzo il naso , o mascella de' denti superiori passa per mezzo il palato , e l' altra attraverso sega per mezzo lo stesso palato . E queste sono le future , che nella maggior parte ritrovansi .

De i fori poi che penetrano dentro il capo i piu grandi sono degli occhi , in secondo luogo del naso , poi degli orecchi ; fra questi quei de gli occhi , dritti , e semplici , s' incamminano verso il cervello . I due fori del naso sono divisi da un osso di mezzo . Essendoche questi anno prima principio dalle ciglia , e dagli angoli degli occhi con natura di osso fin quasi ad una terza parte , poi convertiti in cartilagini quanto piu si avvicinano verso la bocca , tanto piu s' ammorvidiscono in qualità di carne tenera . Ma quei fori , che dal fondo alla cima delle narici sono di un solo canale per ciascuno , ivi di nuovo si dividono in due strade , ed altre di queste passando dentro le fauci ricevono , e mandano fuori il fiato , altre penetrano al cervello . E sul terminare si dividono in molti , e piccoli bucarelli , per i quali a noi giugne l' odore . Parimente nell' orecchio quel meato , che sul principio è drit-

to, 30

to, ed unico, nell'avanzarsi divien ritor-  
to. Che pure vicino al cervello in molti e  
sottili fori dividefi per dove ne vien l'udi-  
to, ed accanto ad essi sono quasi due picco-  
lissimi seni, e sopra cotesti ha fine quell'  
osso, che venendo attraverso delle guan-  
cie vien sostenuto dagli ossi di sotto. Puo  
questo chiamarsi *Jugale* da quella simili-  
tudine, che i Greci l'anno nominato *Si-  
zigodes*. La mascella poi è osso morvido,  
ed è sola: di cui la parte di mezzo ed  
infima è il mento, dal quale da amendue  
le parti se ne giugne alle tempie, ed es-  
sa sola si move. Merceche le guancie con  
tutto quell'osso, che contiene i denti di  
sopra sono immobili, ( a ) le estre-  
mità poi della stessa mascella sono quasi  
di due corni. L'altro processo per di den-  
tro piu largo nella cima si assottiglia, ed  
allontanandosi di vantaggio si pone sotto  
l'osso jugale, e sopra questo ne vien col-  
legato da' muscoli temporali. L'altro piu  
corto, e piu tondo, ed in quella cavità,  
che si trova accanto ai fori degli orecchi  
è fatto in similitudine di un Ganghero, e

X 2

gi-

(a) Non solo negli uomini, ma anco nelle be-  
stie la mascella di sopra sta ferma eccetto nel  
crocodillo, il qual move la superiore, e tien fer-  
ma quella di sotto, e il Papagallo che le mo-  
ve tutt'e due insieme, oppur una separatamen-  
te.

girandosi in ogni parte fa che la mascella si possa muovere.

Piu duri de' gli ossi sono i denti, parte de' quali sta attaccata alla mascella, parte all'osso di sopra delle guancie. Di questi i primi quattro di sotto, e quattro di sopra perche recidono furono chiamati da Greci *Tomici*; (a) E questi da ogni parte sono cinti da quattro denti canini. Dopo i quali ordinariamente dall'una, e dall'altra parte (b) sono quattro mascellari di sotto, e quattro di sopra eccetto in quelle persone, nelle quali gli ultimi tre (c) perche sogliono venir tardi non sono anche cresciuti. I primi di questi stanno attaccati con una sola radice per ciascuno, i mascellari con due, e alcuni con tre, e quattro per ciascuno. E per lo piu la radice piu lunga produce il dente piu corto, e del dente dritto è dritta ancor la radice, del torto è torta. E dall' istessa radice ne' fanciulli ne nasce il nuovo dente, che per lo piu caccia il primo, alle volte però si fa vedere di sopra, o sotto di quello.

Al capo poi sta attaccata la spina, la qual è composta di ventiquattro vertebre. sette nel collo, dodici alle coste, l' altre cin-

(a) *Incisorii.*

(b) *Gli altri Anatomici ne pongono cinque per parte.*

(c) *I denti della Sapienza, o del senno.*

cinque vicine alle coste. Sono queste tonde, e corte, e da amendue le parti anmettono due processi. Nel mezzo sono traforate per dove descende la spinal midolla congiunta al cervello, intorno parimente sono con due piccoli fori bucate sotto due processi, per li quali fori si stendono membranette simili alla membrana del cervello, dalla quale derivano. E tutte le vertebre, eccetto le tre ultime, dalla parte di sopra ne gl'istessi processi anno seni che poco allargano, da quella di sotto anno per l'ingiu altri processi. La prima dunque immediatamente sostiene il capo, ricevuti li di lui piccoli processi ne due suoi seni. Onde avviene che il capo ne venga in giu mosso per mezzo di quei canali, e la seconda vertebra entra dentro quella di sopra. In quanto appartiene al giro, la parte di sopra è minore di cerchio di quella di sotto. Pertanto quella di sopra circondata dall'altra lentamente lascia mover il capo anco per fianco: la terza nel modo stesso entra nella seconda, d'onde si puo facilmente mover il collo. E nemmeno potrebbe reggerli il capo se da amendue le parti dritti, e robusti nervi, che i Greci chiamano *Carati*, non tenessero il collo, attesoche uno di questo sempre tirante a tutti li modi di piegare non lascia cader di vantaggio le parti superiori,

e ancor la terza vertebra intromette i suoi processi in quella di sotto. E l'altre pure trapassando all'ingiu i suoi processi entrano dentro quelle di sotto, e per le cavità che fanno dall'una, e dall'altra parte ricevono quelle di sopra, e vengono racchiuse fra molti nervi, e molta cartilagine. E così ad una piccola piegatura fatta al proprio volere, e dritto esercita l'uomo le sue faccende, e piegasi alquanto se 'l bisogno glie ne richiede.

Sotto il collo poi la prima costa è situata dirimpetto agli omeri, poi l'altre undici di sotto giungono fin al fondo del petto, e sono queste nell'estremità rotonde, e con quasi certi piccoli capetti, e stanno attaccate alli processi trasversali delle vertebre, che ivi sono un poco incavati. Si allargano poi, ed incurvatesi per di fuori appoco appoco si convertono in cartilagini. Ed in quella parte di nuovo leggermente piegatesi s'uniscono coll'osso del petto; Il quale duro, e robusto ha il suo principio dalla gola; dall'una, e l'altra banda semicircolare, per di dentro ancor esso si ammorvidisce in \* cartilagine, e termina. Sotto le prime cinque coste poi che chiamano i Greci *Nothas* (a) ne sono altre più corte, e più sottili, ed

\* detta *ensiforme* o *scutiforme*.

(a) *reas* ovvero *nothas*; da latini dette *spuriae*.



ed in esse ancor convertite appoco appoco in cartilagine, sono fisse nell'estremità dell'addomine, e la loro punta non è altro che mera cartilagine. Parimente dal collo due larghi ossi da amendue le parti si portano alle scapole chiamate da' Latini *Scoptula aperta*, da Greci *Omioplate*. Quei nelle lor cime incavate, da ivi in giù triangolari, ed appoco appoco allargandosi vanno verso la spina, e quanto più larghi sono tali ossi in qualche parte, tanto più ivi son deboli. Ed essi pure sul fine sono cartilaginosi, co la parte di dietro quasi nuotano, perche non sono attaccati ad osso veruno, se non nella sommità, ivi però sono fortemente legati da gagliardi muscoli, e da nervi.

Ma dalla prima costa alquanto più indentro del di lei mezzo esce in fuori un osso, in tal luogo veramente sottile, ma nell'avanzarsi quanto più si accosta all'osso largo delle scapole, fassi più grosso, e più largo, ed appoco appoco s'incurva per l'indietro, che più indietro co l'altra parte della sua cima facendo un piccolo gonfio sostiene il collo. Questo stesso poi torto, e che deve riporsi nel numero dell'ossa più dure con una testa posa in quel che ho detto, co l'altro in una piccola cavità dell'osso pettorale, e move si alquanto dal moto del braccio, e coll'osso largo delle scapole, sotto la di

lui testa si attacca con nervi, e con cartilagine.

Di qui principia l'Omero co' le estremità dall'una, e l'altra parte gonfio, tenero, senza midolla, cartilaginoso; nel mezzo tondo, duro, con midolla: mediocrementè incavato per l'indentro, convesso per la parte di fuori, ed esteriore. La parte d'avanti poi è quella verso il petto, quella di dietro verso le spalle, quella di dentro è voltata verso il fianco, quella di fuori verso la parte opposta; il che appartenere a tutti gli articoli s'intenderà dalle cose, che seguono. La testa poi superiore dell'Omero più tonda dell'altre ossa dette fin qui s'intromette nell'ossa delle scapole, ed in gran parte di passaggio vien collegata da' nervi. E dalla parte di sotto ha due processi fra quali quel che v'è di mezzo nell'estremità è altresì più incavato.

Cosa che serve di sito al braccio, ch'è composto di due ossi. Il radio sta di sopra più corto, e sul principio più sottile co' la sua testa rotonda, e leggermente incavata riceve in se il picciol copetto dell'omero, e vien ristretto fra nervi, e fra cartilagini. Il cubito sta di sotto, ed è più lungo, e sul principio è più grosso nella sommità, e colle due sue capocchie ch'avanzano fuori s'infina nella cavità dell'omero, il quale ho detto ritrovarsi tra li di lui due processi.

*Il Radio detto dai Greci Cercida.*

cessi. Sul principio poi le ossa congiunte a  
 i due radii del braccio appoco si discostano,  
 e di nuovo vicino alla mano si riaccostano,  
 essendo mutata la loro grossezza. Stante che  
 il radio in tal luogo è più grosso, e il cu-  
 bito molto sottile. Dipoi il radio termi-  
 nando in una testa cartilaginosa s'intromette  
 nella cervice di quello. Il cubito più ro-  
 tondo nell'estremità co l'altra parte alquan-  
 to si avvanza. Ed acciò non debba spesso re-  
 plicarsi convien sapere, che molti ossi ter-  
 minano in cartilagine, e non esser l'artico-  
 lo veruno che in tal guisa non termini, at-  
 teso che non potrebbe moverfi se non ap-  
 poggiasse ad una cosa fissa, ne si potrebi-  
 be unire co la carne, o co i nervi, se non  
 fossero uniti insieme da una materia di mezzo.  
 Nella mano poi la prima parte della pal-  
 ma è composta di molti, e piccoli ossicelli,  
 il numero de' quali è incerto. Ma tutti bis-  
 lunghi, e con una certa figura triangolare  
 si uniscono insieme, essendo quel di sopra l'  
 angolo d'uno, e la base dell'altro, e da  
 ciò ne segue che apparisce quasi un osso  
 solo incavato per l'indietro. Dalla mano  
 poi due piccoli processi s'intromettono ne  
 seni del radio. E dall'altra parte cinque  
 ossi dritti incamminandosi verso i diti com-  
 piscono la palma, da' quali anno principio  
 gli stessi diti, che sono composti di tre  
 ossa per ciascuno, e tutte son fatti nella  
 stessa

stessa maniera. L'osso interiore nella sua cima è incavato, e riceve nella cavità il piccolo tubercolo di quel di fuori, e sono quegli ossi tenuti insieme da' nervi, da' quali originando l'unghie vanno indurendo. Perciò co le radici stanno piu attaccati alla carne, che all'osso. E questa è l'ordinanza delle parti superiori.

La spina dalla parte d'abbasso ha il suo termine nell'osso delle cosce, il quale traverso, e piu gagliardo di tutti difende l'utero, la vescica, e l'intestino retto. E questo dalla parte di fuori convesso, verso la spina incavato, per fianco, cioè nell'istesse cosce ha seni rotondi, da' quali ha origine quell'osso, che chiamano Pettignone, e questo sotto gl'intestini, sotto la pube attraversando il ventre lo tien forte. E' piu dritto negli uomini, piu torto per l'infuori nelle donne, acciò non impedisca il parto.

Da quello anno principio i femminili capi de' quali sono anco piu rotondi di quelli de' gli omeri, essendo per altro quelli piu rotondi di tutti gli altri. Per di sotto poi anno due processi dalla parte d'avanti, e dalla parte di dietro, nel resto sono duri, e pieni di midolla, e dalla parte di fuori convessi, di nuovo ancora dalla parte di sotto gonfiano. Le parti di sopra s'intromettono nelle cavità del cossendice, siccome  
gli

gliomeri entrano negli ossi delle scapole, di più dalla parte di sotto leggermente si portano per l'infuori, acciò più ugualmente sostenghino i membri superiori. E parimente le teste inferiori di essi sono nel mezzo incavati, acciò più facilmente si possino connettere con gli stinchi. La qual commissura vien ricoperta da un osso piccolo, morbido, cartilaginoso, che chiamano patella. Questa vi nuota sopra, ne sta attaccata ad alcun osso, ma piuttosto v'è legata co la carne, e co' nervi, e piuttosto alquanto più appartenendo all'osso del femore, difende la congiuntura ad ogni piegatura delle gambe.

Lo stinco poi è composto di due ossi. Attesoche il femore è in tutto e per tutto simile all'omero, lo stinco al braccio, talmente che la figura, e bellezza di uno si conosce dall'altro, la qual cosa avvenendo negli ossi ha pure la stessa corrispondenza nella carne. Ma uno di questi ossi dalla parte di fuori v'è posto sopra, e chiamasi Sura, questo essendo più corto, e dalla parte superiore più sottile va fin'a piedi sempre ingrossando. L'altro è posto dalla parte d'avanti, e chiamasi tibia, è più lungo e nella parte superiore più grosso, vien solamente attaccato co la testa inferiore del femore, in quel modo che il cubito s'unisce co l'omero e ancora pegli ossi con-

congiunti di sopra e di sotto nel mezzo si staccano come segue nel braccio. Vien lo stinco per di sotto connesso dall'osso traverso de' taloni, e questo è posto sopra l'osso del piede, che in parte è incavato, in parte ha dell'eminenze, e riceve in se il talo, e s'intromette in quello. E questo senza midolla duro, e piu voltato verso la parte di dietro fa figura lunga, e rotonda. Gli altri ossi de' piedi sono tutti simili a gli ossi delle mani. Le piante corrispondono alle palme, i diti di questi a diti di quelle, e l'unghie all'altre unghie.

## C A P O II.

*Dell'ossa viziate, e corrotte, loro segni,  
e loro cure.*

**O** Gn'osso per l'ingiuria esterna, o si vizia, o si schiezza, o si spezza, o si fora, o si ammacca, o si move dal suo luogo. L'osso viziato sul principio ordinariamente diventa grasso, poi negro, o carioso. Il che avviene quando vi sono nate sopra cattive ulcere, o fistole, e sono queste molto invecchiate, oppur incancherite. Bisogna prima d'ogni cosa scoprir l'osso tagliando l'ulcere, e se il difetto di quello è piu largo dell'ulcere convien tagliar la carne,

ne, finattantoche da ogni parte si vegga l'osso sano: poi quello ch'è pingue basta scottarlo due, o tre volte col ferro infocato, accio si stacchi la squama da quello, ovvero raschiarlo finche venga un poco di sangue, ch'è segno di osso piu sano. Stanteche conviene, che il viziato si renda asciutto, e l'istesso ancora deve farsi nella cartilagine viziata, poiche anch'essa deve radersi colla lancetta, finche sia sano cio che vi rimane, dappoi o sia l'osso, o la cartilagine che si è rasa, vi si deve sparger sopra nitro ben trito: nè vi si dee far altro, se la carie, o la nerezza si ritrova nella sommità dell'osso, stanteche convien solamente piu spesso scottarlo co lo stesso ferro, oppur raderlo. Chi rade tali cose deve calcar il ferro arditamente così accio produca l'effetto, come anche affinche piu presto termini. Si tralascia di radere quando s'è giunto all'osso bianco, o al sodo; dall'osso bianco si conosce aver fine il vizio della negrezza, dalla solidità il vizio della carie; che dall'osso sano esce anco un poco di sangue si è detto di sopra. Se talvolta poi l'un o l'altro vizio sia penetrato puo esser dubbioso.

Nella carie piu facilmente si conosce, merceche s'intromette una piccola tenta in quel foro, la quale entrando piu, o meno fa conoscere, o ritrovarsi la carie  
nella ,

nella sommità o più essersi profundata; la nerezza poi può comprendersi dal dolore, e dalla febbre, le quali cose se sono mediocri non può quella essersi molto profundata. Si vede però meglio intromettendovi la terebra, poichè allora finisce il vizio quando lascia di esser nera la raschiatura dell'osso. Perciò se la carie è profonda co la terebra si trapassi con spesssi fori, che in profondità uguagliano il vizio dell'osso. Dapoi in que fori s'intromettino ferri infocati, finchè del tutto si renda asciutto quell'osso. Essendoche fatto ciò si fraccherà dall'osso di sotto l'osso viziato, e quel seno si riempirà di carne, e indi a poi non uscirà umidità veruna, o in poca quantità.

Se poi la nerezza è trapassata all'altra parte dell'osso bisogna del tutto tagliarlo, il che convien fare ancora se la carie è giunta all'altra parte dell'osso, ma quel che tutto è viziato tutto dee tagliarsi, se poi la parte di sotto è sana bisogna tagliarla finchè si trova il viziato. Parimente se un osso del capo, o del petto, o una costa è cariosa si rende inutile il fuoco, e la necessità richiede che si recida. Ne si deve attendere a coloro, che nudando l'osso aspettano il terzo giorno per tagliarlo allora stanteche fassi meglio qualsivisa operazione avanti l'infiammazione. Perciò




## CAPO SECONDO. 335

ciò per quanto è possibile deve nello stesso tempo tagliarsi la pelle, scoprir l'osso, e toglierseli ogni vizio. Il più pericoloso però è quel difetto che si ritrova nell'osso del petto, perchè appena mai quantunque vada bene la cura ne restituisce la vera sanità.



*Disegnioli Trapani e altri stromenti di ferro  
per trapanar et aschiare l'osso del Cranio,  
cavati da Comentarj di Vido Vidi.*

1. Mediolo.
2. Ferro nella parte inferiore semicircolare.
3. Trano che si gira col manico, e vi si aggiungono punte piu o meno lunghe secondo il bisogno.
4. Ferro che in fondo ha la figura di un'unghia.
5. Ferro, che termina in figura di pomo scannellato.
6. Lumina per difendere la membrana.
7. Lieva, con cui i Moderni difendono la membrana, e alzano l'osso.



*Come si taglia l'osso; e del moduolo, e Terebra ferri a questo proporzionati.*

**T** Agliasi l'osso in due modi. Se ciò che è viziato è poco si tagli col moduolo detto da Greci *chinicion*; *χοινίκιον*, se è largo co' le terebre. Apporterò l'uso dell'un'e del l'altro. Il moduolo è un ferro lungo, e tondo, concavo, negli orli inferiori fatto a sega, per mezzo del quale si mette una punta anch' essa circondata dalla circonferenza inferiore. Delle terebre poi se ne ritrovano due sorte. Una simile a quella che adoprano i fabbri, l'altra di capitello piu lungo, che principia dalla punta acutissima, e poi subito divien piu larga, e di nuovo da un altro principio poco meno che ugualmente se ne va in su.

Se il vizio ritrovasi in luogo stretto, che si possa afferrare col moduolo, quello piuttosto si adopera. E se vi è la carie s'intromette in quel foro il chiodo che ritrovasi in mezzo di esso. Se vi è nerezza co' l'angolo d'uno scarpello si fa una piccola cavità, nella quale entri il chiodo, acciò stando questo fermo nel girarsi il moduolo non possa sdruciolare: indi quello co' la corda si gira come la terebra o trapano. E si dee premere in una maniera determinata acciò si fo-

fi fori, e insieme si giri, perche se poco si calca, poco penetra, se troppo, non si puo muovere. Ne sarà fuor di proposito d'infondervi qualche goccia d'olio, rosato, o di latte, accio reso quello piu lubrico meglio si giri, del che però se vi se ne getta in troppa copia rende al ferro ottuso il taglio. Ma quando gia si è fatta la strada al modiollo si leva via quella punta che v'è nel mezzo, e girasi quello solo. Dappoi conosciuto che si è ritrovarsi sana la parte di sotto, il che si vede dalla raschiatura, o segnatura si tira fuori il modiollo.

Che se il viziato occupa spazio maggiore di quello che possa con esso prenderfi, devesi far la operazione co la terebra. Fassi con quella su l'ultimo confine dell'osso viziato, e del sano un foro, poi un altro non molto lontano da quello, ed altri ancora finche quel luogo, che dee tagliarsi sia circondato da questi fori, ed in questi parimente la segatura ne addita quanto si debba profundare la terebra. Spinto poi col martello da un foro all'altro uno scarpello si taglia cio che frammezzo a quelli si ritrova, e così fassi un giro simile a quello, che in forma piu piccola si fa col modiollo; in qual de' due modi però siasi inciso intorno co lo stesso scarpello per piatto si va radendo nell'osso viziato la lamina che di

mano in mano apparisce di sopra , finche vi si lasci l'osso sano ,

La nerezza quasi mai penetra per tutto l'osso , la carie trapassa tutto quello , e principalmente quando è viziata la calvaria . Di cio ancora ne dà contrassegno lo specillo , il quale se s' intromette in quel foro , che per di sotto ha sodezza , trova resistenza e n' esce umido . Se lo trova che trapassi dall'altra parte , giunge piu abbasso fra l'osso , e la membrana , e non trova resistenza veruna , e tirasi fuori asciutto , non perche non vi si ritrovi sotto qualche materia viziosa , ma perche in tal luogo è piu dilatata , come in sito piu ampio .

Siasi poi o la nerezza , che si è scoperta co la terebra , oppur la carie , che conoscesi co la tenta , quella che trapassa l'osso , è superfluo l' adoperare il modiollo , dovendo necessariamente esser molto dilatato quel vizio , che tanto s' è profundato . Ma deve si usare quella terebra , che ho posto nel secondo luogo , e cotesta accio troppo non si riscaldi , di quando in quando o si tiri fuori e s' immerga nell' acqua fresca . Allora poi convien operare con maggior diligenza , quando gia l'osso semplice s' è forato fin a mezzo , ed il doppio si è trapassato nella parte di sopra ; quello si conosce dalla profondità , questo dall' escire del sangue . Percio allora deve si girar la terebra piu lentamente .

mente, e non tanto si calchi la mano sinistra, e spesso deve trarsi fuori, e considerare la profondità del foro, accio ci accorgiamo quando si trapassa dall'altra parte l'osso, ne si corra rischio di offender co la punta la membrana del cervello, dal che ne provengono gravissime infiammazioni con pericolo di morte.

Fatti che si sono i fori cio che vi si ritrova di mezzo, spesso nell' istesso modo, ma con assai piu diligenza devesi levar via, accio casualmente co l'angolo dello scarpello non si offenda la stessa membrana, finattantoche si faccia tanta apertura, che vi si possa intromettere la lamina, che ripara la membrana detta da Greci *meningofilaca*. E' questa una lamina di rame, stabile, un poco connessa, dalla parte di fuori liscia, la qual intromettendosi in modo che la di lei parte esteriore sia vicina al cervello di man in mano si pone sotto a quello che si dee levar via co lo scarpello: e se inciampa in essa l'angolo dello scarpello non puo passar piu oltre, e con tanto maggior franchezza, e sicurezza il medico puo percuotere lo scarpello col martello, finche reciso da ogni banda l'osso ne vien alzato dalla stessa lamina, e si puo levar via senza nocuimento veruno del cervello. Quando tutto l'osso viziato si è tolto via bisogna rader intorno, e rendere lisce le sponde, e se è

caduta qualche poca di raschiatura sopra la membrana si deve raccogliere. Quando levata via la parte di sopra vi si è lasciata quella di sotto, non solamente si liscino l'estremità, ma tutto l'osso ancora, accio vi cresca poi sopra la cute senza nocumento, essendo che quella generandosi sopra di un osso ruvido non ne cagiona sanità, ma move nuovi dolori.

Dopo scoperto il cervello in che modo convenga operare, si dirà da me quando sarò giunto alle rotture delle ossa. Se vi si è lasciata qualche base vi si pongono sopra medicamenti non pingui, quali convengono alle ferite fresche, e sopra vi si ponga lana sucida baguata di olio e aceto. In processo di tempo dall'istesso osso ne va crescendo la carne, che riempie la cavità fatta dall'arte. Se qualche osso parimente si è scottato, si stacca dalla parte sana, e sottrenta fra la parte sana, e la morta un pezzetto di carne, la quale spinge in fuori ciò che si è staccato, e quella ordinariamente perche è una schiezza sottile, e stretta, da Greci *lepis* cioè squama ne vien chiamata.

Puo altresì accadere, che da uno percossa ne si spacchi l'osso, ne del tutto s'infranga, ma che solamente la superficie si ammacchi, e si renda ruvida. Il che quando avviene è bastante che si raschi, e che si renda liscia. Tali cose, benché per



per lo piu seguono nel capo, sono nondimeno comuni agli altri offi ancora, talmente che dovunque accade l'istesso vizio deve usarsi lo stesso rimedio. E quando quelle anno patita frattura, rima, foro, ammaccatura ricercano alcune cose proprie a ciascun genere, ed alcune comuni a piu. Delle quali presentemente dirò dando principio dalla calvaria.

## C A P O IV.

*Cura della Calvaria rotta.*

**Q**Uando dunque la calvaria è percossa bisogna subito investigare se quell'uomo abbia vomitato bile, (a) se abbia perduta la vista degli occhi, se gli sia venuta meno la favella (b), se gli sia uscito il sangue dal naso, o dall'orecchie, se sia tramortito, se sia giaciuto in terra senza senso come dormendo; merceche tali cose non avvengono se non quando l'osso è rotto. E quando accadono convien sapere esser necessaria, ma difficile la cura. Se poi vi s'è aggiunta di piu la torpidezza, se la mente non è a segno, se n'è seguita paralisia, o distensione di nervi, è verisimile che sia offesa anche la membrana del cer-

Y 4 vel-

(a) *Ipp. VL. Af. 50.*(b) *Ipp. VII. Af. 14. e Af. 24.*

vello, (c) e tanto meno di speranza vi rimane. Che se nessuna di tali cose è seguita si può aver dubbio ancora se sia frattura nell'osso. E subito bisogna considerare se la percossa sia stata fatta da pietra, da legno, da ferro, o da altra sorta di arme, e se questa fosse liscia, o ruvida, piccola, o grande, se usata con impeto grande, o con poco, perchè quanto è stato più debole il colpo, tanto più facilmente si può credere aver l'osso a quello fatta resistenza. Ma non vi è meglio che investigare ciò con più certo contrasegno. Dove dunque ritrovasi la ferita devesi intromettere una tenta, che non sia né troppo sottile, né appuntata, acciocchè incontrandosi in alcune cavità naturali, ci faccia in vano credere esser rotto l'osso, né sia troppo grossa, accio si possano sentire le rime piccole. Quando la tenta è giunta all'osso, se non trova altro che liscio, e lubrico, si può intendere esser quello sano; se vi si sente qualche scabrosità principalmente in quella parte che non sono suture, si vien in cognizione esser rotto l'osso.

Lasciò scritto Ippocrate essere stato ingannato dalle suture secondo il costume degli Uomini Grandi, e che anno fiducia di cose grandi, perchè gl'ingegni piccoli perchè niente posseggono, niente a se tolgono:

(a) *Ipp. ibi Af. 8.*

gono: Ad un grand'ingegno, e che molto nondimeno ritiene, sta bene altresì una semplice confessione d'un error vero particolarmente in quel ministero che per utile vien insegnato a' posteri, accio che alcuni non restino nello stesso modo ingannati come per l'avanti egli n'è rimasto ingannato. Ma la memoria di Professore si grande ci ha indotti per altro a frappare queste cose.

In quanto alla futura poi per quella cagione può quella ingannare perchè è ugualmente scabrosa di modo che alcuno può stimare, che sia quella, ancor che sia la rima in quel luogo, nel quale è verisimile che essa futura si trovi. Percio non bisogna lasciarsi ingannare da ciò, ma è assai bene scoprire l'osso. Imperocchè ne delle future, come dissi di sopra, v'è sito determinato, e può esser commessura naturale, e rima fatta dalla percossa, ed aver anche appresso qualche fissura. Anzi che se il colpo è stato gagliardo, benchè co la tenta niente si ritrovi, è bene scoprire alquanto l'osso. E se neppur allora si fa vedere la rima, devesi poner sopra l'osso inchiostro da scrivere, poi si rada quello co lo scarpello, atteso che dove si ritroverà la rima, conterrà dentro color nero.

Suol accadere altresì, che in un luogo  
fia

sia stato il colpo, e nell'altro sia rotto l'osso. Per tanto se dopo che alcuno è percosso gravemente se ne seguono cattivi segni, ne in quella parte, dove è rotta la cute si ritrova la rima, non è irragionevole osservare se in altro luogo vi sia qualche morvidezza, e tumore, ed aprirlo; stante che vi si ritroverà l'osso fesso, ne però con gran difficoltà risana la cute, se in vano vi si farà fatta l'apertura. La rottura dell'osso se non vi si prende presto rimedio apporta pericolose infiammazioni, e con maggior difficoltà poi si cura.

Di rado, ma talvolta però accade, che rimanga tutto l'osso sano e salvo, per di dentro poi dal colpo rottasi qualche vena nella membrana del cervello mandi fuori sangue, e questo accagliatosi in quella parte cagioni dolori gravi, e tolga la vista a gli occhi. Ma per lo più di contro a questo si sente il dolore, ed in tal parte tagliata la cute si ritrova l'osso pallido. Percio ancora questo osso deve tagliarsi. Per qualunque cagione poi è necessaria questa cura, se non s'è allargata assai la cute, devesi di vantaggio aprire finche si possa vedere tutto ciò che vi è di viziato. Nel che si dee osservare di non lasciar sopra l'osso parte veruna di quella membrana che sotto la cute cinge la calvaria, attesoche questa lacerata o con scarpelli, o con terebre ne cagiona feb.

febbri grosse con infiammazioni . Onde è meglio che quella del tutto dall' osso si stacchi . Il taglio se si è fatto dallo stesso colpo bisogna che lo lasciamo stare come l'abbiamo ricevuto , se deve farsi co la mano cotesto è il migliore , che con due linee traverse ha la figura della lettera X: accio poi si possa tirar a se la cute da ciascuno di quelli angoli .

Frattanto se fluisce il sangue bisogna trattenerlo con una sponga intinta di quando in quando nell' aceto , e impedire con oppornergli delle tastre , e tengasi alta la testa . Ne tal vizio è pericoloso se non fra muscoli delle tempie , ma in tal parte ancora nondimeno si opera con sicurezza .

In ogni fissura poi , o frattura di osso i medici antichi venivano subito a' ferri da tagliarlo . Ma è assai meglio tentar prima quegli empiastri , che si compongono per la calvaria . Ed alcuno di essi ammorvidito co l' aceto bisogna di per se applicarlo sopra l' osso fesso , o fratto , e di piu sopra quello ponervi una pezzetta empiastrata dello stesso medicamento , che occupi spazio maggior della ferita , e in oltre lana sucida intinta in aceto : Indi si fasci la ferita , e ogni giorno si sciolga , e si curi nel modo stesso fin al quinto giorno . Dal sesto in poi si puo fomentarla di vantaggio col vapor d' acqua calda per mezzo di una sponga , nel  
resto

resto far le cose medesime. Che se la carne nuova comincerà a crescere, e la febbre o si sarà partita, o resa piu mite, e ritornerà l'appetito, e si dormirà sufficientemente bisognerà persistere nello stesso medicamento. In processo di tempo si mollifichi quell'Empiastro aggiuntovi cerotto fatto di rosa, accio piu facilmente produca la carne, essendoche di per se ha forza da reprimere. In questa maniera spesso le rime si riempiono d'un certo callo, che serve di cicatrice all'osso, e l'ossa che fratte, sono fra loro piu lontane se in qualche parte non si toccavano insieme vengono dallo stesso callo agglutinate, e serve di coperta alquanto migliore per il cervello di quella carne, che vi cresce sopra quando s'è levato via l'osso. Se poi sul principio della cura si fa maggiore la febbre, sono brevi i sonni, e perturbati da sogni, è umido l'ulcere, e non si nutrisce, e nascono glandole nel collo, vi sono dolori grandi, e oltre cio cresce la nausea del cibo, allora finalmente si deve ricorrere all'operazione della mano, e del ferro.

Due sono i pericoli, che possono avvenire dal colpo alla calvaria, o che si fenda o che si profondi l'osso: se s'è fessato possono i lati essere stretti, o perche l'uno sopravvanzi l'altro, o pur ancora perche si fiano di nuovo riuniti insieme. Dal che ne segue  
che

che scende l'umore alla membrana, e che non può ufcir fuora, e così vellica quella, e ne cagiona infiammazioni gravi.

Quando l'osso s'ammacca preme la stessa membrana del cervello, pungendola talvolta ancora alcune puntarelle della rottura. Alle dette cose deve provedersi in modo che però dell'osso se ne levi meno che sia possibile. Percio se un lato posa sopra l'altro, basta co lo scarpello per piatto levar ciò che sopravanza, il che levato, rimane aperta la rima tanto, quanto basta per curarsi. Ma se sono i lati stretti fra di loro da una banda di quello in lontananza di un dito co la terebra si facci un foro, e da quello co lo scarpello si tirino due linee fin alla rima a similitudine della lettera A talmente che la punta di quella sia dal foro, la base dalla rima.

Che se la rima è piu lunga da un altro foro dovrà tirarsi un'altra simile cavità, e così in quell'osso niente vi rimane di nascosto frammezzo, e d'avanzo si dà l'esito a ciò che dentro celavasi. Nemmeno se si è affondato l'osso rotto è necessario tagliarlo via del tutto, ma o è affatto spezzato, e staccato del tutto dal resto, o in qualche piccola parte è attaccato alla calvaria, che gli sta intorno, devesi co lo lo scarpello dividere da ciò che

che si ritrova nel suo stato naturale, dapoi nell'osso affondato accanto la rima, che abbiamo fatto vi si facciano de' fori, se il male occupa poco spazio due, se piu si dilata, tre. E si tagli dall' un all' altro, e poi spingasi dall'una e l'altra parte lo scarpello verso la rima di maniera che formi una cavità lunata, e la parte connessa sia rivoltata per di dentro verso la frattura, i corni verso l'osso sano. Fatto cio se vi sono pezzetti che tentennino, e che facilmente si possino levare, co' le mollette fatte a questo effetto si raccolgano, e principalmente quei che aguzzi pungono la membrana. Se cio non puo farsi facilmente, vi si dee poner sotto quella lamina, che dissi servir per riparo della membrana del cervello, e tutto cio, che di spinoso sopra quella ritrovasi, e che avanza per di dentro, si tagli, e cio che per l'ingiu s'è profundato co' la stessa lamina si alzi. Tal modo di curare fa che che l'ossa rotte, che in qualche parte sono attaccate, si consolidano, quelle che sono da ogni parte staccate, in processo di tempo senza dolor alcuno co' medicamenti si cavino fuora, e fra essi vi rimanga spazio sufficiente per cavare la marcia, e che abbia il cervello maggior riparo dall'osso di quel che fosse per avere se quello si fosse tagliato.

Fat.



Fatto cio la membrana si bagni con accetto forte, accio se da quella n' esce sangue si stagni, oppure se rimane dentro accagliato si sciolga. Dipoi lo stesso medicamento mollificato nel modo detto di sopra, si applichi alla medesima membrana; e si facci il restante nel modo stesso in quanto appartiene alla pezzetta empiastrata, e lana fucida, e si deve poner il paziente in luogo tiepido, e curarsi la ferita ogni giorno, e nell' Estate anche due volte il giorno.

Che se la membrana per l' infiammazione sarà gonfiata bisognerà infondervi olio rosato tiepido, se gonfierà tanto che sopravanzi ancora l'osso si reprimerà con lenticchia ben trita, o foglie di vite pestate, e mescolate con butirro fresco, o grasso d'oca: ed il collo doverà mollificarsi con cerotto liquido fatto d'irino. Ma se parrà poco pura la membrana, si mescolerà di quell'empiaastro, e miele in porzioni uguali, e vi si sparga sopra, e per tenervelo vi si ponga una, o due taffe, e si copra per di sopra con una pezzetta empiastrata d'empiaastro. Quando la membrana è piu pura nello stesso modo si mescoli il cerotto co l'empiaastro, accio produca la carne.

In quanto poi appartiene all'astinenza, e a i primi, e secondi cibi, e bevande si offer-

osservi lo stesso di ciò, che si è detto delle ferite, e con tanta maggior diligenza in quanto maggior pericolo quella parte si ritrova. Anziché quando si vedrà che questi non solo si sostentino, ma si nutrischino ancora dovranno nondimeno fuggirsi tutte le cose da masticarsi, come anco il fumo, e ciò che move gli sternuti. Danno certa speranza la membrana morvida, e del suo natural colore, la carne crescente che sia rossa, il mover facilmente la mascella, e il collo. Segni cattivi sono la membrana immobile, che sia nera, o livida, o per altro di color viziato; il delirio, il vomito agro, la paralisia, o distensione de' nervi, la carne livida, il non poter mover la mascella, e il collo. L'altre cose appartenenti al sonno, all'appetito, alla febbre, al color della marcia, l'istesse sono o salutifere, o pericolose, che nell'altre ferite.

Quando procede bene la cura incomincia dall'istessa membrana, oppure se in tal luogo l'osso è doppio anche di lì, a crescer la carne, e quella riempie il vacuo che si ritrova fra l'ossa. Talvolta sopraccresce anche alla calvaria, il che se avviene, vi si spruzzi sopra squama di rame, accio la reprima, e la tenga a segno ponendo sopra la carne cose, che formin la cicatrice; la qual facilmente in tutte le parti s'induce

duce eccetto in quella parte della fronte che è situata un poco sopra cio che si ritrova fra le ciglia. Stanteche in tal luogo appena è possibile che non persista per sempre l'esculcerazione, la qual debbasi tener coperta con pezzetta empiastrata di medicamento. Si offervi poi nelle rotture della testa di fuggire il Sole, il Vento, il frequente bagno, e la troppa quantità del vino, finche sia consolidata la cicatrice si levi la fascia.

## C A P O V.

*Della Cura della rottura del naso.*

**N**El naso si suol rompere, e l'osso, e la cartilagine, talor per d'avanti, talor per fianco: se si sono rotti per d'avanti, oppur una d'esse cose, s'abbassano le narici, con difficoltà si respira: se l'osso s'è spezzato per fianco quella parte è concava, se la cartilagine, si piegano in una delle parti le narici.

Cio che cadette della cartilagine si dee legghiermente alzare, o ponendovi sotto la tenta, o premendo con due dita da amendue le parti. Dappoi per lunghezza vi si spingano dentro torte tiste, e circondate di morvida pelle, e che vi sia cucita intorno, o qualcosa altra fatta all'istessa fog-

gia di straccio asciutto , ovvero una penna grossa empiastata di gomma , o colla , e circondata di morvida pelle , che non fasci cader abbasso la cartilagine . Che se quella è rotta per d'avanti , bisogna riempire ugualmente l'un e l'altro buco del naso , se per fianco deve esser la tasta piu grossa da quella parte dove pende il naso , dall'altra piu sottile . Per di fuori poi si deve fasciare con una fascia morvida , la quale nel mezzo sia empiastata di fior di farina , e fuligine d'incenso mescolata insieme , e quella si giri dietro l'orecchie , e co le due teste s'anno di sopra la fronte . Essendoche tal robà sta attaccata come colla , e quando è rifeccata facilmente tiene a segno le narici . Se cio che vi s'è posto dentro cagiona travaglio , come per ordinario accade quando è rotta la cartilagine interiore , tirate in su le narici si tengano insieme solamente co l'istessa fascia , passati poi quattordici giorni anche questa si levi via , e si stacchi co l'acqua calda , e co la stessa , indi a poi ogni giorno si fomenti quella parte .

Se poi è rotto l'osso si riponga anch'esso colle dita a suo luogo , e quando questo è percosso d'avanti si riempia l'una , e l'altra narice , quando per fianco , si riempia quella , nella quale n'è spinto l'osso , e vi s'applichi cerotto , e si fasci alquanto piu

piu stretto: perche in tal luogo il callo non vi cresce solamente fin quanto basti per risanare, ma fin a farvi altresì tumore. Dal terzo giorno in poi si fomenti co l'acqua calda, e tanto piu quanto piu vicino deve esser a risanare. Che se i pezzi rotti saranno piu d'uno, nondimeno dovranno spingerli co le dita in dentro ciascuno a suo luogo, e porvisi la stessa imbrigliatura, e sopra quella il cerotto, ne sopra vi si ponga fascia veruna.

Ma se qualche frammento staccato da ogni banda non si riunirà co gli altri si conoscerà dall'umore che in gran copia verrà fuori dalla ferita, e si estrarrà co le mollette. Terminate l' infiammazioni vi si applicherà qualche medicamento, che mediocrementemente reprima. Peggio è quando o all'osso, o cartilagine rotta si aggiugne la ferita della cute. Accade cio molto di rado. Se avviene, si riponghino nondimeno le cose accennate a suo luogo nella guisa stessa, e sopra la cute s'imponga uno di quegli empiastri, che si compongono per le ferite fresche, ma non vi si ponga sopra fasciatura veruna.

*Della Cura degli Orecchi rotti.*

**N** Ell' orecchio ancora si rompe talvolta la cartilagine, il che se succede, prima che si generi la marcia vi si deve applicar un medicamento agglutinante, essendo che bene spesso tien lontana la suppurazione, e rafsoda l' orecchio. Nella cura di questo come ancora del naso deve saperfi, che non s'agglutina l' istessa cartilagine, ma che vi cresce intorno la carne, e si rafsoda quella parte. Per tanto se la cute ancora è rotta co la cartilagine, si cuce da amendue le parti la cute; parlo però ora di quella cartilagine, che si rompe, quando è sana la cute; che se poi già in quella si è generata la marcia bisogna aprir la cute in altra parte, e la cartilagine stessa deve tagliarsi dirimpetto con taglio semicircolare. Fatto questo si usi medicamento, che mediocrementemente reprima, qual si è il licio distemperato con acqua, finche cessi di fluire il sangue. Indi vi si ponga sopra una pezzetta con empiaastro, fuggendo ogni sorta di grasso, e per di dietro si ponga sotto all' orecchio lana morvida, che riempia lo spazio, che sta fra quello, ed il capo: poi si fasci leggermente, e dopo il terzo giorno si fomenti co l'acqua

qua calda come dissi nella cura del naso. Ed in tali casi ancor è necessaria l'astinenza su primi tempi finche abbia fine l'infiammazione.

## C A P O VII.

*Della cura della mascella rotta, e di alcune cose appartenenti a tutte le ossa.*

**D**Ovendo da queste cose far passaggio alla cura della mascella, stimo dover accennare alcune cose appartenenti comunemente a tutte le ossa, accio non convenga replicar spesso le medesime cose. Ogni osso duaque ora si fende per lungo come il legno, or si spezza per traverso, e allevolte per obbliquo, e questo talor ha le punte ottuse, talor acute. La qual sorta di rottura è la peggiore, perche ne facilmente si uniscono insieme quelle ossa, che non si appoggiano a qualche ottuso, e lacerano la carne, e allevolte il nervo ancora, o muscolo. Anzi che bene spesso da una sola schiezza se ne fanno piu pezzi. Ma ne gli altri ossi per lo piu un frammento si stacca dall'altro onninamente, nella mascella poi sempre, ancor che sia rotta qualche parte, stanno attaccate le ossa fra di loro.

Primieramente dunque premendo con due  
Z 3 dita

dita da amendue le parti , e per di dentro dalla bocca , e per di fuori dalla pelle , si riponghino le ossa a suo luogo . Dappoi se la mascella è rotta per traverso , nel qual caso ordinariamente ciascun dente cade sopra quello che gli è piu vicino , riposta che essa n'è a suo luogo , i due prossimi denti , oppure , se questi vacillano , gli altri che ne vengono dietro debbon legarsi insieme con una setola o fillo . Cosa che nell' altre sorte di fratture si è superflua , dovendosi far per altro tutte le cose stesse . Imperocchè vi si deve poner sopra una pezzetta a doppio bagnata di vino , e olio co lo stesso fior di farina , e la stessa fuligine d'incenso . Dappoi o una fascia , o una morvida imbrigliatura tagliata nel mezzo per lunghezza cinga dall'una , e dall' altra banda il mento , e indi tirate le teste di essa sopra il capo vi si leghino .

Si dirà ancora come cosa appartenente a tutte le ossa , che l'astinenza dal cibo in primo luogo è necessaria , indi dopo il terzo giorno vitto umido ; passata la infiammazione alquanto piu pieno , e tale che alimenti la carne ; e il vino esser in ogni tempo contrario . Fatto cio nel terzo di convenir sfasciarsi , e fomentarsi per mezzo d' una sponga col vapore d'acqua calda , e applicarvi sopra le medesime cose , che furono poste sul principio . Nel quinto giorno dee  
farfi



farli lo stesso, e finattantochè termini la infiammazione, che nel nono, o settimo giorno ordinariamente ha fine. Passata quella doverfi di nuovo tastare le ossa, accio se qualche frammento non si trova a suo luogo vi si riponga. Ne però doverfi sciogliere se non saranno passate due parti del tempo, nel quale ciascuna ossa bollano.

Ordinariamente poi fra'l decimo quarto, e ventesimo giorno risanano le mascelle, le guancie, il Jugolo, il petto, l'osso largo delle scapole, le coste la spina de' costendici, i taloni, il calcagno, la mano, la pianta del piede. Fra'l ventesimo, o trentesimo gli stinchi, e le braccia. Fra'l ventesimosettimo, e'l quarantesimo gli Omeri, e le cosce.

Ma nella mascella vi si deve aggiugner che per lungo tempo convien prendere cibo umido. Ed anche in processo di tempo bisogna perseverare con lasagne e cose simili, ne mangiar cosa alcuna finchè il callo del tutto consolidi la mascella, parimente in particolare su' primi giorni si osservi il silenzio.

## C A P O V I I I.

*Del Jugolo rotto.*

**I**L Jugolo poi se si è rotto per traverso alle volte di per se si riunisce, be-

ne e se non si move può risanare senza fasciatura. Ma alle volte, principalmente quando è mosso, cade in giù, e per lo più la parte di verso il petto per l'indietro s'abbassa sotto la parte verso l'omero. Della qual cosa quella è la ragione perchè di per se non si move, ma si accorda col moto dell'omero. Perciò stando quello di sotto, sopra di esso si va movendo l'omero. Di rado in vero il jugolo si rompe per d'avanti, o per l'indietro talmente che Professori gravi anno lasciato scritto di non aver mai veduto, ma ne fa però nondimeno piena testimonianza di tal cosa Ippocrate.

Siccome poi questi due casi sono differenti, così ricercano alcune cose diverse fra di loro. Quando il jugolo piega verso le scapole, devesi co la mano destra nello stesso tempo spingere l'omero per l'indietro, e tirar quello per d'avanti. Rivoltato che si è verso il petto il jugolo, si spinga addietro, e l'omero si tiri avanti. Che se questo è di sotto, non si dee abbassar la parte di verso il petto; perchè è immobile, ma devesi alzare l'omero stesso. Se accaso è di sopra, la parte di verso 'l petto devesi empir di lana, e l'omero legarsi al petto. Se i frammenti sono appuntati bisogna tagliar dirimpetto la cute, tagliar quegli ossi che forano la carne, e poi resi ottusi gli ossi riporgli insieme. Se da qualche parte vi è alcuna cosa

cosa eminente le si dee opporre una pezzetta a tre doppi inzuppata in vino e olio. Se sono piu frammenti si debbon tener insieme con un canaletto fatto di ferula, e quello incerato per dentro, accio la fascia non si allarghi, la quale, riposto a suo luogo il jugolo, bisogna piuttosto farla girar piu volte, che stringerla troppo. Il che è da osservarsi in tutte le rotture dell'ossa. Dal destro jugolo poi, se questo è il rotto, si tiri la fascia sotto la spalla sinistra, dal sinistro sotto la destra, e di nuovo si riconduca sotto la sua spalla. Oltre cio se il Jugolo si è piegato verso le scapole, convien legare il braccio al fianco, se per l'innanzi, al collo. E si collochi quell'uomo supino, e si facciano l'altre cose dette di sopra.

2. *Della cura di ossa diverse.*

Si ritrovano poi piu forti di ossi quasi immobili. o duri, o cartilaginosi, che o si frangono, o si forano, o s'ammaccano, o si fendono, come le mascelle, il petto, l'osso largo delle scapole, le coste, la spina de' costendici, i taloni, il calcagno, la mano, la pianta del piede, i quali tutti nell'istesso modo si curano, se sopra vi si ritrova ferita, si nutrisca co'suoi medicamenti, nel risanar la quale le rime dell'osso, o se vi è qualche foro, ne vengon riempite dal callo. Se la cute è intatta, e dal

e dal dolore conosciamo esser offeso l'osso, non convien far altro, che star a riposo, e applicarvi il cerotto, e fasciarlo leggiermente finattantoche risanato l'osso termini ancora di dolore.

## C A P O IX.

*Cura Della Rottura delle Coste.*

**R** Imangono però da dire alcune cose proprie delle coste, perche sono situate vicino alle viscere, e tal parte n'è esposta a piu gravi pericoli. La costa dunque eziandio talvolta si fende in modo che non la parte superiore dell'osso di quella, ma la parte interna, la qual è rara, ne vien offesa: talvolta in modo che ne rimane rotta del tutto. Se non si è rotta affatto, ne si sputa sangue, ne vien la febbre, ne si fa suppurazione alcuna se non molto di rado, non v'è gran dolore, ma però toccandosi quella parte duole alquanto, è bastante fare le cose stesse scritte di sopra, e incominciare a fasciare da mezza la fascia, accio questa non facci piegar la pelle in una delle parti. Passato poi il ventunesimo giorno, nel qual tempo deve esser saldato l'osso, convien cibarsi piu copiosamente, per render assai pieno il corpo, accio meglio ricopra

pra l'osso, il quale in tal luogo essendo ancora tanto tenero, sta esposto sotto a quella pelle sottile, a qualche ingiuria. Per tutto il tempo della cura poi si fugga di gridare, di discorrere ancora, e il tumulto, la collera, il moto gagliardo del corpo, il fumo, la polvere, e tutto ciò che cagiona la tosse, e lo sternuto, nemmeno il trattener grandemente il fiato è fra le cose giovevoli.

Ma se è rotta del tutto la costa, il caso è più pericoloso. Imperocchè ne seguono infiammazioni grandi, febbre, suppurazione, sputo di sangue, e bene spesso il pericolo della vita. Se le forze dunque lo comportano dal braccio, ch'è sopra la costa, si cavi il sangue. Se non lo permettono, devesi mover nondimeno il ventre con qualche lenitivo, e usar a lungo l'astinenza. Non bisogna poi dar al paziente il pane prima del settimo giorno, ma farlo vivere a soli brodetti, e s'applichi alla parte cerotto fatto di licio, al quale sia aggiunta anche trementina cotta, oppure il malamma di Poliarco, ovvero pezze con vino, rosa, e olio, e sopra vi si ponga lana fucida morvida, e due fasce, le quali si comincino a fasciare dal mezzo, e non si stringhino. Molto più poi debbon fuggirsi le cose dette di sopra, talmente che neppure il respiro si deve  
trop-

troppo spesso agitare. Che se sarà molestata la tosse converrà prender a tal effetto una bevanda di trisaggine, o di ruta, o di erba stia de, o di comino, e pepe. Molestando poi dolori più gravi converrà imporvi ancora un cataplasma fatto di oglio, o d'orzo, al quale sia aggiunta una terza parte di fico grasso. E questo vi starà sopra di giorno, di notte poi il cerotto, o il malamma, o panni perche potrebbe il cataplasma cadere. Per tanto ogni giorno ciascuna cosa si disfaccia finche possiamo esser contenti del solo cerotto, o malamma: e per dieci giorni si estenuerà cola fame il corpo, indi a poi comincerà a nutrirsi. Ed a questo effetto ancora si lascerà la fascia più lenta di prima, e tal sorte di cura giugnerà per lo più fin'alli quaranta giorni.

Che se vi sarà timore di suppurazione sarà più giovevole per digerire il malamma, che il cerotto. La suppurazione averà superato, ne co le cose dette di sopra si sarà potuto impedire, senza metter tempo in mezzo accio l'osso non si vizj, in quella parte, che più apparirà il tumore doverà intrometterfi un ferro infocato fin che arrivi alla marcia, e quella si cavi fuori. Se in nelsun luogo si fa vedere dove si ritrovi la marcia, in questa maniera lo conosciamo. Empiastreremo tutta  
la

la parte di terra cimelia, e la lascieremo seccare, in quel luogo che piu durerà l'umido, si ritroverà in vicinanza la marcia, e a quella doverà darfi il fuoco. Se l'ascesso sarà piu largo bisognerà forare in due, o tre luoghi, ponervi dentro la tasta, o qualche straccetto, il qual in cima sia legato con un filo acciaio facilmente si estragga. In quanto al resto si usino le cose stesse delle altre scottature. Purificato l'ulcere doverà nutrirsi il corpo, acciaio a detto male non ne so. pravvenga una tabe pericolosa. Talvolta ancora avendo patito meno l'osso, e trascuratosi sul principio, fassi interiormente una radunanza non di marcia, ma d'un certo umor simile a i mocchi, e vi si mollicca dirimpetto la cute, alla quale devesi adoperar la stessa scottatura detta di sopra.

2. *Della Cura della Spina.*

Nella spina ancora abbiamo da notare alcune cose proprie. Attesoche se cio ch'è uscito dalla vertebra è rotto in qualche modo, diventa la parte concava, e si sentono in quella punture, perche per necessità debbon essere quei frammenti spinosi. Dal che ne segue che il paziente ad ogni poco si piega verso la parte anteriore. Questi sono i segni che fanno conoscere una tal cosa. I medicamenti poi vi convengono gli stessi, che si sono apportati nella prima parte di questo capo.

CA-

*Delle cure comuni, degli Omeri, braccia, femori, stinchi, diti rotti, o evulsi.*

**S**imili parimente in gran parte sono i casi, e cure degli Omeri, e femori. Alcune cose sono altresì comuni alle braccia, agli omeri, femori, stinchi, e dita. Essendo che questi con minor pericolo si rompono per mezzo, e la frattura quanto è più vicina alla testa di sotto, o di sopra tanto è peggiore, perchè reca maggior dolore, e con più difficoltà curasi. Delle fratture la più tollerabile è la semplice, traversa; peggiore quando vi sono frammenti, e quando è obliqua, pessima poi quando è ancor acuta. Talvolta le ossa rotte in queste parti rimangono a suo luogo, il più delle volte però escono, e uno accavalca l'altro. E ciò sopra tutto dee considerarsi, e sonovi contrasegni certi. Se sono mossi dal suo luogo se resime, o convulse, e se toccate danno punture, sono inuguali. Se poi si congiungono insieme non dirimpetto, ma per obliquo: (il che avviene quando non sono a suo luogo,) sarà quel membro da una parte più corto, e i di lui muscoli faranno gonfi.

Se dunque si è conosciuto ciò, convien di subito stender quel membro. Stante che i nervi, e i muscoli distesi ne vengono contratti



tratti dall'ossa, ne ritornano al suo sito, se alcuno non gli stira per forza. Parimente se si è trascurato ciò ne' primi giorni, nasce la infiammazione. Nella quale con difficoltà, e con pericolo si usa a i nervi la violenza. Imperocchè o ne segue lo spasmo, o lo sfacelo, o almeno che tardissimo si maturi la suppurazione; perciò se prima non si sono riposte a luogo le ossa vi si riponghino dappoi. Un dito, o qualsivoglia altro membro ancora, se per anco è tenero, può stendersi da una sola persona prendendo co la mano destra una parte, co la sinistra l'altra. Un membro più gagliardo richiede due, che facciano forza in parte diversa. Se sono gagliardi i nervi, come nelle persone robuste, e principalmente ne i di loro femori, e stinchi accade, bisogna ancora con cinghie, o fasce di lino legar di sotto, e di sopra le teste degli articoli, e tirarle in più persone verso parti diverse. Quando per forza si è reso il membro un poco più lungo di quel che deve esser naturalmente, allora si riponghino co le mani le ossa al suo sito, e si è contrassegno dell'osso riposto a suo luogo il dolore cessato. E resta tal parte uguale all'altra deve rinvolverfi con panni a due, o tre doppj intinti in olio, e vino, i quali meglio è che siano di lino, che d'altra materia.

Per

Per ordinario poi vi si richiedono sei fasce. La prima vi si ponga cortissima che raggiata tre volte intorno la frattura si porti per l'insu quasi a chiocciola, ed è bastante che questa in tal guisa giri tre volte. La seconda sia la metà piu lunga, e se in qualche parte sopravanza l'osso, da quella s'incominci a fasciare, se tutto si è uguale, d'onde piu piace sopra la frattura dirimpetto alla prima, e vada all'ingiu, e di nuovo dalla frattura ritornando nella parte superiore, termini piu in su della prima fascia. Sopra queste convien ponervi sopra una pezza lina piu larga col cerotto, che le tenga insieme: e se in qualche parte sta eminente l'osso, da quella le s'opponga un panno a tre doppi bagnato co lo stesso vino, e olio. Queste cose si racchiudino co la terza, e quarta fascia, talmente che sempre la seguente vada al contrario della prima, e la terza solamente termini nella parte di sotto, tre nella parte superiore, perche meglio è che piuttosto girino piu volte, che stringhino. Perche cio ch'è troppo stretto si mortifica, e rendesi facile a sfacelare. L'articolo poi convien lasciarlo meno che sia possibile, ma se la rottura dell'osso si ritrova accanto a questo la necessità lo richiede.

Fasciato che si è quel membro devesi lasciar stare sin al terzo giorno, e quella le-  
gatu-

gatura deve esser tale, che nel primo giorno non dia dolore veruno, ma non paja però sciolta; nel sec. sia piu lenta, nel terzo quasi già sciolta. Allora dunque di nuovo bisogna rifasciar quella parte, ed aggiugnere all'altre la quinta fascia, e di nuovo nel quinto giorno disfasciarla, e aggiugnervi la sesta fascia in guisa che la terza, e la quinta terminino per di sotto, le altre di sopra. Ogni volta poi, che si sfascia la parte deve fomentarsi co l'acqua calda, ma se la frattura è accanto l'articolo vi s'infonda allungo del vino, aggiuntavi una piccola porzione d'olio, e si facciano le stesse cose finche talmente si rimova l'infiammazione, e che si renda quella parte ancora piu estenuata del solito. Il che se non ce l'ha concesso il settimo giorno, certamente si otterrà nel nono. Allora con grandissima facilità si maneggiano le ossa.

Perciò se sono poco commesse insieme, di nuovo debbon commetterfi. Se alcuni frammenti sopravanzano si debbon riponer a suo luogo. Dappoi si fasci nell'istesso modo quel membro, e vi si accomodino sopra le ferule, le quali s'esse, e poste vi intorno, ritenghino l'osso nel suo sito, e in quella parte che inclina la frattura, da quella vi si ponga una ferula piu larga, e piu robusta. E tutte queste intorno l'articolo debbono esser curve, accio non l'offendino, ne bisogna

stringerle di vantaggio di quello che possin tener assieme le ossa, ed essendo che in processo di tempo si allentano, ogni terzo giorno si restringhino un poco co'suoi legami: e se non vi è prurito alcuno, ne dolore, deve star in tal guisa sino che passino due parti di quel tempo, in cui bolle, salda ancora ogni osso, poi usar piu leggiermente il fomento dell' acqua calda, perche sul principio bisogna, che si digerisca la materia, indi si tiri fuori. Conviene dunque unger la parte piacevolmente con cerotto liquido, e fregar la sommità della cute e lasciarla piu lenta. Ogni tre giorni disfasci talmenteche tralasciata l'acqua calda, si facciano tutte le altre cose. Solamente ciascuna fascia ogni volta che si sarà sciolta, si tolga via.

### 2. *Cura della frattura dell' Omero.*

Queste sono cose comuni, altre ve ne sono di proprie. Stanteche l'omero rotto non si stira come le altre parti. Ma si colloca il paziente sopra un alta sedia, e il medico sta dirimpetto in una piu bassa. Una fascia pendente dal collo del paziente sostenga il braccio, la seconda dall' altra parte fatta passare sopra il cubito vi si annodi. Co la terza fasciata si la parte di sotto dell'omero si lascia andare in giu, ancor ivi legate insieme le di lei teste. Dappoi il ministro dietro al collo di esso,

so, sotto quella fascia che ho posta in secondo luogo preso co' le mani il braccio destro, se deve tirarsi l'omero destro, se il sinistro, il braccio sinistro, tiene un bastone messo fra le cosce di colui che si cura: il medico sopra quella fascia che collocai in terzo luogo pone la man destra, se si accomoda l'omero sinistro, o la sinistra se il destro, e nell' istesso tempo una fascia tira in su il ministro, l'altra abbassa il medico, dal che ne segue che l'Omero piacevolmente si stenda. Le fasce poi se è rotto l'osso nel mezzo, o in fondo possono esser piu corte; Se nella parte superiore, vi si ricercano piu lunghe, accio da quello si possino far passare per il petto, e per le spalle fin sotto all'altro braccio. Ma subito che si fascia il braccio dee piegarsi in modo che gli si dia la sua piegatura prima che ci cinga co' le fasce, accio poi sospeso al collo non dia all'omero diversa piegatura di quella, in cui n' è stato fasciato. Sospeso il braccio l'omero stesso deve leggiermente legarsi al fianco, dal che ne segue che non si mova, e percio se ne stiano le ossa conforme si sono accomodate. Quando si è giunto al metter le ferule, le piu lunghe debbono esser per di fuori: dal lacerto piu corte; sotto la spalla poi cortissime. Piu spesso convien disfasciare quando l'omero è

rotto in vicinanza del cubito, accio in tal luogo non si contraggano i nervi, e si renda inutile il braccio. Ogni volta che si sono sciolte, si sostenga la rottura colla mano, si fomenti il cubito con l'acqua calda, e si fregghi con cerotto morvido, e le ferule o del tutto non vi si ponghino sopra il cubito, o siano alquanto piu corte.

### 3. *Della Rottura del Braccio.*

Nella frattura del braccio poi si deve in primo luogo considerare se sia rotto un osso solo, o amendue: non perche in tal caso vi si ricerchi differente la cura, ma in primo luogo accio con maggior forza si tiri se amendue gli ossi son rotti: perche necessariamente meno si scorciano i nervi, essendo restato uno de' due ossi intero, e tenendo quelli tiranti; in secondo luogo accio si operino con piu diligenza le cose ricercate per tener a suo luogo gli ossi quando uno non serve di sostegno all'altro. Attesoche se uno di essi è sano apporta maggior utile, che tutte le fasce, e le ferule. Devesi poi fasciare il braccio col dito pollice alquanto piegato verso il petto, stanteche tal è ordinariamente la positura naturale del braccio. Fasciato che sia questo si accomoda nella cassetta, la quale in larghezza adattata al braccio co le sue strette teste si attacca al collo, e così

e così comodamente ne sta sospeso... E questo conviene che penda alquanto su la parte dell'altro cubito. Che se poi questo è rotto nella sommità del cubito non bisogna scaldarlo co le fasciature; attesoche il braccio si rende immobile, e se non si dee rimediare ad altro che al dolore, si può almeno adoperar il braccio come prima.

4. *Cura della frattura degli stinchi, e del femore.*

Nello stinco parimente fa approposito che almeno un de' due, essi sia intero. Comune poi si ad esso, come al femore si è che dopo fasciato dee metterli in un canale, che dalla parte di sotto abbia de i fori, per li quali, se qualche umore vi caderà dentro, possa uscir fuori, e dalla pianta del piede abbia un ritegno, che insieme regga quella, e non la lasci andar in giù, e dalle bande abbia delle incavature, per le quali fatti passar i lacci, venga dal ritegno tenuto fermo lo stinco, e il femore in quella positura che si è posto. Deve poi questo canale arrivare se è rotto lo stinco dalla pianta fino al ginocchio, se il femore, fin alla coscia, se la rottura è accanto la testa superiore del femore, talmente che la stessa coscia si ritrovi dentro di quello: \* Devesi

A a 3 sape-

\* Questo non è assolutamente vero; ma solo se vi s'è aggiunta negligenza nel curare, perciò forse può leggerli. Diventa quello più corto se non s'è rimesso nel suo primiero stato.

sapere ancora, che nella rottura del femore diventa quello più corto, perche mai ritorna nello stato primiero, e che si cammina co la sommità delle dita di quella gamba, farà poi di più debolezza grande nella coscia, se alla disgrazia sarà aggiunta anche la negligenza.

6. *Cura della frattura del Dito.*

Il dito basta che dopo la infiammazione si fasci ad una bacoletta.

7. *Cure comuni appartenenti a gli Omeri, braccia, stinchi, cosce, e diti infranti.*

Essendo queste cose che propriamente appartengono a ciaschedun membro, altre di nuovo ve ne sono da osservare come comuni a tutti: Ne' primi giorni si deve imporre l'astinenza del mangiare, dappoi essendo per crescer il callo bisogna dar il vitto più copioso, osservare una lunga astinenza dal vino, usar un copioso somento di acqua calda finche vi è la infiammazione, quando non vi è un poco minore: Di più ancora una lunga, ma però piacevole unzione alle parti prossime con cerotto liquido. Ne subito quel membro dee adoperarsi, ma appoco appoco ridursi al suo uso di prima.

Alquanto peggio si è quando alla frattura dell'osso vi s'aggiugne ancora la ferita della carne principalmente se è accaduto cio a' muscoli del femore, o dell'omero, perche in quelli si producano infiammazioni più gravi



gravi, e vengono piu presto i cancri. \* Ed il femore se l'ossa fra loro auno ceduto per lo piu necessariamente deve tagliarsi. L'Omero porta anch'esso pericolo, ma piu facilmente si conserva. A quali pericoli piu altresì sta esposta quella percossa, che si ritrova vicino agli articoli. Si dee dunque operare con piu diligenza, e tagliare il muscolo attraverso per mezzo la piaga. Del sangue, se poco n'esci, se ne dee cavare: il corpo si estenui co l'astinenza, e dovendosi gli altri membri stirar piu lentamente, e riponerli piu piacevolmente gli ossi a suo luogo, in questi non è espediente che si distirino i nervi, ne che si maneggino le ossa. Al paziente ancora si permetta che gli posi in quella guisa, che gli danno minor travaglio. A tutte queste simili ferite poi s'imponga sul principio una tasta bagnata in vino, al quale sia aggiunto un poco d'olio rosato. Ma si leghino queste cose con fasce alquanto piu larghe della piaga, cioe piu lente, che se quella non vi fosse, giacche può piu facilmente mortificarsi, e incancherire la ferita; bisogna piuttosto procurare col numero delle fasce, che ancor lente tengano parimente a segno. Il che nel femore, e nell'omero così seguirà, se accaso gli ossi bene confronteranno: se staranno altrimenti tanto solo doverà cingersi colla fascia quanto

A a 4 . . . possa

*Dice cancri invece di Gangrena.*

Accade talvolta ancora in una ferita grande che alcuni frammenti quasi si mortifichino, ne si unischino con gli altri. Il che in tal caso ancora può conoscersi dalla quantità dell' umore, che fluisce, onde è molto necessario che spesso si disfasci, e si curi l'ulcere. Ne segue poi, che questo osso diperso dopo alquanti giorni ne venga fuori, ed essendo prima la ferita tanto stretta, la potrete però far maggiore, e più larga. Imperocchè bene spesso non pesi l'osso rimanendo sana la cute, e di subito ne viene il prurito, e il dolore. La qual cosa se avviene bisogna levar le fascie per tempo, e bagnarle con acqua nell'estate fresca, nell'inverno tiepida, e porvi sopra cerotto mirtino.

Alle volte la frattura con alcune punte da dolore alla carne, il che conosciuto dal prurito, e dal dolore la necessità richiede, che si apra meglio, e che si taglino quelle punte. Il resto poi della cura nell'uno e nell'altro questo caso si è lo stesso di quando subito la percossa cagiona queste cose. Essendo già l'ulcere puro, qui ancora si usino i cibi che produchino la carne: se è per anco quel membro più corto del giusto, e gli ossi non sono a suo luogo, si deve metter fra quelli un bastoncino sottile fatto a palo ben liscio talmente che co la testa sopravanzi

un

un poco sopra la piaga, e quello ogni giorno vi si spinga avanti co la parte piu grossa finattantoche quel membro sia uguale all'altro. Allora si levi via il paletto, si risani la piaga, e formata la cicatrice si fomenti co l' acqua fresca, nella quale siano mortella, ellera, e altre simili verbenae che, e vi si empiastri medicamento risecante, e in tal caso piu ancora si stia a riposo finattantoche quel membro si consolidi.

Se talvolta gli ossi non anno bollito perche spesso sono stati mossi, e spesso sciolti, è manifesto qual debba esserne la cura, stanteche tenendogli lungo tempo a riposo possono attaccarsi. Se al debito tempo non si saldano con callo buon, ma con pinguedine mucosa, si stenda di nuovo quel membro in modo che ne venga divisa l'attaccatura; si dividono fra loro co le mani gli ossi acciò fregandosi l'uno co l'altro s'irruvidischino, e se vi è pinguedine si rada via, e la frattura si renda in un certo modo nuova, osservando però diligentemente di non offender muscoli, o nervi. Fatto questo si fomenti quella parte con vino, nel quale sia decotto malicorio, e vi si applichi questo stesso mischiato con chiara di ovo. Il terzo giorno si disfasci, e si fomenti con acqua in cui siano cotte le verbenae dette di sopra. Nel quinto giorno si facci lo stesso, e vi si ponghino intorno le feruse. Le  
altre

altre cose tanto avanti che dopo si facciano le medesime, che ho poste di sopra. Sogliono però talvolta ossi differenti unirsi insieme, e da ciò ne divien quel membro piu corto, e deforme da vederfi, e se i capi sono acuti si sentono continuamente punture. Perloche debbono di nuovo romperfi gli ossi, e separarsi l' uno dall' altro; cosa che fassi in tal guisa. Si fomenta la parte con copiosa acqua calda, e si frega tutto con cotto liquido, e si stende, fra tanto il medico maneggiando l' ossa per esser anche tenero il callo stacca quelle co le mani, e respinge a suo luogo cio che sopravanza in fuori, e se non ha avute forze bastanti per far cio da quella parte che sta piegato l' osso, gli oppone una riga fasciata con lana. E fasciandola in questa guisa la sforza ad assuefarsi di nuovo alla primiera configurazione.

Alle volte poi si sono unite veramente l' ossa a dovere, ma vi è sopracresciuto troppo un callo, che ha resa la parte gonfia. Il che se avviene bisogna con piacevolezza fregare quel membro con olio, sale, e nitro; fomentarlo molto con acqua salata calda, e imponervi un malamma discuziente, e dee lasciarsi piu stretto, si mangino erbaggi, e in oltre si usi il vomito. Co le quali cose si estenua co la carne ancora il callo, e giova altresì qualche empastro fatto

fatto di senapa, ed insieme con fico applicato parimente sopra l'altro membro, e lasciato stare finche corroda quello un poco, e ritiri colà la materia. Diminuito che si è il tumore con queste cose, si facci ritorno al solito modo di vivere.

## C A P O . XL.

*Delle ossa lussate.*

**E** Delle fratture dello ossa basti aver detto fin qui. Escono quelle poi da' suoi luoghi in due modi. Attesochè talor quelle che sono approssimate insieme si allontanano, come quando l'osso largo delle scapole si discosta dall'Omero, e nel braccio il radio dal cubito, o nella gamba la tibia dalla tibia, talor per qualche salto l'osso del calcagno dal talo, il che però di rado avviene. Alle volte gli articoli escono da' suoi luoghi. Darò principio da' primi.

Se alcuna di quelle cose accade, divien subito quella parte concava, e calcandovi con un dito si trova la cavità, poi, ne lega una grave infiammazione, e principalmente ne' taloni. Attesochè suol cagionare ancora febbri, sfaceli, convulsioni, e rigidezze de' nervi. Per fuggire le quali cose dee farsi lo stesso di quando sono offese le ossa mobili: qualor cosa simil n' accade, lo scopo è di rimo-

rimover subito da queste parti il dolore, e il tumore. Santeche queste ossa separate mai si riuniscono fra di loro, ed accio non sia deformità in quella parte, non se n'ammette l'uso.

La mascella poi, e le vertebre, e tutti gli articoli essendo cinti di nervi gagliardi escono dal suo luogo o cacciati da qualche violenza, o rotti, ed indeboliti per qualche accidente i nervi, e piu facilmente ne' fanciulli, e giovanetti che nelle persone piu robuste: e questi articoli si lussano così nella parte anteriore, come nella posteriore, alcuni in tutti i modi sì nell' esteriore, come nell'interiore, altri inguise determinate. E sonovi alcuni segni proprj di ciascuno, alcuni comuni a tutti. Essendoche il tumore sempre si trova da quella parte, nella quale n'esce fuori l'osso, e la cavità da quella che si è allontanata. E questi si ritrovano in tutti; altri poi sono proprj di ciascuno, che doveranno da me dirsi quando dirò di ciascuno di essi.

Ma siccome tutti gli articoli possono lussarsi, così non tutti si ripongono a suo luogo. Merceche'l capo mai si rimette a suo segno, ne la vertebra nella spina, ne quella mascella che escita dall'una, e dall'altra parte prima di esser rimessa ha cagionata l'infiammazione. Parimente quelli che sono esciti per difetto de' nervi, respinti ancor  
ne'

ne' suoi siti di nuovo si disluogano . Ma quei che anno avuta la lussazione da fanciullo , ne si sono gli ossi riposti , crescono meno degli altri . E di que' membri , che non sono a suo loco cresce la carne , e maggiormente nella parte piu vicina della piu lontana . Come per esempio , se è lussato l'omero si fa maggiore la macilenza nell' istesso omero , che nel braccio ; maggior in questo , che nella mano . Si ancora secondo i luoghi , ne' quali ritrovasi la lussazione , e secondo gli accidenti che saranno accaduti , resta maggiore , o minor l'uso di quel membro . E quanto piu rimane quella parte da potersi adoperare tanto meno si renderà estenuata .

Qualunque parte poi si è lussata dee riponerfi al suo posto avanti le infiammazioni . Se quella poi gia si è fatta , fino che ella n' abbia fine , non bisogna operar cosa veruna : terminata che si è ripongasi la lussazione a suo luogo in que' membri , che lo comportano . Molto poi conferisce a questo la qualità del corpo , e de' nervi . Essendo che se il corpo è gracile , se umido , se i nervi sono deboli con piu facilità l'osso si ripone . Ma in primo luogo piu facilmente si lussa , poi meno si ritiene ; quelli che anno qualità contrarie a queste meglio tengono a suo luogo gli articoli riposti . Ma con piu difficoltà gli ammettono nel sito suo quan-

## CAPO DECIMO PRIMO. 383

quando sono lussati. Bisogna poi rimuovere la infiammazione applicandovi sopra lana sucida bagnata in aceto: Dal cibo convien astenersi, se è lussato un articolo de' piu robusti, per tre giorni, e talvolta ancora per cinque, e bere acqua calda finattanto che tolga la sete. E si debbon far tali cose con maggior diligenza nelle lussazioni di quelle ossa, che vengono racchiuse da muscoli pieni, e gagliardi: Se poi vi s'è aggiunta la febbre ancora, tanto piu, dappoi il quinto giorno deve fomentarsi con acqua calda, e tolta via la lana ponervi sopra il cerotto fatto di ciprino, aggiuntovi altresì nitro finache termini del tutto la infiammazione. Allora conviene usar freghe a quella parte, prender buoni cibi, beber vino temperatamente, e ridurre anche quel membro al suo uso di prima, perche il moto siccome nel dolore è dannoso, così in altre occasioni è utilissimo al corpo. Queste sono le cose comuni, dirò ora delle particolari.

## C A P O   X I I .

### *Della Mascella lussata.*

**S**I lussa la mascella per l'avanti, ma or da una sola parte, or da amendue. Se si è lussata da una parte sola, si piega  
ver-



verso la parte opposta sì essa, come il mento, i denti non confrontano con i suoi simili, ma i canini si ritrovano sotto gl' incisori. Che se n'uscì da amendue le parti tutto il mento vien in fuori, e i denti di sotto stanno più in fuori di que' di sopra, e i muscoli vi si veggono stesi, e tiranti. Convienne quanto prima collocar quell'uomo a sedere in modo che il ministro perdidi dietro tenga fermo il capo di lui: ovver in modo che quello s'eda accanto la muraglia, postoli fra 'l capo, ed il muro un guanciale, che faccia resistenza; e la sua testa vi venga calcata sopra dal ministro, accio si renda più immobile. Allora il medico rivoltatisi li diti pollici con pezzette di lino, o fasce, accio non gli sdrucicolino glieli mette in bocca, e gli altri fa forza per di fuori. Compresa che si è fortemente la mascella se è fuori da una sola parte, si scuota il mento, e si spinga verso la gola. Allora nel tempo stesso si prenda il capo, e alzato il mento spingasi la mascella nel suo sito, e si ferri la bocca del paziente in modo che tutte queste cose si facciano quasi in un momento stesso. Se' è lussata da amendue le parti si facciano tutte le medesime cose, ma egualmente deve mandarsi addietro la mascella, Rimesso a luogo l'osso, se tal caso è accaduto con dolore degli occhi, e del collo, si dee cavar sangue dal braccio. Convenendo poi a tutti  
coloro

CAPO DECIMO SECONDO. 385

coloro che anno ossa lussate il cibo liquido sul principio, conviene in primo luogo a questi; talmente che il solo parlare troppo spesso co' l'agitazione della bocca apporta anche gran nocumento a' nervi.

C A P O XIII.

*Della testa lussata.*

**D**issi nella prima parte del libro, che la testa, intromeffi due processi in due seni dell'ultima vertebra vien fermata sopra il collo. Questi processi talvolta escono dal suo luogo per la parte di dietro, dal che ne segue, che il nervo sotto la collottola si stiri, il mento si congiunga sul petto, e non possa colui bere ne parlare, e talvolta involontariamente mandi fuori il seme. Dalle quali cose prestissimo ne viene la morte. Ho giudicato ben'apportar cio non perche vi si ritrovi alcuna sorta di cura, ma accio si potesse discernere la cosa da' suoi contrassegni, e non stimassero aver mancato al suo uffizio il Medici que'che in tal guisa avessero perduto alcuno.

C A P O XIV.

*Della lussazione della Spina.*

**N**ello stesso caso si ritrovano coloro, a quali si sono lussate le vertebre della

spina. Imperciocchè non può ciò seguire senza la rottura della Spinalmedolla, che scorre per il mezzo, e delle due membranette che si portano per i due processi da' lati, e de' nervi, che la tengono. Si lussano poi queste tanto verso la parte anteriore, come verso la posteriore; così sopra il diaframma, come sotto. Ma se si sono lussate in una delle due parti apparisce dalla parte di dietro o tumore o cavità. Se è la lussazione sopra il diaframma divengono paralitiche le mani, ne segue il vomito, o distensione de' nervi, con difficoltà si respira, si sente dolore, e vi è sordità negli orecchi. Se sotto il diaframma sono rese paralitiche le cosce, cessa la orina, e talvolta anche vien fuora involontariamente. In tali casi benchè più tardi che nella lussazione della testa, contuttocio nello spazio di tre giorni l'uomo se ne muore, atteso che inquanto disse Ippocrate, che essendo lussata la vertebra per di fuori si deve collocar quell'uomo boccone, ed allungarsi, e che dappoi gli dee montar un uomo con un piede sopra, e calcarlo indentro, convien intendere di quelle vertebre, che potò sono uscite fuora, non di quelle che sono del tutto dislogate. Stante che alle volte la debolezza de' nervi fa, che la vertebra benchè non sia disluogata, avanzi però alquanto nella parte anteriore. Ciò non cagiona la morte, ma dalla parte di dentro non succede, che

possi

CAPO DECIMO QUARTO. 387

possa ritornare a suo luogo; se per altro (cosa che molto rara) non è ritornato; il suo vigore a' nervi; dalla parte esteriore per lo piu di nuovo ritoraa se alquanto si respinge.

C A P O XV.

*Dell' Omero lussato.*

**L'**Omero poi ora si lussa per di sotto l'assilla, ora per la parte d' avanti. Se n'è uscito verso l'assilla, il cubito che sta a quello attaccato si discosta dal fianco, e parimente non puo insieme coll'Omero accostarsi all' orecchio dell' istessa parte, e quel braccio divien piu lungo dell' altro. Se si è lussato per la parte d' avanti si stende veramente la sommità del braccio, ma meno però del naturale, e con più difficoltà si porge per lo innanzi, che per lo indietro.

Se l'omero dunque si lussa verso l' assilla, ed è corpo puerile, o gracile, o almeno sostenuto da nervi deboli, basta poner il paziente a sedere, e comandare ad uno de' due ministri, che leggiermente tiri a se la testa dell'osso largo delle scapole, all' altro che distiri il braccio. E che egli stando a sedere dalla parte di dietro spinga col ginocchio l' omero sotto l' assilla di quello, e nello stesso tempo incalzi l'osso largo delle scapole, e co l'altra mano il di lui braccio verso il fianco.

Che se il corpo è maggiore, e i nervi più robusti, vi si ricerca una spatola di legno, la quale ha la grossezza di due dita, e in lunghezza dalla spalla giugne fin alle dita. Nella sommità di cui ritrovasi una capocchia rotonda, e mediocrementemente incavata, accio possa ricevere qualche particella della testa dell'omero. Sono in quella due buchi in tre luoghi fra loro distanti, e in quei s' intromettono legami morvidi. E quella spatola rinvolta con una fascia affine che meno col suo contatto offenda, si pone per dritto dal braccio verso la spalla, talmentechè la testa di quella si ponga sotto alla sommità dell'assilla. Indi con i suoi legami si stringe al braccio in un luogo un poco sotto la testa dell'omero, nel secondo un poco di sopra il cubito, nel terzo sopra la mano. Al quale effetto vi si debbono esser fatti confrontare i buchi co le dovute distanze. Legato in tal guisa il braccio si fa passare sopra uno scalino d'una scala fatta con bastoni tanto alto, che quell'uomo non possa posare in terra, e nello stesso tempo si lascia cadere da una parte il corpo dall'altra si stira il braccio. E fassi cio a tal fine che dalla capocchia del legno spinta la testa dell'Omero si riduca a suo luogo talor con strepito, talor senza. Molti altri modi ritrovarsi puo facilmente sapersi leggendo il solo Ippocrate, ma non ve n'è alcuno più usato di questo.

Che

## CAPO DECIMO QUARTO. 389

Che se l'omero si lussò per la parte d'avanti bisogna collocar quell'uomo supino, e con una fascia, o cinghia cinger in mezzo l'assilla, e porger i capi di quella fascia al ministro dietro al capo del paziente, e all'altro ministro dare il braccio: e comandar che il primo tiri la cinghia, o fascia, e il secondo il braccio. Dappoi il medico co la mano sinistra deve mandar indietro la testa dell'uomo, e co la destra alzare il cubito co l'omero, e spinger l'osso nel suo sito il quale in simil caso più facilmente vi si, ritorna, che nel primo. Rimesso a luogo l'Omero si pone sotto l'assilla sana, se l'osso fu lussato per l'indietro in modo che li si opponga, se per la parte anteriore in guisa almeno che più comodamente possa fasciarsi. Indi la fascia fatta passare prima di sotto l'assilla deve afferrare la testa dell'omero, poi facendo passaggio all'altra assilla, e da quella alle scapole dee di nuovo far ritorno alla testa dello stesso omero, e più volte nello stesso modo circondarsi, finche tenga quello ben fermo. Fasciato in questa guisa l'omero con più comodità si tien fermo, il quale sia accostato ancora al fianco, fermasi a quello con una fascia.

*Della lussazione del cubito.*

**C**He nel cubito si unischino insieme tre offi, cioè dell'omero, del radio, e del cubito stesso, da ciò che si è posto nel primo capo di questo libro si può intendere. Se il cubito che sta connesso co l'omero si parte da questo, il radio, che gli è annesso allevolte ancor esso si lussa, allevolte resta fermo. Può il cubito poi lussarsi in tutte e quattro le parti, ma se si è lussato per la parte d'avanti resta disteso il braccio, ne può piegarsi. Se per la parte d'avanti ne sta il braccio torto, ne può stendersi, e ne divien più corto dell'altro. Talor ne cagiona la febbre, e il vomito di bile. Se per la parte esteriore, o interna resta steso il braccio, ma incurvato un poco da quella parte, dalla quale si è partito l'osso. Qualunque di queste cose siasi accaduta vi è una sola maniera di racconciarlo, ( e non solamente nel cubito, ma in tutti li membri lunghi ancora, che si congiungono per mezzo d'articoli. ) E questa è di stirare l'uno e l'altro membro in parti diverse finche rimanga spazio libero fra gli offi. Indi spingere l'osso lussato da quella parte, in cui n'è fuori, verso la parte contraria. Dello stirar poi ve ne sono modi diversi secondo che sono gagliardi

CAPO DECIMO SESTO. 391

di i nervi, o gli offi da questa, e da quella parte sono lussati. Ed allevolte si opera co le sole mani, allevolte si usano alcune altre cose.

Se dunque il cubito n'è lussato verso la parte d'avanti è sufficiente che si tiri con due mani, ed allevolte ancora che si allacci co le fasce, ed in tal guisa si estenda. Dapoi pongasi qualche cosa rotonda dalla parte del lacerto; e sopra quello di subito si spinge il cubito verso l'omero. Ma negli altri casi è assai comodo di stirar il braccio nello stesso modo, che si è posto di sopra nella frattura dell'omero, e poi riponere a suo luogo l'ossa.

Il resto della cura si è il medesimo di tutti gli altri. Più presto però, e più spesso dee questo disfasciarsi, e molto più fomentarsi co l'acqua calda, e più a lungo fregare con olio, nitro, e sale. Stanteche nel cubito più presto che in alcun altro articolo, o sia rimasto fuori, o ritornato dentro, vi si genera il callo, e questo con lasciarlo stare vi è cresciuto sopra, non lascia poi che quello si possa piegare.

C A P O XVII.

*Della mano lussata.*

**L**A mano parimente si lussa in tutte quattro le parti, se si disluoga per la

B b 4

par-



parte di dietro non si possono stender i diti, se per la parte d'avanti non si possono piegare, se in una delle bande, la mano si rivolge verso la parte opposta, cioè verso il dito pollice, o verso il minimo. Non con gran difficoltà puo riporsi a suo luogo. Perciò sopra un luogo duro, e resistente si dee da una parte distirar il braccio, dall'altra la mano in modo che sia voltata all'ingiu se l'osso uscì dalla parte di dietro; si ponga voltata all'insu, se si lussò per l'innanzi; si collochi da banda, se si lussò per la parte interna o esterna. Stirati che sono abbastanza i nervi, se in uno de'lati uscì fuori la mano deve quella conforme il braccio ancora rispingerli verso la parte opposta; ma quando è lussata per la parte d'avanti, o di dietro convien ponervi sopra qualche cosa dura, e calcar quella sopra l'osso co la mano per mezzo del quale fatta maggior forza più facilmente si rispinge al suo sito.

## C A P O XVIII.

*Della Palma lussata.*

**N**.Ella palma ancora talvolta le ossa si partono dal suo luogo or per l'innanzi, or per l'indietro. Stanteche da banda essendo opposti ossi eguali non possono moverli. Il contrassegno è quello so-  
lo

CAPO DECIMO OTTAVO. 393

lo solo che n'è comune a tutti val a dire tumore dalla parte dove si è portato l'osso, e la cavità dal la parte da cui si è allontanato. Ma senza stiramento, solamente premendo bene col dito, quell'osso, ritorna al suo sito.

C A P O XIX.

*Delle Dita Lussate.*

**N**Elle dita poi si danno gli stessi casi, e sono gli stessi segni, che nelle mani. Ma nello stirar questi non vi si ricerca ugual forza essendo gli articoli più corti, e i nervi meno robusti. Debbono solamente distirarsi sopra di una tavolina quei che si lussarono, o dalla parte d'avanti, o di dietro, poi calcarsi co la palma della mano, e quando sono lussati per fianco co le sole dita possono rimettersi a suo luogo.

C A P O XX.

*Del Femore Lussato.*

**A**Vendo io trattato degli omeri può parere ch'io abbia detto ancora delle gambe. Atteso che anche in questo caso si trova qualche similitudine fra'l femore, e l'omero, fra la tibia, e il cubito, fra'l piede, e la mano.

mano. Alcune cose però separatamente debbon dirsi anche di queste parti.

Si lussa il femore in tutt'è quattro i lati, spessissimo per la parte interiore, in secondo luogo per la parte esteriore, molto di rado per la parte d'avanti, o di dietro. Se si è lussato per l'indentro divien la gamba lussata piu lunga dell'altra, e storta per l'insuori, perche sta rivolta a quella parte la punta del piede. Se nella esteriore si è quella piu corta, e storta per l'indentro, il calcagno nel camminare non tocca terra, ma solo l'estremità della pianta, e questa gamba meglio sostiene la parte superiore del corpo, che nel primo caso, e meno ha bisogno del bastone per sostegno. Se per la parte anteriore, non può piegarsi la gamba, e stesa si è uguale all'altra gamba fin al calcagno, ma l'estremità della pianta non è tanto rivolta verso la parte anteriore, e vi si ritrova in questo caso un dolore considerabile, e assai n'è soppressa l'orina. Quando col dolore resta cessata l'infiammazione comodamente i lussati camminano, e tutto il loro piede posa su la terra. Ma se si lussò per la parte di dietro, non può stendersi la gamba, ed è quella piu corta, nel posare il piede, il calcagno parimente non tocca il suolo. porta poi pericolo grande il femore, che o con difficoltà si rimetta, oppur quando è rimesso di nuovo si disluoghi. Affermiano alcuni che sempre di nuovo esce dal suo sito; ma Ippo-

Ippocrate, e Diocle; e Filatimo, Nileo, ed Eraclide Tarentino autori molto celebri, lasciarono scritto d'averlo essi restituito nel suo luogo. Ne tante sorte d'istrumenti per distirar il femore in questo caso, Ippocrate, Andrea, Nileo, Ninfodoro, Protarco, Eraclide, e un certo Fabro, averebbero inventate, se ciò dovesse farsi in vano. Ma siccome cose tali sono false, così ancora è vero, che essendo in tal parte i nervi, e i muscoli gagliardissimi, se ritengono la sua robustezza, appena ammettono la riposizione; se non l'anno, non possono poi tener a suo luogo gli ossi.

Deve adunque tentarsi, e se quel membro sarà debole, basta legar una cinghia dalla parte dell'inguine, l'altra dal ginocchio. Che se quello è più robusto meglio si stirerà se si legheranno le stesse cinghie a gagliardi bastoni, e poi opposte le parti di sotto di essi ad un ritegno, si tireranno a se con amendue le mani le parti di sopra. Con maggior forza ancora stirasi il membro sopr'uno scagno, il quale ha dall'una e dall'altra banda le tavole, alle quali si legano quelle cinghie, che girate come si fa ne' torchi, potrebbero romper ancora, se alcuno perseverasse a volger, non che stirar i nervi, e i muscoli. Bisogna poi collocar quell'uomo sopra quello scagno, o boccone, o supino, o per fianco; in modo che sempre quella parte rimanga di sopra,

pra, verso di cui si è uscito l'osso, e quella ancora rimanga di sotto, dalla quale l'osso si è allontanato. Stirati che siano i nervi, se venuto per lo innanzi l'osso conviene poner sopra l'inguine qualcosa di rotondo, e subito dovesi mandar sopra ciò il ginocchio nel modo stesso, e per la stessa cagione, che si fa la medesima cosa nel braccio, e prestissimo se può piegarsi il femore, entra esso nel suo luogo.

Ne gli altri casi poi quando le ossa per la violenza si sono un poco allontanate, deve il medico spinger indietro ciò che si è fuori, e il ministro al contrario, allora mandar avanti la coscia. Riposto a suo sito l'osso, niente altro di nuovo ricerca la cura, che di trattenerfi il paziente piu tempo in letto, accio che movendosi il femore, per anco rilasciati i nervi, non ne venga di nuovo ad uscir fuori. Rimesso poi l'articolo di mezzo, o ultimo si può racchiudere in qualche canaletto.

## C A P O XXI.

*Del Ginocchio Lussato.*

**E** Parimente notissimo, lussarsi'l ginocchio verso la parte esteriore, verso l'interiore, e verso la posteriore: verso la parte d'avanti poi non lussa è stato scritto dalla maggior parte de' Professori. E può esser ciò vero, essendovi da quella parte opposta la patella, che

che tien fermo anche il capo della tibia. Megete però lasciò scritto essere stato da se curato un uomo, a cui il ginocchio si era lussato verso la parte d'avanti.

In questi casi possono distirarsi li nervi ne' modi stessi, che dissi del femore. E quello che s'è lussato per la parte di dietro, col poner nel modo stesso qualche cosa rotonda sopra il ginoco, e spingendo a quella parte lo stinco si ripone. Ne gli altri casi poi co le mani accoppiate si spingono gli ossi verso i suoi siti.

## C A P O XXII.

*Del Calcagno Lussato.*

**I**L Calcagno per tutte le parti si lussa. Quando è uscito verso la parte interna, la punta del piede riguarda la parte esteriore, quando si lussa verso la parte opposta, vedesi altresì contrario questo segno. Se esce per la parte d'avanti, il nervo largo dalla parte di dietro è duro, e inutile, e non di servizio veruno. Se per la parte di dietro, il calcagno quasi si nasconde, e la piaga si fa maggiore. Riponesi poi questo co le mani, stirati prima in parti opposte il piede, e la gamba. E in questo caso bisogna eziandio trattenerli d'avvantaggio nel letto, accio quel calcagno che regge tutto il corpo, non confermati a sufficienza i nervi non ceda al peso che deve portare, e di nuovo  
esca

ufca dal suo luogo. E sul principio ruscino anche le pianelle, acciò la legatura non venga ad offendere lo stesso calcagno.

## C A P O XXIII.

*Della Pianta Lussata.*

**G**Li ossi della pianta si lussano ne' medesimi modi di quelli della mano, e negli stessi modi si ripongono. Solamente la fascia deve circondare ancora il calcagno, acciò che portando la necessità che si fasci nel mezzo, e in cima, la pianta, lasciato libero il calcagno dal mezzo del piede, riceva materia più abbondante, e perciò cagioni suppurazione.

## C A P O XXIV.

*Delle Dita Lussate.*

**N**Elle dita niente di vantaggio dee farsi di quello che si è detto de' diti della mano.

## C A P O XXV.

*Delle lussazioni con piaga o rottura della carne.*

**P**Uo però l'articolo di mezzo, o l'estremo dopo che si è riposto, tenersi in qualche can-

cannelluccio . Tali cose debbon farsi nelle ossa lussate senza ferita : Bene spesso però si lussano con ferita . In tal caso v'è pericolo grande e tanto piu quanto è maggiore il membro, e da quanto piu robusti ne' vi, e muscoli n'è tenuto . Perciò negli omeri, e ne' femori si puo temer la morte , e se non si sono rimessi a suo luogo gli ossi non vi è speranza veruna . Ed essendo anche rimessi vi è qualche pericolo . Il quale tanto maggiore ritrovasi nell'un e nell'altro, quanto piu vicina all'articolo è la ferita . Ippocrate disse niente poterli riponere con sicurezza . Certo che i diti, le piante, le mani, e in queste parti ancora dove si operare con diligenza per non precipitare la cura . Furonvi alcuni che riposero anche le braccia, e le gambe d'acciò non ne seguissero cancri, e convulsioni di nervi, dalle quali cose in simil caso verrebbe presto la morte, cavarono il sangue dal braccio . Ma neppur il dito, ( in queste come ritrovasi 'l minor male, così è aora il pericolo minore ) deve riponersi non prima dell'inflammazione, ovvero ppoi quando si è già resa vecchia la lussione . Se riposto ancor l'osso ne viene convulsione de' nervi, di nuovo dee subito quell'acciarsi fuori .

Ogni membro poi, che con ferita è lussato, ne si è riposto a suo luogo, deve acere come piu piace al paziente, posando letto, solamente che non si mova, ne stia il membro

pen-



pendente. E in ogni tal male un rimedio grande si è riposto in una lunga astinenza. Dappoi nella cura si facciano le cose stesse, che si sono proposte da fare quando alle fratture delle ossa si aggiugne altresì la piaga. Se l'osso avanza fuori nudo, sempre è per apportare impedimento. Ciocche avanza fuori dee tagliarsi, e convien ponervi sopra taffe asciutte, e medicamenti non grassi, fintantoche si ricuperi quella sanità, che in tal caso può ricuperarsi. Imperocchè ne segue debolezza di quella parte, e se ne forma una cicatrice sottile, la quale indi a poi necessariamente deve restare esposta ad ogni ingiuria eziandio leggerissima.

**I L F I N E.**

